

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo che contiene importanti informazioni. Questo medicamento le è stato prescritto dal suo medico o le è stato consegnato senza prescrizione medica in farmacia. Faccia uso corretto del medicamento o segua le indicazioni del suo medico o del suo farmacista, al fine di ottenere il maggior beneficio. Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

Albicansan D4, capsule

Medicamento omeopatico

Quando si usa Albicansan D4, capsule?

Secondo la concezione che sta alla base dei medicinali omeopatici Albicansan D4 capsule può essere usato in caso di eczemi e micosi.

Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?

Se il suo medico le ha prescritto altri medicinali, chieda al suo medico o al suo farmacista se contemporaneamente può assumere Albicansan D4 capsule.

Quando non si può usare Albicansan D4, capsule e quando la sua somministrazione richiede prudenza?

Albicansan D4, capsule non può essere usato in caso d'ipersensibilità conosciuta all'ingrediente attivo. Informi il suo medico o il suo farmacista nel caso in cui:

- soffre di altre malattie
- soffre di allergie o
- assume o applica esternamente altri medicinali (anche se acquistati di propria iniziativa).

Si può usare Albicansan D4, capsule durante la gravidanza o l'allattamento?

In base alle esperienze fatte finora, non sono noti rischi per il bambino se il medicamento è usato correttamente. Tuttavia non sono ancora stati eseguiti studi scientifici sistematici. Per precauzione dovrebbe rinunciare nella misura del possibile ad assumere medicinali durante la gravidanza e il periodo d'allattamento o chiedere consiglio al suo medico o al suo farmacista.

Come usare Albicansan D4, capsule?

Salvo diversa prescrizione medica: prendere 1-3 capsule una volta al giorno prima della colazione o alla sera prima di coricarsi con un po' di liquido. Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal suo medico. Se non si manifesta il miglioramento desiderato nel trattamento di un bambino piccolo/bambino, deve essere consultato un medico. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico o al suo farmacista.

Quali effetti collaterali può avere Albicansan D4, capsule?

In seguito all'assunzione di Albicansan D4, capsule possono manifestarsi i seguenti effetti collaterali: Raramente sono state osservate reazioni di ipersensibilità (allergia all'ingrediente attivo). Se osserva effetti collaterali non menzionati, dovrebbe informare il suo medico o il suo farmacista. Con l'assunzione di



medicamenti omeopatici, i disturbi possono momentaneamente aggravarsi (aggravamento iniziale). Se l'aggravamento dovesse persistere, interrompa il trattamento con Albicansan D4 capsule e informi il suo medico o il suo farmacista.

Di che altro occorre tener conto?

Il medicamento non deve essere utilizzato oltre la data indicata con "verwendbar bis" sulla confezione. Conservare i medicinali fuori della portata dei bambini. Conservare a temperatura ambiente (15-25 °C). Il medico, il farmacista possono darle ulteriori informazioni.

Cosa contiene Albicansan D4, capsule?

1 capsula contiene: 330 mg Candida albicans D4 trituration (HAB, 6).

Questo preparato contiene inoltre lattosio come sostanza ausiliaria. Capsula: hypromellosa.

Numero dell'omologazione

51 859 (Swissmedic)

Dove è ottenibile Albicansan D4, capsule? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia senza prescrizione medica.

Confezione da 20 capsule.

Titolare dell'omologazione

ebi-pharm ag, Lindachstr. 8c, 3038 Kirchlintach

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel dicembre 2006 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

