

Information für Patientinnen und Patienten

Lesen Sie diese Packungsbeilage sorgfältig, denn sie enthält wichtige Informationen.

Dieses Arzneimittel haben Sie entweder persönlich von Ihrem Arzt oder Ihrer Ärztin verschrieben erhalten oder Sie haben es ohne ärztliche Verschreibung bezogen. Wenden Sie das Arzneimittel gemäss Packungsbeilage beziehungsweise nach Anweisung des Arztes, des Apothekers oder des Drogisten bzw. der Ärztin, der Apothekerin oder der Drogistin an, um den grössten Nutzen zu haben.

Bewahren Sie die Packungsbeilage auf, Sie wollen sie vielleicht später nochmals lesen.

Sanactiv Arnika Ringelblumen Gel, Gel

Tentan AG

Pflanzliches Arzneimittel

Was ist Sanactiv Arnika Ringelblumen Gel und wann wird es angewendet?

Arnika und Ringelblume sind bekannte und bewährte Heilpflanzen zur äusserlichen Behandlung von Entzündungen und stumpfen, d.h. unblutigen Verletzungen. Arnika wirkt entzündungshemmend und fördert den Heilungsprozess.

Die moderne Darreichungsform als Gel wird angewendet bei Verstauchungen, Zerrungen und Quetschungen, zur unterstützenden Behandlung bei Krampfadern und schweren Beinen. Lindert bei Insektenstichen.

Was sollte dazu beachtet werden?

Wenn Sie unter Venenbeschwerden leiden, sollten Sie für ausreichende Bewegung sorgen (Schwimmen, Wandern), die Beine nachts etwas hochlagern, langes Stehen vermeiden oder die Beine zumindest bandagieren.

Wann darf Sanactiv Arnika Ringelblumen Gel nicht oder nur mit Vorsicht angewendet werden?

Sanactiv Arnika Ringelblumen Gel darf nicht angewendet werden bei bekannter Überempfindlichkeit auf einen der Inhaltsstoffe (z.B. Arnika-Allergie).

Nicht anwenden auf offenen Wunden, Ekzemen, auf Schleimhäuten.

Nicht anwenden bei Kleinkindern.

Vorsichtig anwenden bei Neigung zu Allergien.

Kontakt mit den Augen vermeiden.

Informieren Sie Ihren Arzt, Apotheker oder Drogisten bzw. Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin, wenn Sie

- an anderen Krankheiten leiden
- Allergien haben oder
- andere Medikamente (auch selbst gekaufte!) einnehmen oder äusserlich anwenden.

Darf Sanactiv Arnika Ringelblumen Gel während der Schwangerschaft oder in der Stillzeit angewendet werden?

Aufgrund der bisherigen Erfahrungen ist bei bestimmungsgemässer Anwendung kein Risiko für das Kind bekannt. Systematische wissenschaftliche Untersuchungen wurden aber nie durchgeführt.

Vorsichtshalber sollten Sie während der Schwangerschaft und Stillzeit möglichst auf Arzneimittel verzichten oder den Arzt, den Apotheker oder den Drogisten bzw. die Ärztin, die Apothekerin oder die Drogistin um Rat fragen.

Wie verwenden Sie Sanactiv Arnika Ringelblumen Gel?

Erwachsene:



Bei Bedarf mehrmals täglich auf zu behandelnde Körperpartien dünn auftragen und nur *leicht* einmassieren.

Nach der Anwendung die Hände waschen. Die Anwendung und Sicherheit von Sanactiv Arnika Ringelblumen Gel bei Kindern und Jugendlichen ist bisher nicht geprüft worden.

Halten Sie sich an die in der Packungsbeilage angegebene oder vom Arzt oder der Ärztin verschriebene Dosierung. Wenn Sie glauben, das Arzneimittel wirke zu schwach oder zu stark, so sprechen Sie mit Ihrem Arzt, Apotheker oder Drogisten bzw. mit Ihrer Ärztin, Apothekerin oder Drogistin.

Welche Nebenwirkungen kann Sanactiv Arnika Ringelblumen Gel haben?

Folgende Nebenwirkungen können bei der Anwendung von Sanactiv Arnika Ringelblumen Gel auftreten: Bei Auftreten von schmerzhaften, juckenden und entzündlichen Hautveränderungen ist die Behandlung abzubrechen und gegebenenfalls ein Arzt oder eine Ärztin aufzusuchen.

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, die hier nicht beschrieben sind, sollten Sie Ihren Arzt, Apotheker oder Drogisten bzw. Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin informieren.

Was ist ferner zu beachten?

Für Kinder unerreichbar aufbewahren.

Nicht einnehmen.

Bei Raumtemperatur (15-25°C) lagern.

Das Arzneimittel darf nur bis zu dem auf der Packung mit «EXP» bezeichneten Datum verwendet werden.

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen Ihr Arzt, Apotheker oder Drogist bzw. Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin.

Was ist in Sanactiv Arnika Ringelblumen Gel enthalten?

Zusammensetzung pro 1 g Gel:

150 mg ethanolischer Flüssigextrakt aus getrockneten Arnikablüten (DEV 1:9, Auszugsmittel Alkohol 65% V/V), 10 mg ethanolischer Flüssigextrakt aus getrockneten Ringelblumen (DEV 1:3, Auszugsmittel Alkohol 24% V/V). Dieses Präparat enthält zusätzlich Hilfsstoffe.

Zulassungsnummer

67972 (Swissmedic)

Wo erhalten Sie Sanactiv Arnika Ringelblumen Gel? Welche Packungen sind erhältlich?

Dies ist ein freiverkäufliches Arzneimittel.

Tuben zu 110 g

Zulassungsinhaberin

Tentan AG, 4452 Itingen

Auslieferung

Migros-Genossenschafts-Bund, CH-8031 Zürich

Diese Packungsbeilage wurde im Februar 2010 letztmals durch die Arzneimittelbehörde (Swissmedic) geprüft.

PI035120/03.20

