

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo che contiene importanti informazioni. Questo medicamento le è stato prescritto dal suo medico o le è stato consegnato senza prescrizione medica in farmacia. Faccia uso corretto del medicamento o segua le indicazioni del suo medico o del suo farmacista, al fine di ottenere il maggior beneficio. Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

Albicansan® D3, pomata

Medicamento omeopatico

Quando si usa Albicansan® D3, pomata?

Secondo la concezione che sta alla base dei medicinali omeopatici Albicansan® D3, pomata può essere usato in caso di eczemi e micosi.

Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?

Se il suo medico le ha prescritto altri medicinali, chieda al suo medico o al suo farmacista se contemporaneamente può usare Albicansan® D3, pomata.

Quando non si può usare Albicansan® D3, pomata e quando la sua somministrazione richiede prudenza?

Albicansan® D3, pomata non può essere usato in caso d'ipersensibilità conosciuta a uno degli ingredienti. Informi il suo medico o il suo farmacista se

- soffre di altre malattie
- soffre di allergie o
- assume o applica esternamente altri medicinali (anche se acquistati di propria iniziativa).

Si può usare Albicansan® D3, pomata durante la gravidanza o l'allattamento?

In base alle esperienze fatte finora, non sono noti rischi per il bambino se il medicamento è usato correttamente. Tuttavia non sono ancora stati eseguiti studi scientifici sistematici. Per precauzione dovrebbe rinunciare nella misura del possibile ad usare medicinali durante la gravidanza e il periodo d'allattamento o chiedere consiglio al suo medico o al suo farmacista.

Come usare Albicansan® D3, pomata?

Salvo diversa prescrizione medica: applicare un sottile strato di pomata sulle parti colpite da 1 – 3 volte al giorno. Se non si manifesta il miglioramento desiderato nel trattamento di un bambino piccolo / bambino, deve essere consultato un medico.

Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal suo medico. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico o al suo farmacista.

Quali effetti collaterali può avere Albicansan® D3, pomata?

In seguito all'applicazione di Albicansan® D3, pomata possono manifestarsi i seguenti effetti collaterali: Raramente sono state osservate reazioni di ipersensibilità (allergia all'ingrediente attivo). In questi casi, interrompere il trattamento e consultare un medico. Se osserva effetti collaterali non menzionati, dovrebbe



informare il suo medico o il suo farmacista. Con l'applicazione di medicinali omeopatici, i disturbi possono momentaneamente aggravarsi (aggravamento iniziale). Se l'aggravamento dovesse persistere, interrompa il trattamento con Albicansan® D3, pomata e informi il suo medico o il suo farmacista.

Di che altro occorre tener conto?

Il medicinale non deve essere utilizzato oltre la data indicata con "verwendbar bis" sulla confezione. Conservare i medicinali fuori dalla portata dei bambini. Conservare a temperatura ambiente (15-25 °C). Il medico, il farmacista possono darle ulteriori informazioni.

Cosa contiene Albicansan® D3, pomata?

1 g di pomata contiene:

100 mg Candida albicans D3 aquos. dil. (HAB, 5a).

Questo preparato contiene inoltre sostanze ausiliarie: Alcoli di cera di lana, alcool cetostearilico, vaselina bianca, trigliceridi a catena media, glicerilmonostearato 40-55, glicole propilenico, magnesio solfato, acqua.

Numero dell'omologazione

51860 (Swissmedic)

Dove è ottenibile Albicansan® D3, pomata? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia senza prescrizione medica.

Confezione da 30 g.

Titolare dell'omologazione

ebi-pharm ag, Lindachstr. 8c, 3038 Kirchlindach

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel dicembre 2006 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

