

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo prima di fare uso del medicamento. Questo medicamento le è stato prescritto personalmente e quindi non deve essere consegnato ad altre persone, anche se i sintomi sono gli stessi. Il medicamento potrebbe nuocere alla loro salute.

Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

Diprosone® Crema

Organon GmbH

Che cos'è Diprosone Crema e quando si usa?

Il principio attivo contenuto in Diprosone Crema (betametasone dipropionato) ha un'azione antinfiammatoria e antiallergica, alleviando i sintomi concomitanti come il prurito, il bruciore o il dolore.

Diprosone Crema è indicato per il trattamento di affezioni cutanee non infette di origine infiammatoria, allergica o eczematosa.

Diprosone Crema deve essere utilizzato solo su prescrizione medica.

Quando non si può usare Diprosone Crema?

Non utilizzi Diprosone Crema se soffre di ipersensibilità verso i suoi componenti, nonché in caso di varicella, infezione da herpes (per es. febbre labiale), tubercolosi e sifilide cutanea, reazione a vaccini, dermatite periorale (infiammazioni nella regione della bocca) e rosacea.

Non utilizzare Diprosone Crema in caso di ferite aperte e infiammazioni purulente, come nel caso di foruncoli, ascessi e acne.

Diprosone Crema non è indicato per il trattamento degli occhi e non va utilizzato in prossimità degli occhi.

Quando è richiesta prudenza nell'uso di Diprosone Crema?

Diprosone Crema è un medicamento molto efficace. Non superi la durata del trattamento prescritta dal medico, che negli adulti e negli adolescenti è normalmente di 2-3 settimane, in quanto potrebbero manifestarsi delle lesioni cutanee.

Se la sua affezione cutanea non risponde al trattamento entro alcuni giorni o magari peggiora, consulti il suo medico. Gli comunichi anche se dovessero manifestarsi prurito e arrossamento, vescicole, un marcato assottigliamento della pelle o lesioni.

Se i sintomi ricompaiono entro 2 settimane dalla fine del trattamento, non usi l'unguento/la soluzione senza aver prima consultato un medico, a meno che il suo medico non l'abbia istruita a farlo. Se i sintomi ricompaiono dopo che si erano risolti, consulti un medico prima di ripetere il trattamento se l'arrossamento si estende oltre l'area originariamente trattata ed è presente bruciore.

È da evitare l'uso su un'estesa superficie cutanea (più del 10% della superficie corporea) e su regioni della pelle con assorbimento elevato (ferite aperte, pelle lesa, zone intertriginose (pliche cutanee) di articolazioni e spazi interdigitali delle mani e dei piedi, nonché aree in prossimità delle mucose e attorno agli occhi).

Riferisca al suo medico se si manifestano visione annebbiata o disturbi visivi. Il suo medico deciderà se bisogna rivolgersi a un oculista, per accertare le possibili cause (tra cui opacizzazione del cristallino, glaucoma o altre malattie rare) dei suoi disturbi della vista.

Se soffre di infezioni cutanee di origine batterica o micotica, oppure se un'infezione del genere si manifesta durante il trattamento, il medico deve prescrivere un trattamento aggiuntivo con antibiotici o antimicotici.

Nei bambini di 2-12 anni Diprosone Crema è da usare con prudenza, per un periodo non superiore a 5-7 giorni e su piccole superfici. Nei bambini di età inferiore ai 2 anni, l'uso non è consigliato.

Se Diprosone Crema deve essere usato nei bambini di 2-12 anni, si consiglia uno stretto monitoraggio della terapia da parte del medico, in quanto il principio attivo può essere assorbito dalla pelle e provocare effetti indesiderati.



Durante l'utilizzo di Diprosone Crema, il principio attivo può causare gli stessi effetti indesiderati che potrebbero manifestarsi dopo l'assunzione di corticosteroidi, soprattutto nei lattanti e nei bambini.

Utilizzi Diprosone Crema solo per l'attuale affezione cutanea per la quale il medico le ha prescritto il medicamento e non lo utilizzi per altre malattie cutanee. Non lo dia ad altre persone.

Questo medicamento contiene clorocresolo e alcool cetostearilico. Il clorocresolo può causare reazioni allergiche e l'alcool cetostearilico può causare reazioni sulla pelle localizzate (ad es. dermatite da contatto).

Informi il suo medico o il suo farmacista nel caso in cui:

- soffre di altre malattie,
- soffre di allergie o
- assume altri medicinali (anche se acquistati di sua iniziativa) o li applica esternamente.

Si può usare Diprosone Crema durante la gravidanza o l'allattamento?

Se è incinta, se desidera iniziare una gravidanza o se allatta, usi Diprosone Crema solo dopo aver consultato il suo medico o il suo farmacista. Il medico deciderà se lei potrà utilizzare Diprosone Crema durante la gravidanza o l'allattamento.

Come usare Diprosone Crema?

Diprosone Crema va applicato su pelle grassa o su lesioni essudative della pelle.

Se il medico non prescrive diversamente, applicare 2 volte al giorno (mattina e sera) uno strato sottile sulle parti ammalate della pelle e massaggiare leggermente.

Non modifichi di propria iniziativa la posologia prescritta. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte, ne parli al suo medico o al suo farmacista.

Quali effetti collaterali può avere Diprosone Crema?

Durante l'uso di Diprosone Crema possono comparire i seguenti effetti collaterali: effetti indesiderati locali come irritazioni cutanee, bruciore, arrossamento, secchezza e reazioni di ipersensibilità.

Durante l'impiego su superfici estese e/o per un lungo periodo di tempo o durante l'uso di bendaggi occlusivi non è da escludere la comparsa di alterazioni cutanee locali come assottigliamento della pelle, proliferazione di vasi sanguigni della pelle, strie, acne, la cosiddetta dermatite periorale (infiammazione nella regione della bocca) e squilibri del bilancio ormonale in seguito all'assorbimento del principio attivo attraverso la pelle.

Reazione da sospensione dopo la fine del trattamento: dopo un uso continuato a lungo termine, può comparire una reazione da sospensione dopo la fine del trattamento. Possono comparire uno o più dei seguenti sintomi: arrossamento cutaneo che può estendersi oltre l'area trattata, sensazione di bruciore o di puntura, forte prurito, desquamazione cutanea, vesciche aperte umide.

In seguito all'uso dei corticosteroidi topici, è stata riportata visione annebbiata.

Per quanto riguarda i bambini, in particolare i lattanti e i bambini in età prescolare, occorre tener presente che il principio attivo viene assorbito in maggiore quantità dalla circolazione sanguigna e pertanto, nei trattamenti a lungo termine, possono manifestarsi disturbi della crescita.

Se osserva effetti collaterali, si rivolga al suo medico o al suo farmacista, soprattutto se si tratta di effetti collaterali non descritti in questo foglietto illustrativo.

Di che altro occorre tener conto?

Stabilità

Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con «EXP» sul contenitore.

Istruzioni di conservazione

Conservare a temperatura ambiente (15-25°C).



Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Ulteriori indicazioni

Il medico o il farmacista, che sono in possesso di un'informazione professionale dettagliata, possono darle ulteriori informazioni.

Cosa contiene Diprosone Crema?

Principi attivi

1 g di crema contiene quale principio attivo: 0,5 mg di betametasone (sotto forma di 0,64 mg di betametasone dipropionato).

Sostanze ausiliarie

Clorocresolo, sodio fosfato monobasico diidrato, paraffina liquida, alcool cetostearilico, macrogol cetostearile etere, sodio idrossido, acido fosforico, vaselina bianca, acqua depurata

Numero dell'omologazione

37537 (Swissmedic)

Dov'è ottenibile Diprosone Crema? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia, esclusivamente dietro presentazione della prescrizione medica.

1 tubo da 30 g.

Titolare dell'omologazione

Organon GmbH, Lucerna

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nell'aprile 2025 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

HMV4/RCN100001882

