

## Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo prima di fare uso del medicamento. Questo medicamento le è stato prescritto personalmente e quindi non deve essere consegnato ad altre persone, anche se i sintomi sono gli stessi. Il medicamento potrebbe nuocere alla loro salute.

Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

### **Sanukehl Myc D6, gocce da ingerire e da frizionare**

*Medicamento omeopatico*

#### **Quando si usa Sanukehl Myc D6?**

Secondo la concezione che sta alla base dei medicinali omeopatici, Sanukehl Myc D6 può essere usato su prescrizione del suo medico in caso di eritema nodoso.

L'uso di questo medicamento nel settore d'applicazione citato si basa sui principi di un indirizzo terapeutico omeopatico.

#### **Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?**

Se il suo medico le ha prescritto altri medicinali, chieda al suo medico o al suo farmacista se simultaneamente può assumere/usare Sanukehl Myc D6.

#### **Quando non si può assumere/usare Sanukehl Myc D6 e quando la sua somministrazione/il suo uso richiede prudenza?**

Non sono disponibili esperienze sufficientemente documentate riguardo all'uso di Sanukehl Myc D6 nei bambini e negli adolescenti. Pertanto, il suo uso in bambini e adolescenti sotto i 18 anni non è raccomandato.

Farmaci o terapie immunosoppressive possono compromettere l'efficacia di Sanukehl Myc D6. È necessario mantenere un intervallo di 4 settimane prima e dopo il trattamento con vaccini vivi somministrati per via orale.

Informi il suo medico o il suo farmacista, nel caso in cui

- soffre di altre malattie
- soffre di allergie o
- assume altri medicinali (anche acquistati di sua iniziativa) o li applica esternamente!

#### **Si può assumere/usare Sanukehl Myc D6 durante la gravidanza o l'allattamento?**

In base alle esperienze fatte finora, non sono noti rischi per il bambino se il medicamento è usato correttamente. Tuttavia, non sono ancora state eseguite indagini scientifiche sistematiche. Per prudenza dovrebbe rinunciare nella misura del possibile ad assumere medicinali durante la gravidanza e il periodo d'allattamento o chiedere consiglio al proprio medico o farmacista.

#### **Come usare Sanukehl Myc D6?**

Non modifichi di propria iniziativa la posologia prescritta. Se ritiene che l'effetto del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico o al suo farmacista.

Salvo diversa prescrizione medica, gli adulti di età superiore ai 18 anni prendono: in casi acuti 5–10 gocce ogni 12–24 ore prima di un pasto, in casi cronici 10 gocce ogni 48 ore prima di un pasto.

Da frizionare: 5–10 gocce ogni 1–2 giorni sulla parte colpita o nell'incavo del gomito.



L'uso e la sicurezza di Sanukehl Myc D6 nei bambini e negli adolescenti di età inferiore ai 18 anni non sono stati testati. Pertanto non è raccomandato l'uso nei bambini e negli adolescenti di età inferiore ai 18 anni. Dopo un massimo di 8 settimane di terapia è opportuno fare una pausa del trattamento per alcuni mesi. Anche medicinali omeopatici non dovrebbero essere utilizzati per lunghi periodi di tempo senza il parere del medico.

### **Quali effetti collaterali può avere Sanukehl Myc D6?**

Con l'assunzione/l'applicazione di medicinali omeopatici, i disturbi possono momentaneamente aggravarsi (aggravamento iniziale). Se l'aggravamento dovesse persistere, interrompa il trattamento con Sanukehl Myc D6 e informi il suo medico o il suo farmacista.

A causa del contenuto di componenti organici specifici in Sanukehl Myc D6, in rari casi possono verificarsi reazioni di ipersensibilità.

Se osserva effetti collaterali, si rivolga al suo medico, farmacista, soprattutto se si tratta di effetti collaterali non descritti in questo foglietto illustrativo.

### **Di che altro occorre tener conto?**

#### *Stabilità*

Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con «Verwendbar bis» sul contenitore.

#### *Termine di consumo dopo l'apertura*

Il medicinale deve essere utilizzato entro 60 giorni dall'apertura.

#### *Indicazione di stoccaggio*

Conservare a temperatura ambiente (15-25 °C).

Conservare fuori dalla portata dei bambini.

#### *Ulteriori indicazioni*

Il medico o il farmacista possono darle ulteriori informazioni.

### **Cosa contiene Sanukehl Myc D6?**

1 ml di liquido (22 gocce) contiene:

#### *Principi attivi*

Mycobacterium bovis extractum cellulae (lyophil., steril.) D6 (HAB 5a) 1 ml

#### *Sostanze ausiliarie*

acqua purificata

### **Numero dell'omologazione**

53405 (Swissmedic)

### **Dove è ottenibile Sanukehl Myc D6? Quali confezioni sono disponibili?**

In farmacia, dietro presentazione della prescrizione medica.

Confezione da 10 ml.



**Titolare dell'omologazione**

ebi-pharm ag, Lindachstr. 8c, 3038 Kirchlindach

**Fabbricante**

SANUM-Kehlbeck GmbH & Co. KG, D-27316 Hoya

**Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel aprile 2025 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).**

