

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo, che contiene importanti informazioni.

Questo medicamento le è stato prescritto dal suo medico o le è stato consegnato senza prescrizione medica in farmacia o in drogheria. Per ottenere il maggior beneficio, usi il medicamento conformemente al foglietto illustrativo o segua le indicazioni del suo medico, del suo farmacista o del suo droghiere.

Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

OMIDA® Sciroppo tosse per bambini

Medicamento omeopatico

Quando si usa OMIDA® Sciroppo tosse per bambini?

Secondo la concezione che sta alla base dei medicinali omeopatici OMIDA® Sciroppo tosse per bambini può essere usato in caso di tosse irritativa, tosse bronchiale in seguito a malattie da raffreddamento.

Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?

Se la tosse dura più di 7 giorni, si deve consultare il medico o il farmacista.

Se il suo medico le ha prescritto altri medicinali, chieda al suo medico o al suo farmacista se simultaneamente può assumere OMIDA® Sciroppo tosse per bambini.

Quando non si può assumere OMIDA® Sciroppo tosse per bambini e quando la sua somministrazione richiede prudenza?

La tosse nei bambini sotto i due anni deve essere sottoposta a una diagnosi medica. Il preparato, pertanto, non deve essere usato nei bambini sotto i 2 anni senza consulto medico.

Informi il suo medico, il suo farmacista o il suo droghiere se il bambino

- soffre di altre malattie
- soffre di allergie o
- assume altri medicinali (anche se acquistati di sua iniziativa!)

Come usare OMIDA® Sciroppo tosse per bambini?

Salvo diversa prescrizione medica: bambini fino ad 1 anno: 5 gocce dopo i primi sintomi, massimo 6 volte al giorno. Bambini da 1 a 3 anni: ai primi sintomi 10 gocce, massimo 6 volte al giorno. Bambini da 3 a 6 anni: ai primi sintomi 15 gocce, massimo 6 volte al giorno. Bambini oltre i 6 anni: in caso di sintomi acuti 15 gocce ogni quarto d'ora o ogni mezz'ora. In caso di miglioramento 15 gocce ogni ora. La migliore somministrazione è almeno 10 minuti prima del pasto.

Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal suo medico. Se nel trattamento di un bambino non si ottiene il miglioramento desiderato, lo porti da un medico. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico, al suo farmacista o al suo droghiere.

Quali effetti collaterali può avere OMIDA® Sciroppo tosse per bambini?

Finora non sono stati osservati effetti collaterali in seguito all'uso corretto di OMIDA® Sciroppo tosse per bambini. Se ciononostante osserva effetti collaterali dovrebbe informare il suo medico, il suo farmacista o il



suo droghiere.

Con l'assunzione di medicinali omeopatici, i disturbi possono momentaneamente aggravarsi (aggravamento iniziale). Se l'aggravamento dovesse persistere, interrompa il trattamento con OMIDA® Sciroppo tosse per bambini e informi il suo medico, il suo farmacista o il suo droghiere.

Di che altro occorre tener conto?

Il medicinale non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con «EXP» sul contenitore.

Conservare il medicinale fuori dalla portata dei bambini e a temperatura ambiente (15–25 °C).

Il medico, il farmacista o il droghiere possono darle ulteriori informazioni.

Cosa contiene OMIDA® Sciroppo tosse per bambini?

Antimonium sulphuratum auratum (zolfo dorato) D6, Bryonia (bryonia) D3, Drosera (rosolida) D3, Eucalyptus globulus (eucalipto globoso) D3, Ipecacuanha (ipecacuana) D4, Spongia (spugna di mare) D6 ognuno 0,05 g, excip. ad solut. pro 1 g.

Questo preparato contiene i seguenti sostanze ausiliarie: aqua, glycerolum e xylitolum.

Numero dell'omologazione

57759 (Swissmedic)

Dove è ottenibile OMIDA® Sciroppo tosse per bambini? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia e in drogheria, senza prescrizione medica.

Confezioni da 50 ml.

Titolare dell'omologazione

Schwabe Pharma AG, Erlistrasse 2, 6403 Küssnacht am Rigi

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nell'ottobre 2006 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

