

Information destinée aux patients

Lisez attentivement cette notice d'emballage avant de prendre ou d'utiliser ce médicament. Ce médicament vous a été remis personnellement sur ordonnance médicale. Ne le remettez donc pas à d'autres personnes, même si elles semblent présenter les mêmes symptômes que vous. En effet, ce médicament pourrait nuire à leur santé.

Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

STELARA® solution injectable en stylo prérempli

Janssen-Cilag AG

Qu'est-ce que STELARA et quand doit-il être utilisé?

STELARA contient le principe actif «ustekinumab», un anticorps monoclonal humain. Les anticorps monoclonaux sont des protéines capables de reconnaître certaines protéines de l'organisme et de s'y fixer. STELARA bloque l'action de deux protéines de votre organisme, appelées interleukine 12 (IL-12) et interleukine 23 (IL-23). Ces protéines sont impliquées dans des processus inflammatoires du corps.

STELARA est utilisé selon prescription du médecin:

- pour le traitement du psoriasis en plaques modéré à sévère chez les adultes n'ayant pas répondu à d'autres médicaments ni à la photothérapie ou en cas de contre-indication ou d'intolérance à ces derniers,
- pour le traitement du rhumatisme psoriasique, seul ou en association avec le méthotrexate, chez les adultes n'ayant pas suffisamment répondu à un traitement antérieur,
- et pour le traitement de la maladie de Crohn modérée à sévère active ou de la colite ulcéreuse modérée à sévère active chez les adultes n'ayant pas suffisamment répondu à d'autres médicaments ou en cas de perte de réponse, de contre-indication ou d'intolérance à ces derniers.

Qu'est-ce que le psoriasis en plaques?

Le psoriasis de type psoriasis en plaques est une maladie inflammatoire de la peau et des ongles. STELARA est utilisé pour atténuer les symptômes et les signes inflammatoires de votre maladie.

Qu'est-ce que le rhumatisme psoriasique (arthrite psoriasique)?

Le rhumatisme psoriasique est une maladie inflammatoire des articulations, associée d'une manière générale au psoriasis. STELARA est utilisé pour atténuer les symptômes et les signes de votre maladie et pour améliorer vos capacités fonctionnelles physiques.

Qu'est-ce que la maladie de Crohn ou la colite ulcéreuse?

La maladie de Crohn ou la colite ulcéreuse sont des maladies inflammatoires intestinales. STELARA est utilisé pour réduire les signes et les symptômes de la maladie.

Quand STELARA ne doit-il pas être utilisé?

STELARA ne doit pas être utilisé si vous êtes hypersensible (allergique) à l'ustekinumab ou à une autre substance contenue dans STELARA. Vous trouverez une liste complète de tous les principes actifs et de tous les excipients contenus dans STELARA au chapitre intitulé «Que contient STELARA?».

STELARA ne doit pas non plus être utilisé si vous avez une infection grave telle que p.ex. une tuberculose (voir «Quelles sont les précautions à observer lors de l'utilisation de STELARA?»).

Quelles sont les précautions à observer lors de l'utilisation de STELARA?

Veuillez informer votre médecin avant le traitement de toutes les maladies dont vous souffrez, y compris dans les cas suivants:

- si vous êtes atteint d'infections, même si elles sont très légères.
- si vous avez une plaie ouverte.



- si vous avez été traité précédemment pour une *tuberculose (TB)* ou si vous avez été récemment en contact étroit avec une personne éventuellement atteinte de la tuberculose. Le médecin vous examinera pour rechercher la présence éventuelle d'une tuberculose et effectuera un test permettant le cas échéant d'en prouver l'existence.
- si vous souffrez actuellement d'un *cancer* ou si vous ou votre enfant avez été traité précédemment pour une affection cancéreuse. STELARA appartient à la famille des médicaments affaiblissant l'activité du système immunitaire (défenses immunitaires) et donc susceptibles d'augmenter le risque de cancer.
- si vous avez été *vacciné* récemment ou si une vaccination est prévue prochainement. Informez aussi le médecin si une personne vivant dans votre ménage a besoin d'une vaccination. Les virus contenus dans certains vaccins peuvent se transmettre à des personnes dont le système immunitaire est affaibli et provoquer de graves problèmes de santé.
- si vous recevez ou allez recevoir un immunosuppresseur (un médicament inhibant l'action de votre système immunitaire) ou si vous êtes ou allez être sous photothérapie (un traitement consistant à exposer votre corps à un rayonnement UV spécial). STELARA agit sur le système immunitaire et l'association avec l'une de ces formes de traitement pourrait accroître le risque de maladies dues à un affaiblissement du système immunitaire, même si l'association avec ces formes de traitement n'a pas encore été étudiée.
- si vous recevez ou avez reçu par le passé des injections pour traiter des allergies, en particulier des réactions allergiques graves.
- si vous êtes allergique au latex.

Si vous n'êtes pas certain que l'un des points ci-dessus vous concerne, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien avant d'utiliser STELARA.

Si vous souffrez de psoriasis, il se peut que vous présentiez un risque accru d'infarctus et d'accident vasculaire cérébral. Consultez immédiatement un médecin si vous développez des douleurs thoraciques, une faiblesse ou une sensation anormale d'un côté du corps, un affaissement du visage ou des troubles de l'élocution ou de la vision.

Informez *immédiatement* le médecin au cours du traitement:

- si vous constatez chez vous des infections tenaces ne disparaissant pas, ou des inflammations ayant une forte tendance à réapparaître. Parlez aussi à votre médecin si vous présentez des signes d'infections, tels que fièvre, abattement, toux (récalcitrante), essoufflement, symptômes pseudo-grippaux ou sensations de brûlure en urinant, ou si vous observez des régions de la peau chaudes, rouges ou douloureuses ou des plaies sur le corps. Ces symptômes peuvent indiquer des infections telles que des infections dans la poitrine, des infections cutanées ou encore un zona, susceptibles d'entraîner de graves complications. Il est très important d'en parler à votre médecin, car STELARA peut affaiblir les défenses immunitaires assurant la lutte contre les infections et provoquer ainsi des infections survenant principalement chez les personnes dont le système immunitaire est affaibli (infections opportunistes). Des infections opportunistes du cerveau (encéphalite, méningite), des poumons et de l'œil ont été signalées chez des patients ayant reçu un traitement par ustekinumab. Certaines inflammations pourraient considérablement s'aggraver et peut-être nécessiter un traitement hospitalier.
- si vous constatez la présence de plaies ouvertes d'apparition nouvelle ou changeantes, soit au sein d'une plaque de psoriasis, soit sur la peau saine.
- si vous présentez une éruption cutanée rouge, en relief et squameuse, présentant parfois une bordure foncée, dans des zones de la peau exposées au soleil, ou qui est accompagnée de douleurs articulaires. Chez certains patients, des réactions de type lupus, y compris un lupus cutané ou un syndrome de type lupus, sont survenues pendant le traitement par ustekinumab.
- si vous présentez des symptômes ou des signes de réaction allergique. Ces symptômes et ces signes peuvent comprendre des difficultés respiratoires ou à avaler, une tension artérielle basse susceptible de provoquer des vertiges ou une somnolence, une éruption cutanée, un gonflement du visage, des lèvres, de la bouche ou de la gorge.



- si vous souffrez de maux de tête, de convulsions ou de désorientation.

Certains types de vaccins (vaccins vivants) ne doivent pas être utilisés pendant le traitement par STELARA. Si vous avez reçu STELARA pendant la grossesse, informez le médecin de votre bébé de votre traitement par STELARA avant que le bébé ne reçoive un vaccin quelconque, y compris des vaccins vivants tels que le vaccin BCG (destiné à prévenir la tuberculose), le vaccin contre les rotavirus (destiné à empêcher les maladies gastro-intestinales provoquées par les rotavirus) ou d'autres vaccins vivants. Une exposition excessive au soleil doit être évitée et on appliquera les méthodes habituelles de protection contre les rayons solaires avec notamment l'application d'une crème solaire.

On ne sait actuellement pas si STELARA affecte l'aptitude à la conduite de véhicules et la capacité à utiliser des outils ou des machines.

Veuillez informer votre médecin ou votre pharmacien si vous souffrez d'une autre maladie, si vous ou votre enfant êtes allergique ou si vous ou votre enfant prenez déjà d'autres médicaments en usage interne ou externe (même en automédication!).

STELARA peut-il être utilisé pendant la grossesse ou l'allaitement?

Si vous êtes enceinte ou si vous envisagez une grossesse, veuillez en informer votre médecin avant le traitement. On ignore si STELARA peut affecter la fertilité.

Si vous êtes une femme en âge de procréer, il vous est conseillé de prévenir une grossesse par l'utilisation de méthodes contraceptives fiables pendant le traitement par STELARA et pendant au moins 15 semaines après la fin de ce traitement. Si vous êtes enceinte, votre médecin décidera si le bénéfice de l'utilisation de STELARA l'emporte clairement sur les risques potentiels.

L'ustekinumab peut passer dans le lait maternel en très faible quantité. Consultez votre médecin si vous allaitez ou si vous avez l'intention d'allaiter. Vous et votre médecin devez décider si vous devez plutôt interrompre STELARA pendant que vous allaitez ou si vous devez poursuivre le traitement de STELARA et ne pas allaiter.

Comment utiliser STELARA?

Dans le traitement du psoriasis en plaques et du rhumatisme psoriasique, STELARA est injecté sous la peau («sous-cutané»).

Dans le traitement de la maladie de Crohn ou de la colite ulcéreuse, la première dose de STELARA est administrée par le personnel médical sous la forme d'une perfusion intraveineuse, puis les doses suivantes sont données par injections sous-cutanées.

Le traitement par STELARA doit être administré selon les directives et sous la surveillance de votre médecin.

Le médecin peut décider de vous laisser faire les injections de STELARA vous-même ou de demander à votre soignant de vous les faire. Vous et votre soignant recevrez dans ce cas une formation quant à la technique d'injection de STELARA. Si vous avez des questions au sujet des auto-injections ou si vous avez des doutes, adressez-vous à votre médecin. Si vous effectuez les injections sous-cutanées de STELARA vous-même, administrez STELARA en vous conformant toujours scrupuleusement aux instructions de votre médecin.

Pour des informations complètes sur la technique d'injection, lisez «*Mode d'emploi pour l'injection sous-cutanée (sous la peau) de STELARA stylo prérempli*».

L'utilisation de STELARA stylo prérempli n'a pas été testée chez les enfants et les adolescents et elle n'est pas recommandée dans cette population de patients. Pour les enfants et les adolescents à partir de 6 ans atteints de psoriasis, il convient d'utiliser STELARA seringue préremplie ou STELARA flacon perforable.

Demandez conseil à votre médecin en cas de doute. Convenez avec votre médecin des jours d'injections et des rendez-vous de contrôle.

Psoriasis en plaques (adultes)

La dose habituellement recommandée est de 45 mg en injection sous-cutanée, suivie d'une nouvelle dose de 45 mg 4 semaines plus tard, puis toutes les 12 semaines. Chez les patients dont le poids corporel



dépasse 100 kg, le médecin décidera s'il convient d'appliquer des doses plus élevées.

Rhumatisme psoriasique (adultes)

La dose habituellement recommandée est de 45 mg en injection sous-cutanée, suivie d'une nouvelle dose de 45 mg 4 semaines plus tard, puis toutes les 12 semaines. En cas de réponse insuffisante, votre médecin décidera s'il convient d'appliquer des doses plus élevées.

Maladie de Crohn ou colite ulcéreuse (adultes)

La première dose est donnée par perfusion intraveineuse. Une dose de 90 mg sera administrée par voie sous-cutanée 8 semaines après la première dose intraveineuse. Une dose de 90 mg sera administrée 12 semaines plus tard, puis toutes les 12 semaines. Votre médecin décidera s'il convient de réduire l'intervalle entre les injections à 8 semaines.

Ne changez pas de votre propre chef le dosage prescrit. Adressez-vous à votre médecin ou à votre pharmacien si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte.

Si vous avez utilisé plus de STELARA que vous n'auriez dû (soit par l'injection d'une dose trop importante, soit par des injections trop fréquentes), parlez-en immédiatement à votre médecin ou votre pharmacien. Emportez toujours avec vous l'emballage original du médicament, même s'il est vide.

Si vous avez oublié une injection de STELARA, informez-en votre médecin ou votre pharmacien. N'injectez pas une double dose si vous avez oublié la dose précédente.

Quels effets secondaires STELARA peut-il provoquer?

L'utilisation de STELARA peut provoquer les effets secondaires graves figurant ci-dessous. Consultez *immédiatement* votre médecin si vous observez l'apparition des effets indésirables suivants chez vous:

- des signes de réaction allergique ou de réaction d'hypersensibilité grave, tels que des difficultés à respirer ou à avaler, une tension artérielle basse, des vertiges ou une somnolence, un gonflement du visage, des lèvres, de la bouche ou de la gorge entraînant des troubles respiratoires ou de la déglutition, une éruption cutanée, une urticaire, un gonflement des mains, des pieds ou des chevilles,
- des signes de réactions allergiques pulmonaires et d'inflammation pulmonaire tels que toux, difficultés respiratoires et fièvre,
- des signes d'infections (y compris la tuberculose), par exemple une fièvre, un abattement, une toux (récalcitrante), un essoufflement, des symptômes grippaux, des sudations nocturnes, une perte de poids, des diarrhées, des plaies, des problèmes dentaires, des troubles de la vue ou une perte de vision, des maux de tête, une raideur de la nuque, une sensibilité à la lumière, des nausées, une confusion ou une sensation de brûlure en urinant,
- une desquamation (une peau qui pèle) – de fortes rougeurs et une desquamation de la peau sur une surface relativement importante du corps peuvent être des signes de psoriasis érythrodermique ou de dermatite exfoliative (érythrodermie), autrement dit deux réactions cutanées graves.

L'utilisation de STELARA peut aussi provoquer les effets secondaires suivants:

Fréquent (concerne 1 à 10 personnes sur 100)

Infection des voies respiratoires supérieures, inflammation de la gorge, vertiges, maux de tête, douleurs dans la cavité bucco-pharyngée, sinusite, diarrhées, nausées, vomissements, démangeaisons, mal de dos, douleurs musculaires ou articulaires, épuisement, rougeurs et/ou douleurs au site d'injection.

Occasionnel (concerne 1 à 10 personnes sur 1000)

Inflammation des dents, inflammation du tissu sous-cutané se traduisant par une surface cutanée plus chaude, zona (herpes zoster), infections virales des voies aériennes supérieures, infections des voies aériennes inférieures, infections fongiques (champignons) vulvovaginales, réactions d'hypersensibilité, dépression, obstruction nasale, acné, modification du psoriasis avec rougeur et apparition nouvelle de minuscules vésicules blanchâtres à jaunâtres, parfois associées à de la fièvre (psoriasis pustuleux),



desquamation (exfoliation) de la peau, réactions au site d'injection (entre autres saignement, hématome, durcissement, tuméfaction et démangeaisons), fatigue, paupière tombante et muscles affaiblis sur un côté du visage («paralysie faciale» ou «paralysie dite de Bell»), ce qui est généralement temporaire.

Rare (concerne 1 à 10 personnes sur 10'000)

Réactions graves, telles que réactions allergiques, gonflement rapide de la peau ou des muqueuses (angioœdème), inflammation vasculaire allergique (vascularite d'hypersensibilité), réaction pulmonaire allergique et inflammation pulmonaire se manifestant p.ex. par une toux, des difficultés respiratoires et de la fièvre.

Très rare (concerne moins d'une personne sur 10 000)

Lupus cutané ou syndrome de type lupus (éruption rouge, en relief et squameuse sur des parties de la peau exposées au soleil, pouvant être accompagnée de douleurs articulaires).

Si vous remarquez des effets secondaires, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien. Ceci vaut en particulier pour les effets secondaires non mentionnés dans cette notice d'emballage.

À quoi faut-il encore faire attention?

Stabilité

Le médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention «EXP» sur le récipient.

Remarques concernant le stockage

Conserver au réfrigérateur (2-8 °C). Ne pas congeler.

Conserver dans l'emballage d'origine pour protéger la solution de la lumière.

Si nécessaire, les stylos préremplis individuels de STELARA peuvent être conservés dans l'emballage d'origine à température ambiante (jusqu'à 30 °C) pendant une période unique ne dépassant pas 30 jours. Notez la date à laquelle le stylo prérempli a été retiré du réfrigérateur ainsi que la nouvelle date de péremption aux endroits prévus à cet effet sur la boîte. La nouvelle date de péremption ne doit pas dépasser la date de péremption initiale imprimée sur l'emballage.

Dès lors qu'un stylo prérempli a été conservé à température ambiante, il ne doit pas être remis au réfrigérateur. Jetez tout stylo prérempli conservé à température ambiante s'il n'a pas été utilisé dans les 30 jours.

N'utilisez pas STELARA si vous savez ou si vous supposez que le médicament a été exposé à des températures extrêmes (p.ex. congélation ou réchauffement involontaire).

Conserver hors de portée des enfants.

Remarques complémentaires

STELARA ne doit pas être agité. Une forte agitation prolongée de la solution pourrait affecter le médicament. N'utilisez pas le médicament s'il a été fortement secoué.

La solution pour injection de STELARA est incolore ou de couleur légèrement jaunâtre et peut contenir quelques petites particules protéiques transparentes ou de couleur blanche. Cet aspect est parfaitement normal pour des solutions contenant des protéines. Si la solution est trouble ou a changé de couleur ou si elle contient d'autres corps étrangers en suspension, il ne faut pas utiliser STELARA.

N'utilisez pas STELARA si le sceau n'est plus intact.

STELARA ne doit pas être mélangé avec d'autres solutions injectables.

Le stylo prérempli est exclusivement destiné à un usage unique. Les restes de solution de STELARA doivent être jetés. Le stylo prérempli ne doit EN AUCUN CAS être réutilisé.

Ne pas jeter le médicament avec les eaux usées ou avec les déchets ménagers.

Demandez à votre pharmacien comment éliminer le médicament lorsque vous n'en avez plus besoin. Cette mesure contribue à la protection de l'environnement.



Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin ou votre pharmacien, qui disposent d'une information détaillée destinée aux professionnels.

Que contient STELARA?

Principes actifs

STELARA contient le principe actif ustekinumab.

Chaque stylo prérempli contient 45 mg (45 mg dans 0,5 ml) ou 90 mg (90 mg dans 1 ml) d'ustekinumab.

Excipients

STELARA contient les excipients suivants: saccharose, L-histidine, polysorbate 80 et eau pour injection.

Numéro d'autorisation

69382 (Swissmedic).

Où obtenez-vous STELARA? Quels sont les emballages à disposition sur le marché?

En pharmacie, sur ordonnance médicale.

STELARA solution injectable en stylo prérempli 45 mg/0,5 ml.

STELARA solution injectable en stylo prérempli 90 mg/1 ml.

Titulaire de l'autorisation

Janssen-Cilag AG, Zoug, ZG.


Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en juillet 2024 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).

Mode d'emploi pour l'injection sous-cutanée (sous la peau) de STELARA stylo prérempli

Veillez lire la notice d'emballage (information destinée aux patients) et le présent mode d'emploi dans leur INTÉGRALITÉ avant d'utiliser un stylo prérempli Stelara.

Important

- STELARA est disponible en stylo prérempli contenant une dose de 45 mg ou de 90 mg.



Afin d'administrer la dose complète, enfoncez la poignée entièrement vers le bas pendant l'injection, jusqu'à ce que le boîtier violet (corps de l'injecteur) ne soit plus visible. Ne tirez PAS le STYLO PRÉREMPLI vers le haut pendant l'injection! Sinon, le stylo prérempli sera verrouillé et vous ne recevrez pas la dose complète.

- Ne vous injectez pas STELARA tant que vous n'avez pas ou un soignant n'a pas suivi une formation dispensée par un professionnel de santé.
- Chaque stylo prérempli ne peut être utilisé qu'une seule fois. Jetez le stylo (voir étape 3) après utilisation, même s'il contient encore un peu de médicament.



- Ne réutilisez pas le stylo prérempli.
- Afin de prévenir le risque de piqûres d'aiguille accidentelles, chaque stylo prérempli est équipé d'une protection d'aiguille, qui recouvre et verrouille automatiquement l'aiguille dès que l'injection a été administrée et que l'injecteur est tiré vers le haut. Ne tirez pas le stylo prérempli vers le haut avant que l'injection soit terminée.
- Le couvercle de l'aiguille à l'intérieur du capuchon inférieur du stylo prérempli contient du latex. **Si vous êtes allergique au latex, faites bien attention de ne pas toucher le couvercle de l'aiguille.**




Vous avez besoin d'aide?

Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.

Éléments de l'injecteur du stylo prérempli

Avant utilisation



Ne pas toucher l'intérieur.

Après utilisation



Ne tirez pas l'injecteur vers le haut pendant l'injection.



Matériel nécessaire :


Fourni :

- Injecteur du stylo prérempli

Non fourni :

- Tampon imbibé d'alcool
- Tampon d'ouate ou compresse de gaze
- Pansement
- Récipient résistant à la perforation (voir étape 3)

1. Préparation avant l'injection de STELARA



Préparer le ou les emballages

Si le ou les emballages sont conservés au réfrigérateur, retirez-les du réfrigérateur avec le stylo prérempli et placez-le ou les sur une surface plane.

Laissez l'emballage à température ambiante **pendant au moins 30 minutes** avant utilisation.

Ne pas réchauffer d'une autre manière, par exemple avec de l'eau chaude ou dans un four micro-ondes.


Ne pas agiter le stylo prérempli.

Pour une dose de 45 mg, vous recevrez un stylo prérempli contenant une dose de 45 mg.

Pour une dose de 90 mg, vous recevrez un stylo prérempli contenant une dose de 90 mg ou deux stylos préremplis contenant chacun une dose de 45 mg. Si vous recevez deux stylos préremplis contenant chacun une dose de 45 mg, suivez les étapes 1–3 pour les deux injections.

Choisissez un site d'injection différent pour la deuxième injection.





Vérifiez la date de péremption et les sceaux sur le ou les emballages.

N'utilisez **pas** le stylo prérempli si les sceaux placés sur l'emballage ne sont plus intacts ou si la date de péremption est dépassée.

N'utilisez **pas** votre stylo prérempli s'il a été conservé pendant plus de 30 jours à température ambiante ou s'il a été conservé à une température supérieure à 30 °C. Demandez un nouvel emballage à votre médecin ou à votre pharmacien.



Choisir le site d'injection

Choisissez l'une des zones suivantes pour l'injection:

- Face avant de la cuisse
- Partie inférieure de l'abdomen en respectant une distance de 5 cm autour du nombril.

Si c'est une autre personne qui réalise l'injection, les zones suivantes peuvent aussi être utilisées:


- Dos du bras

Ne **pas** réaliser l'injection dans des zones où la peau est sensible, contusionnée, rouge ou durcie. Évitez d'injecter dans les zones où il y a des cicatrices ou des vergetures.

Si vous souffrez de psoriasis, évitez d'injecter directement dans les zones de la peau qui sont gonflées, épaisses, rouges ou squameuses ou dans les lésions.

Choisir un site d'injection différent pour chaque injection.





Lavage des mains

Lavez-vous soigneusement les mains à l'eau chaude et au savon.

Nettoyage du site d'injection

Nettoyez le site d'injection choisi avec un tampon imbibé d'alcool et laissez sécher.

Après nettoyage, ne **pas** ventiler le site d'injection, ne **pas** souffler dessus et ne **pas** le toucher.



Examen du liquide par la fenêtre

Choisissez une surface de travail bien éclairée, propre et plane.


Sortez le stylo prérempli de son emballage et vérifiez qu'il est intact.

Examinez le liquide par la fenêtre. Le liquide doit être **transparent et incolore** à **légèrement jaunâtre** et peut contenir de **très petites particules blanches ou transparentes**, ainsi que des **bulles d'air**. Ceci est normal.

N'injectez **pas** le liquide s'il est congelé, trouble ou coloré ou s'il contient des particules de grande taille. Demandez un nouvel emballage à votre médecin ou à votre pharmacien.

2. Injection de STELARA






Retirez le capuchon inférieur

Veillez à **ne pas toucher la protection de l'aiguille avec les mains** après avoir retiré le capuchon. Il est tout à fait normal que quelques gouttes de liquide soient visibles.

Injectez STELARA dans les 5 minutes suivant le retrait du capuchon.

Ne remettez **pas** le capuchon en place. L'aiguille pourrait être endommagée.

Si le stylo prérempli tombe après le retrait du capuchon, ne l'utilisez **pas**. Demandez un nouvel emballage à votre médecin ou à votre pharmacien.



Placez l'injecteur verticalement contre la peau. Enfoncez entièrement la poignée vers le bas, jusqu'à ce que le boîtier violet (corps de l'injecteur) ne soit plus visible.

NE TIREZ PAS LE STYLO PRÉREMPLI VERS LE HAUT pendant l'injection!


Si l'injecteur est tiré vers le haut pendant l'injection, la protection de l'aiguille est verrouillée, la bande jaune est visible et vous ne recevez pas la dose complète.

Vous pourrez entendre un clic au début de l'injection. Continuez à enfoncer.

Continuez aussi à enfoncer si vous ressentez une résistance. Ceci est normal.




Le médicament est administré lorsque vous enfoncez. Adoptez une vitesse d'injection qui est confortable pour vous.



Assurez-vous que l'injection est terminée.

L'injection est terminée lorsque:

- **le boîtier violet (corps de l'injecteur) n'est plus visible.**
- vous ne pouvez plus continuer à enfoncer la poignée.
- vous entendez éventuellement un clic.



Tirez verticalement vers le haut

Une bande jaune apparaît, qui indique que la protection de l'aiguille est verrouillée.

3. Après l'injection





Jetez le stylo prérempli

Jetez le stylo prérempli immédiatement après utilisation dans un récipient résistant à la perforation.

Ne jetez **pas** le stylo prérempli avec les ordures ménagères.

Ne réutilisez **pas** le récipient résistant à la perforation.

Discutez avec votre médecin ou votre pharmacien pour savoir comment éliminer correctement le stylo prérempli.



Vérifiez le site d'injection

Vous pourrez voir un peu de sang ou de liquide sur le site d'injection. Ceci est normal. Appliquez un tampon d'ouate ou une compresse de gaze sur le site d'injection jusqu'à ce que le saignement s'arrête.

Ne frottez **pas** le site d'injection.

Si besoin, couvrez le site d'injection avec un pansement.

Si, pour une dose totale de 90 mg, vous avez reçu deux stylos préremplis contenant chacun une dose de 45 mg, répétez les étapes 1–3 pour le deuxième stylo prérempli. **Choisissez un site d'injection différent pour la deuxième injection.**

