

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo che contiene importanti informazioni.

Questo medicamento le è stato prescritto dal suo medico o le è stato consegnato senza prescrizione medica in farmacia o in drogheria. Per ottenere il maggior beneficio, usi il medicamento conformemente al foglietto illustrativo o segua le indicazioni del suo medico, del suo farmacista o del suo droghiere.

Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

Levocetirizin Spirig HC® Compresse rivestite

Spirig HealthCare AG

Che cos'è Levocetirizin Spirig HC e quando si usa?

Levocetirizin Spirig HC è efficace nel trattamento di base delle malattie allergiche. Il preparato blocca l'effetto dell'istamina, che viene liberata nell'organismo durante le reazioni allergiche. Levocetirizin Spirig HC è utilizzato negli adulti e nei bambini a partire da 12 anni di età per il trattamento di affezioni allergiche come il raffreddore da fieno, la rinite allergica e la congiuntivite di origine allergica, nonché l'orticaria cronica (che spesso si accompagna a prurito).

Levocetirizin Spirig HC è disponibile in compresse rivestite.

Quando non si può assumere Levocetirizin Spirig HC?

Non devono usare il preparato i pazienti che presentano un'ipersensibilità nei confronti del principio attivo, di altre sostanze di struttura analoga o di un altro componente di Levocetirizin Spirig HC.

I pazienti che necessitano dialisi, che hanno un'insufficienza renale in fase terminale (tasso di filtrazione glomerulare stimata inferiore a 15 ml/min), non devono assumere Levocetirizin Spirig HC.

Quando è richiesta prudenza nell'uso di Levocetirizin Spirig HC?

Levocetirizin Spirig HC non deve essere somministrato a bambini di età inferiore a 12 anni.

Non sono note interazioni di Levocetirizin Spirig HC con altri medicinali. In ogni caso, è consigliabile non fare uso di alcolici durante il trattamento con Levocetirizin Spirig HC, perché potrebbero potenziarne l'azione.

Gli epilettici devono assumere Levocetirizin Spirig HC con cautela, perché potrebbe scatenare attacchi convulsivi.

Se ha una predisposizione alla ritenzione urinaria (incapacità di svuotare spontaneamente la vescica), per esempio a causa di una lesione del midollo spinale o a causa di ipertrofia prostatica, lo comunichi al suo medico.

Le compresse rivestite di Levocetirizin Spirig HC contengono lattosio. Se il medico le ha diagnosticato una intolleranza ad alcuni zuccheri, lo contatti prima di prendere questo medicamento.

Questo medicamento può ridurre la capacità di reazione, la capacità di condurre un veicolo e la capacità di utilizzare attrezzi o macchine!

Durante la guida di un veicolo a motore o l'uso di macchinari prestare la massima attenzione, poiché Levocetirizin Spirig HC potrebbe indurre una maggiore sonnolenza.

Prestare attenzione se Levocetirizin Spirig HC è assunto con alcolici.

Informi il suo medico, il suo farmacista o il suo droghiere nel caso in cui

- soffra di altre malattie,
- soffra di allergie o
- assuma o applichi esternamente altri medicinali (anche se acquistati di sua iniziativa).

Si può usare Levocetirizin Spirig HC durante la gravidanza o l'allattamento?



In studi clinici molto limitati e in esperimenti condotti su animali non sono stati osservati effetti indesiderati. Tuttavia, Levocetirizin Spirig HC – come altri medicinali – non deve essere assunto durante la gravidanza. Qualora lei abbia assunto per inavvertenza Levocetirizin Spirig HC durante la gravidanza, non deve temere alcun effetto dannoso per il nascituro; tuttavia, è opportuno che interrompa immediatamente il trattamento. Informi il suo medico se ha in corso o in programma una gravidanza.

Levocetirizin Spirig HC non deve essere assunto durante l'allattamento, poiché si suppone che il principio attivo passi nel latte materno. Effetti collaterali associati a Levocetirizin Spirig HC possono verificarsi nei neonati allattati al seno.

Come usare Levocetirizin Spirig HC?

Per gli adulti e i bambini da 12 anni di età in poi

Il dosaggio usale è di 1 compressa rivestita al giorno.

Levocetirizin Spirig HC può essere assunto durante o fuori dei pasti. La compressa rivestita deve essere assunta senza masticarla, con del liquido.

Bambini sotto i 12 anni

Nei bambini di età inferiore ai 12 anni, le compresse Levocetirizin Spirig HC non forniscono la regolazione del dosaggio necessaria per questa fascia d'età. In questo caso si raccomanda l'uso di un preparato a base di levocetirizina, che consente un dosaggio più basso (ad es. gocce con il principio attivo levocetirizina).

La durata del trattamento, che dipende dal tipo, dalla persistenza e dall'evoluzione dei disturbi, viene stabilita dal medico.

A pazienti con funzionalità renale limitata (insufficienza renale), se necessario, si somministra una dose più bassa, che si basa sulla gravità della malattia renale e viene stabilita dal medico curante.

Se ha dimenticato di assumere una dose, continui con la posologia prescritta. Non prenda una dose doppia per compensare l'assunzione dimenticata.

Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal medico. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico, al suo farmacista o al suo droghiere.

Quali effetti collaterali può avere Levocetirizin Spirig HC?

Con l'assunzione di Levocetirizin Spirig HC possono manifestarsi i seguenti effetti collaterali:

Comune (riguarda da 1 a 10 persone su 100)

Stanchezza e sonnolenza, secchezza della bocca, cefalea e mancanza di forze (astenia).

Non comune (riguarda da 1 a 10 persone su 1000)

Dolori addominali.

Frequenza non nota (non può essere definita sulla base dei dati disponibili).

In casi isolati sono stati riportati anche reazioni d'ipersensibilità (gonfiori delle labbra, della lingua e delle palpebre, prurito, eruzioni cutanee infiammatorie), fotosensibilità della pelle, edemi, parestesie (disturbi della percezione cutanea che si manifestano come «pizzicori», «formicolii» ecc.), disturbi gastro-intestinali, palpitazione cardiaca, crampi, crampi agli occhi, disturbi della vista, dolori muscolari, dolori articolari, comportamento aggressivo o irrequieto, insonnia, ideazione suicidaria, incubi, epatite, disturbi della funzionalità epatica, vomito, aumento dell'appetito, allucinazioni, depressione, capogiro, tremore, perdita di conoscenza, alterazioni del gusto, aumento di peso, tenesmo vescicale (forte stimolo a urinare) e ritenzione urinaria.

In un numero molto limitato di pazienti è stato osservato prurito dopo interruzione dell'assunzione di Levocetirizin Spirig HC.

Se ritiene di soffrire di uno di questi effetti indesiderati, interrompa immediatamente l'assunzione di Levocetirizin Spirig HC ed informi il suo medico curante.



Se osserva effetti collaterali, si rivolga al suo medico, al suo farmacista o al suo droghiere, soprattutto se si tratta di effetti collaterali non descritti in questo foglietto illustrativo.

Di che altro occorre tener conto?

Stabilità

Il medicamento non deve essere utilizzato oltre la data indicata con «EXP» sul contenitore.

Istruzioni di conservazione

Conservare a temperatura ambiente (15–25°C), nella confezione originale e fuori dalla portata dei bambini.

Indicazioni per lo smaltimento

Non gettare i medicinali nell'acqua di scarico o nei rifiuti domestici. I medicinali scaduti o non più necessari, in uso nelle economie domestiche, possono essere consegnati nelle farmacie o nei punti di raccolta. Queste misure aiutano a proteggere l'ambiente.

Ulteriori indicazioni

Il medico, il farmacista o il droghiere, che sono in possesso di un'informazione professionale dettagliata, possono darle ulteriori informazioni.

Cosa contiene Levocetirizin Spirig HC?

Principi attivi

1 compressa rivestita contiene 5 mg del principio attivo levocetirizina dicloridrato.

Sostanze ausiliarie

Lattosio monoidrato 64 mg, cellulosa microcristallina, magnesio stearato.

Rivestimento con film:

Ipromellosa, titanio diossido (E 171), macrogol 400.

Numero dell'omologazione

62920 (Swissmedic)

Dov'è ottenibile Levocetirizin Spirig HC? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia e in drogheria senza presentazione medica.

Confezioni da 10, 30 o 50 compresse rivestite.

Titolare dell'omologazione

Spirig HealthCare SA, 4622 Egerkingen

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nell'agosto 2022 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

