

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo che contiene importanti informazioni. Questo medicamento le è stato prescritto dal suo medico o le è stato consegnato senza prescrizione medica in farmacia o in drogheria. Faccia uso corretto del medicamento o segua le indicazioni del suo medico, del suo farmacista o del suo droghiere, al fine di ottenere il maggior beneficio. Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

Plak-Out Liquid

Che cos'è Plak-Out Liquid e quando si usa?

Un'igiene orale meccanica inadeguata o difficoltosa comporta una formazione eccessiva di placca causata da depositi batterici sulla superficie dei denti. Questi depositi batterici possono anche causare gengive infiammate, sanguinanti, arrossate e doloranti. La cloressidina contenuta nel concentrato per risciacqui orali Plak-Out Liquid è indicata per l'igiene orale grazie all'azione inibitrice della formazione dei depositi batterici (placca) sulla superficie dei denti. La cloressidina, sostanza ad azione antisettica, svolge azione battericida e fungicida. Plak-Out Liquid è indicato in presenza di scarsa igiene del cavo orale, nelle infiammazioni del letto dentale, nei casi di carie acute e di igiene orale difficoltosa.

Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?

L'uso del Plak-Out Liquid non sostituisce la pulizia meccanica dei denti, ma può rappresentare un valido ausilio. Plak-Out Liquid contiene alcol.

Quando non si può usare Plak-Out Liquid?

Plak-Out Liquid contiene cloressidina che, in casi molto rari, può provocare allergie. Segnali tipici sono prurito, generale arrossamento cutaneo, orticaria, asma o singole reazioni circolatorie. Tali sintomi richiedono sempre l'immediato consulto medico. Non utilizzare Plak-Out Liquid nei casi conosciuti di allergia alla cloressidina nonché in caso di ipersensibilità a una delle sostanze contenute.

Quando è richiesta prudenza nell'uso di Plak-Out Liquid?

Non è pericoloso deglutire accidentalmente della soluzione di risciacquo, poiché la cloressidina non viene assorbita nel tratto gastro-intestinale. Non usare il concentrato per risciacqui orali a base di cloressidina in combinazione con paste o soluzioni dentifricie poiché la cloressidina può essere inattivata. In presenza di infiammazioni radicolari si raccomanda di usare il prodotto con cautela.

Questo medicamento contiene un aroma a sua volta contenente: d-limonene, geraniolo et linalolo. Questi allergeni possono causare reazioni allergiche.

Questo medicamento contiene 0.02 mg di alcol (etanolo) per dose di 2 gocce corrispondenti a 388 mg/ml (45% v/v). In caso di cute lesa, è possibile che venga avvertito bruciore.

Informi il suo medico, il suo farmacista o droghiere nel caso in cui soffre di altre malattie, soffre di allergie, assume o applica (per uso esterno) altri medicinali (anche se acquistati di sua iniziativa)!

Si può usare Plak-Out Liquid durante la gravidanza o l'allattamento?

Plak-Out Liquid può essere utilizzato durante la gravidanza o l'allattamento soltanto su prescrizione medica.

Come usare Plak-Out Liquid?



Se non prescritto diversamente dal medico, preparare le soluzioni di risciacquo nel modo seguente:

0.05% Con il contagocce versare nel misurino 2 gocce di Plak-Out Liquid ed aggiungere acqua fino alla tacca (10 ml)

0.1% 4 gocce in 10 ml d'acqua

0.15% 6 gocce in 10 ml d'acqua

0.2% 8 gocce in 10 ml d'acqua

Eseguire i risciacqui al mattino ed alla sera, dopo la pulizia dei denti. Cominciare con soluzioni allo 0.05% per 15 secondi, poi sputare. Nella maggior parte dei casi nei giorni seguenti si può già aumentare la concentrazione allo 0.1% e quindi allo 0.15%; parimenti si può prolungare la durata dei risciacqui a 3-4 minuti. In presenza di infezioni acute del cavo orale (stomatite ulcerosa), arrivare al più presto possibile a risciacqui con soluzioni allo 0.2%, per 3 volte al giorno. In presenza di infiammazioni delle mucose o di elevata incidenza della carie, iniziare con una concentrazione allo 0.1%, 3 volte al giorno, e aumentare progressivamente allo 0.15% e poi allo 0.2%. Non sono ancora stati sperimentati l'uso e la sicurezza di Plak-Out Liquid su bambini e ragazzi di età inferiore a 18 anni. Si sconsiglia di utilizzare Plak-Out Liquid per più di 2 settimane senza interruzioni, se non previa raccomandazione del medico o del dentista. Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal medico. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico, al suo farmacista o al suo droghiere.

Quali effetti collaterali può avere Plak-Out Liquid?

Con l'applicazione di Plak-Out Liquid possono manifestarsi i seguenti effetti collaterali:

Comune (riguarda da 1 a 10 utilizzatori su 100):

Spesso sulla lingua si osservano colorazioni brune, non pericolose che sono solo un problema estetico.

Con l'uso prolungato si formano spesso sui denti colorazioni che scompaiono nella maggior parte dei casi a trattamento terminato. Eventuali depositi di color giallo/bruno che si formano gradualmente negli spazi interdentali, possono essere facilmente eliminati dal dentista o dall'igienista dentale.

Non comune (riguarda da 1 a 10 utilizzatori su 1000):

Occasionalmente dopo l'uso di cloressidina possono verificarsi alterazioni del gusto.

Se osserva effetti collaterali, si rivolga al suo medico, farmacista o droghiere, soprattutto se si tratta di effetti collaterali non descritti in questo foglietto illustrativo.

Di che altro occorre tener conto?

Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con "EXP" sulla confezione.

Indicazione di stoccaggio

Conservare a temperatura ambiente (15-25°C) e fuori dalla portata dei bambini.

Ulteriori indicazioni

Il medico, il farmacista o il droghiere possono darle ulteriori informazioni.

Cosa contiene Plak-Out Liquid?

1 ml di concentrato per soluzione per mucosa orale contiene:

Principi attivi

Cloressidina digluconato 100 mg.

Sostanze ausiliarie



Alcol (45% v/v), aromi (contiene d-limonene, geraniolo e linalolo), acqua purificata.

Numero dell'omologazione

38989 (Swissmedic)

Dove è ottenibile Plak-Out Liquid? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia e in drogheria senza prescrizione medica.

Flacone con contagocce da 10 ml di concentrato per soluzione per mucosa orale e misurino da 10 ml (attualmente non in commercio).

Titolare dell'omologazione

Tapadar GmbH, CH-5600 Lenzburg

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel settembre 2020 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

