

Was ist Laxipeg banane/- aromafrei und wann wird es angewendet?

Laxipeg banane/- aromafrei ist ein osmotisch wirksames Abführmittel aus Macrogol, welches eine Stuhlregulierung bei Verstopfung ermöglicht. Macrogol ist ein unverdaulicher Stoff, welcher Wasser an sich bindet. Dadurch wird die Darmtätigkeit angeregt, der Stuhl weicher und gleitfähiger. Der Stuhlgang wird somit erleichtert.

Laxipeg banane/- aromafrei wird bei Erwachsenen und Kindern zur Regulierung des Stuhlgangs bei Darmträgheit und Verstopfung verschiedener Herkunft eingesetzt (Obstipation).

Was sollte dazu beachtet werden?

Laxipeg banane/- aromafrei enthält weder Zucker noch Polyole und kann daher auch von Diabetikern oder Patienten, die eine Galactose-freie Diät anwenden, eingenommen werden.

Wenn Sie an Verstopfung leiden, sollten Sie ballaststoffreiche Nahrung (Gemüse, Früchte, Vollkornbrot) sowie viel und regelmässig Flüssigkeit zu sich nehmen und auf körperliche Betätigung (Sport) achten.

Wann darf Laxipeg banane/- aromafrei nicht eingenommen werden?

Laxipeg banane/- aromafrei darf nicht eingenommen werden bei bekannter Überempfindlichkeit gegenüber einem der Inhaltsstoffe, bei schweren entzündlichen Darm- und Dickdarmerkrankungen (z.B. Colitis ulcerosa, Morbus Crohn), einer Störung der Darmpassage infolge einer Darmlähmung oder eines Darmverschlusses (Ileus), bei einem Darmdurchbruch (Perforation), oder der Gefahr eines Darmdurchbruchs, bei Schmerzen im Bauchraum unbestimmten Ursprungs.

Wann ist bei der Einnahme von Laxipeg banane/- aromafrei Vorsicht geboten?

Bei Kindern im Alter von 6 Monaten bis 2 Jahren und mit einem Körpergewicht von mindestens 6 kg darf das Arzneimittel nur nach Rücksprache mit dem Arzt, bzw. der Ärztin angewendet werden. Bei jüngeren, bzw. leichteren Kindern soll Laxipeg banane/- aromafrei nicht angewendet werden.

Wenn die Symptome der Verstopfung nach 2 Wochen bestehen bleiben, sollten Sie Ihren Arzt/Ihre Ärztin aufsuchen.

Ältere Patienten, Patienten mit gestörter Leber- oder Nierenfunktion und Patienten, die Diuretika einnehmen, sollten beim Auftreten von Durchfällen einen Arzt kontaktieren, damit dieser eine Kontrolle der Elektrolyte in Erwägung zieht.

Die Wirksamkeit einiger Arzneimittel, wie beispielsweise Antiepileptika, Digoxin, Immunsuppressiva und Blutverdünner, kann während der Einnahme von Laxipeg banane/- aromafrei verringert werden.

Sie sollten andere Arzneimittel nicht gleichzeitig mit Laxipeg banane/- aromafrei einnehmen, sondern in einem zeitlichen Abstand von mindestens 1 Stunde.

Wenn Sie Flüssigkeiten eindicken müssen, um sie sicher schlucken zu können, kann Laxipeg banane/- aromafrei der Wirkung des Verdickungsmittels entgegenwirken.

Informieren Sie Ihren Arzt, Apotheker oder Drogisten bzw. Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin, wenn Sie

- an anderen Krankheiten leiden,
- Allergien haben oder
- andere Arzneimittel (auch selbst gekaufte!) einnehmen oder äusserlich anwenden.

Darf Laxipeg banane/- aromafrei während einer Schwangerschaft oder in der Stillzeit eingenommen werden?

Aufgrund der bisherigen Erfahrungen ist bei bestimmungsgemässer Anwendung kein Risiko für das Kind bekannt. Systematische wissenschaftliche Untersuchungen wurden aber nie durchgeführt. Vorsichtshalber sollten Sie während der Schwangerschaft möglichst auf Arzneimittel verzichten oder Ihren Arzt, Apotheker



oder Drogisten bzw. Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin um Rat fragen.

Der Wirkstoff wird vom Verdauungstrakt nicht aufgenommen und geht demzufolge nicht in den Blutkreislauf oder die Muttermilch über.

Laxipeg banane/- aromafrei kann in der Stillzeit eingenommen werden.

Wie verwenden Sie Laxipeg banane/- aromafrei?

Allgemeine Informationen

Kinder sollten Laxipeg banane/- aromafrei nicht länger als 3 Monate einnehmen.

Die Dosis kann je nach erzielter Wirkung angepasst werden.

Die Tagesdosis kann in einer Gabe oder auf zwei Gaben verteilt auf nüchternen Magen eingenommen werden.

Die gesamte Menge sollte recht schnell (innerhalb weniger Minuten) und nicht in kleinen Schlucken über längere Zeit getrunken werden.

Eine flüssigkeitsreiche Diät begünstigt die Wirkung des Arzneimittels.

Soweit vom Arzt bzw. von der Ärztin nicht anders verschrieben:

Beutel:

Erwachsene und Kinder über 8 Jahre und mit einem Gewicht über 20 kg

1-2 Beutel täglich.

Die Dosis von maximal 20 g Pulver pro Tag nicht überschreiten.

Die angegebene Dosis muss dem individuellen Ansprechen angepasst werden.

Den Inhalt eines Beutels in mindestens 125 ml (1 Glas) Wasser auflösen. Bei Laxipeg aromafrei kann auch ein anderes Getränk gewählt werden.

Keine weiteren Zutaten hinzufügen.

Dose:

Erwachsene und Kinder über 8 Jahre und mit einem Gewicht über 20 kg

4-8 volle Messlöffel am Tag (ein gestrichener Messlöffel enthält 2,5 g Pulver).

Die Tageshöchstdosis von 20 g Pulver nicht überschreiten.

Kinder unter 8 Jahren bzw. mit einem Gewicht unter 20 kg

Die übliche Anfangsdosis beträgt 0,7 g/kg am Tag.

Bei Kindern im Alter von 6 Monaten bis 2 Jahren und mit einem Körpergewicht von mindestens 6 kg darf das Arzneimittel nur nach Rücksprache mit dem Arzt, bzw. der Ärztin angewendet werden. Bei jüngeren, bzw. leichteren Kindern soll Laxipeg banane/- aromafrei nicht angewendet werden.

Tabelle zum Berechnen der Laxipeg banane/- aromafrei-Dosis für Kinder bis zu 20 kg:

Körpergewicht (kg)	Tagesdosis	Anzahl Messlöffel
6-9	5 g	2
>9-13	7,5 g	3
>13-16	10 g	4
>16-20	12,5 g	5



Die angegebene Dosis muss dem individuellen Ansprechen angepasst werden. Eine Erhöhung oder Verminderung der in der Tabelle angegebenen Dosis um 1 Messlöffel kann empfohlen werden.

Der Inhalt des Messlöffels (2,5 g) wird in mindestens einem halben Glas Wasser aufgelöst (ca. 60 ml). Bei Laxipeg aromafrei kann auch ein anderes Getränk gewählt werden.

Keine weiteren Zutaten hinzufügen.

Halten Sie sich an die in der Packungsbeilage angegebene oder vom Arzt bzw. von der Ärztin verschriebene Dosierung. Wenn Sie glauben, das Arzneimittel wirke zu schwach oder zu stark, so sprechen Sie mit Ihrem Arzt, Apotheker oder Drogisten bzw. mit Ihrer Ärztin, Apothekerin oder Drogistin.

Welche Nebenwirkungen kann Laxipeg banane/- aromafrei haben?

Folgende Nebenwirkungen können bei der Einnahme von Laxipeg banane/- aromafrei auftreten: Durchfall, Bauchschmerzen, Blähungen, Übelkeit, und/oder Erbrechen. Es wurde in Einzelfällen über Überempfindlichkeitsreaktionen berichtet, die sehr selten bis hin zu allergischen Haut- und Schockerscheinungen (angioneurotisches Ödem) führen können.

Das Auftreten von Durchfall und der gewöhnlich folgende Drang zur Stuhlentleerung und Stuhlinkontinenz, ist Zeichen einer zu hohen Dosierung. Diese Nebenwirkungen klingen in der Regel ab, wenn die Dosis reduziert oder die Behandlung vorübergehend unterbrochen wird. Durchfall kann Wundsein am After verursachen.

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt, Apotheker oder Drogisten bzw. Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin. Dies gilt insbesondere auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind.

Was ist ferner zu beachten?

Haltbarkeit

Das Arzneimittel darf nur bis zu dem auf dem Behälter mit «EXP» bezeichneten Datum verwendet werden.

Aufbrauchfrist nach Anbruch

Das Arzneimittel in der Dose ist nach dem Öffnen 90 Tage haltbar.

Lagerungshinweis

In der Originalverpackung bei Raumtemperatur (15–25 °C) und für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Weitere Hinweise

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen Ihr Arzt, Apotheker oder Drogist, bzw. Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin. Diese Personen verfügen über die ausführliche Fachinformation.

Was ist in Laxipeg banane/- aromafrei enthalten?

Wirkstoffe

Laxipeg banane:

1 Beutel mit Pulver zum Einnehmen als Lösung enthält 9,736 g Macrogolum 4000.

1 Dose mit Pulver zum Einnehmen als Lösung enthält 194,72 g Macrogolum 4000.

Laxipeg aromafrei:

1 Beutel mit Pulver zum Einnehmen als Lösung enthält 10,00 g Macrogolum 4000.

1 Dose mit Pulver zum Einnehmen als Lösung enthält 200,00 g Macrogolum 4000.

Hilfsstoffe

Laxipeg banane:



1 Beutel mit Pulver zum Einnehmen als Lösung enthält Süsstoff: Acesulfamum-Kalium (E950), Aromatica: Bananenaroma.

1 Dose mit Pulver zum Einnehmen als Lösung enthält Süsstoff: Acesulfamum-Kalium (E950), Aromatica: Bananenaroma.

Laxipeg aromafrei:

1 Beutel mit Pulver zum Einnehmen als Lösung enthält keine Hilfsstoffe.

1 Dose mit Pulver zum Einnehmen als Lösung enthält keine Hilfsstoffe.

Zulassungsnummer

62765 (Swissmedic).

Wo erhalten Sie Laxipeg banane/- aromafrei? Welche Packungen sind erhältlich?

In Apotheken und Drogerien, ohne ärztliche Verschreibung.

Folgende Packungen sind erhältlich:

Laxipeg banane:

20 und 100 Beutel Pulver zum Einnehmen als Lösung zu 10 g.

1 Dose Pulver zum Einnehmen als Lösung zu 200 g und ein Messlöffel.

Laxipeg aromafrei:

20 und 100 Beutel Pulver zum Einnehmen als Lösung zu 10 g.

1 Dose Pulver zum Einnehmen als Lösung zu 200 g und ein Messlöffel.

Zulassungsinhaberin

Zambon Schweiz AG, 6814 Cadempino

Diese Packungsbeilage wurde im Juni 2025 letztmals durch die Arzneimittelbehörde (Swissmedic) geprüft.

