

Che cos'è Laxipeg banane/- senza aroma e quando si usa?

Laxipeg banane/- senza aroma è un lassativo ad azione osmotica a base di macrogol che consente di regolare il transito intestinale in caso di stitichezza. Macrogol è una sostanza non digeribile che lega l'acqua. Ne risulta uno stimolo dell'attività intestinale, le feci diventano più morbide e più facili da evacuare. Il transito intestinale viene quindi facilitato.

Laxipeg banane/- senza aroma viene utilizzato per adulti e bambini per regolare il transito intestinale in caso d'intestino pigro e stitichezza di diversa origine (costipazione).

Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?

Laxipeg banane/- senza aroma non contiene né zuccheri né polioli e può quindi essere assunto da diabetici o pazienti sottoposti ad un regime dietetico privo di galattosio.

Se soffre di stitichezza, dovrebbe consumare alimenti ricchi di fibre (verdura, frutta, pane integrale), bere tanto e regolarmente e praticare attività fisica (sport).

Quando non si può assumere Laxipeg banane/- senza aroma?

Laxipeg banane/- senza aroma non può essere assunto in caso d'ipersensibilità nota a uno dei componenti, in caso di gravi malattie infiammatorie dell'intestino e del colon (ad es. colite ulcerosa, morbo di Crohn), disturbo del passaggio intestinale dovuto a paralisi intestinale o occlusione intestinale (ileo), perforazione o rischio di perforazione intestinale, dolori addominali di origine sconosciuta.

Quando è richiesta prudenza nell'uso di Laxipeg banane/- senza aroma?

Nei bambini di età compresa tra i 6 mesi e i 2 anni e con un peso corporeo di almeno 6 kg, il medicamento può essere utilizzato solo dopo aver consultato il medico. Laxipeg banane/- senza aroma non deve essere utilizzato in bambini più giovani o di peso inferiore a 6 kg.

Se i sintomi della stitichezza persistono per più di 2 settimane, consulti il suo medico.

I pazienti anziani ed i pazienti con insufficienza renale o epatica che assumono diuretici, in caso di comparsa della diarrea, devono consultare un medico affinché valuti la necessità di controllare gli elettroliti.

L'efficacia di alcuni medicinali, come gli antiepilettici, la digossina, gli immunosoppressori e gli anticoagulanti, può essere ridotta durante l'assunzione di Laxipeg banane/- senza aroma.

Non deve assumere altri medicinali contemporaneamente a Laxipeg banane/- senza aroma, ma con un intervallo di tempo di almeno 1 ora.

Se ha bisogno d'addensare liquidi per poterli deglutire in modo sicuro, Laxipeg banane/- senza aroma può contrastare l'effetto dell'addensante.

Informi il suo medico, il suo farmacista o il suo droghiere nel caso in cui

- soffre di altre malattie,
- soffre di allergie o
- assume altri medicinali (anche se acquistati di sua iniziativa) o li applica esternamente.

Si può usare Laxipeg banane/- senza aroma durante la gravidanza o l'allattamento?

In base alle esperienze fatte finora, non sono noti rischi per il bambino se il medicamento è usato correttamente. Tuttavia, non sono mai state eseguite indagini scientifiche sistematiche. Per prudenza dovrebbe rinunciare nella misura del possibile ad assumere medicinali durante la gravidanza o chiedere consiglio al suo medico, al suo farmacista o al suo droghiere.

Il principio attivo non viene assorbito dal tratto digerente e di conseguenza non passa nella circolazione sanguigna o nel latte materno.



Laxipeg banane/- senza aroma può essere assunto durante l'allattamento.

Come usare Laxipeg banane/- senza aroma?

Informazioni generali

I bambini non dovrebbero assumere Laxipeg banane/- senza aroma per più di 3 mesi.

La dose può essere adeguata in funzione dell'effetto raggiunto.

La dose giornaliera può essere assunta a digiuno in una o due prese.

È preferibile bere l'intera quantità abbastanza rapidamente (nell'arco di pochi minuti), evitando di sorvegliarla per lungo tempo.

Una dieta ricca di liquidi favorisce l'effetto del medicamento.

Se non diversamente prescritto dal medico:

Bustine:

Adulti e bambini di età superiore a 8 anni e di peso superiore ai 20 kg

1-2 bustine al giorno.

Non superare il dosaggio massimo giornaliero di 20 g di polvere.

La dose indicata deve essere adattata in base alla risposta individuale.

Sciogliere il contenuto di una bustina in almeno 125 ml (1 bicchiere) di acqua. Per Laxipeg senza aroma può essere scelta anche un'altra bevanda.

Non aggiungere altri ingredienti.

Flacone:

Adulti e bambini di età superiore a 8 anni e di peso superiore ai 20 kg

4-8 misurini pieni al giorno (un misurino raso contiene 2,5 g di polvere).

Non superare il dosaggio massimo giornaliero di 20 g di polvere.

Bambini di età inferiore a 8 anni e con un peso inferiore ai 20 kg

La dose iniziale abituale è di 0,7 g/kg al giorno.

Nei bambini di età compresa tra i 6 mesi e i 2 anni e con un peso corporeo di almeno 6 kg, il medicamento può essere utilizzato solo dopo aver consultato il medico. Nei bambini più giovani o di peso inferiore, Laxipeg banane/- senza aroma non deve essere utilizzato.

Tabella per il calcolo della dose di Laxipeg banane/- senza aroma per bambini fino a 20 kg di peso:

Peso corporeo (kg)	Dose giornaliera	Numero di misurini
6-9	5 g	2
>9-13	7,5 g	3
>13-16	10 g	4
>16-20	12,5 g	5

La dose indicata deve essere adattata in base alla risposta individuale. Aumentare o ridurre di 1 misurino la dose indicata nella tabella può essere raccomandato.



Sciogliere il contenuto del misurino (2,5 g) in almeno mezzo bicchiere di acqua (ca. 60 ml). Per Laxipeg senza aroma può essere scelta anche un'altra bevanda.

Non aggiungere altri ingredienti.

Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal suo medico. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte, ne parli al suo medico, al suo farmacista o al suo droghiere.

Quali effetti collaterali può avere Laxipeg banane/- senza aroma?

Con l'assunzione di Laxipeg banane/- senza aroma possono manifestarsi i seguenti effetti collaterali: diarrea, dolori addominali, flatulenza, nausea, e/o vomito. In singoli casi sono state riferite reazioni da ipersensibilità che, molto raramente, possono arrivare a provocare fenomeni allergici a livello della pelle e sotto forma di shock (edema angioneurotico).

La comparsa di diarrea e lo stimolo di evacuazione urgente e incontinenza fecale che ne consegue, è segno di un dosaggio troppo elevato. Normalmente questi effetti collaterali scompaiono nel momento in cui la dose viene ridotta o il trattamento temporaneamente sospeso. La diarrea può causare una lesione rettale.

Se osserva effetti collaterali, si rivolga al suo medico, farmacista o droghiere, soprattutto se si tratta di effetti collaterali non descritti in questo foglietto illustrativo.

Di che altro occorre tener conto?

Stabilità

Il medicamento non deve essere utilizzato oltre la data indicata con «EXP» sul contenitore.

Termine di consumo dopo l'apertura

Il medicamento nel flacone si conserva per 90 giorni dopo l'apertura.

Istruzioni di conservazione

Conservare nella confezione originale, a temperatura ambiente (15-25 °C) e tenere fuori dalla portata dei bambini.

Ulteriori indicazioni

Il suo medico, il suo farmacista o il suo droghiere, che sono in possesso di un'informazione professionale dettagliata, possono darle ulteriori informazioni.

Cosa contiene Laxipeg banane/- senza aroma?

Principi attivi

Laxipeg banane:

1 bustina di polvere da assumere come soluzione contiene 9,736 g di macrogol 4000.

1 flacone di polvere da assumere come soluzione contiene 194,72 g di macrogol 4000.

Laxipeg senza aroma:

1 bustina di polvere da assumere come soluzione contiene 10,00 g di macrogol 4000.

1 flacone di polvere da assumere come soluzione contiene 200,00 g di macrogol 4000.

Sostanze ausiliarie

Laxipeg banane:

1 bustina di polvere da assumere come soluzione contiene un edulcorante: acesulfame potassico (E950), aromi: aroma banana.



1 *flacone* di polvere da assumere come soluzione contiene un edulcorante: acesulfame potassico (E950),
aromi: aroma banana.

Laxipeg senza aroma:

1 *bustina* di polvere da assumere come soluzione non contiene sostanze ausiliarie.

1 *flacone* di polvere da assumere come soluzione non contiene sostanze ausiliarie.

Numero dell'omologazione

62765 (Swissmedic).

Dov'è ottenibile Laxipeg banane/- senza aroma? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia e in drogheria, senza prescrizione medica.

Sono disponibili le seguenti confezioni:

Laxipeg banane:

20 e 100 *bustine* di polvere da assumere come soluzione da 10 g.

1 *flacone* di polvere da assumere come soluzione da 200 g e un misurino.

Laxipeg senza aroma:

20 e 100 *bustine* di polvere da assumere come soluzione da 10 g.

1 *flacone* di polvere da assumere come soluzione da 200 g e un misurino.

Titolare dell'omologazione

Zambon Svizzera SA, 6814 Cadempino

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel giugno 2025 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

