

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo prima di assumere o fare uso del medicamento. Questo medicamento le è stato prescritto personalmente e quindi non deve essere consegnato ad altre persone, anche se i sintomi sono gli stessi. Il medicamento potrebbe nuocere alla loro salute. Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

Livazo®

Che cos'è Livazo e quando si usa?

Livazo contiene un principio attivo chiamato pitavastatina, che appartiene a un gruppo di sostanze medicinali chiamate «statine».

Livazo è usato per il trattamento del livello dei grassi nel sangue (livello di colesterolo) e può essere assunto sia dai bambini di età pari o superiore a 6 anni sia dagli adulti. Il medico le ha prescritto Livazo perché le è stato riscontrato uno squilibrio nel metabolismo dei grassi che non è stato possibile correggere con un cambiamento della dieta ed eventuali altre misure (ad es. movimento). Durante il trattamento con Livazo deve continuare a seguire la dieta per ridurre il colesterolo.

Livazo può essere ottenuto esclusivamente dietro prescrizione medica.

Quando non si può assumere/usare Livazo?

Livazo non deve essere assunto:

- se è allergico (ipersensibile) alla pitavastatina, ad altre statine o ad uno qualsiasi degli eccipienti di Livazo (vedere anche «Che cosa contiene Livazo?»).
- se è in stato di gravidanza, o pensa di poter restare incinta e non usa un metodo contraccettivo affidabile, o se sta allattando (vedere «Si può usare Livazo durante la gravidanza o l'allattamento?»).
- se ha attualmente problemi al fegato;
- se prende la ciclosporina (un medicamento utilizzato dopo un trapianto d'organo);
- se ha dolori muscolari frequenti o inspiegabili.

In caso di dubbi, consulti il medico o il farmacista prima di assumere Livazo.

Quando è richiesta prudenza nella somministrazione/nell'uso di Livazo?

Livazo non dovrebbe alterare la capacità di guidare veicoli o di utilizzare macchinari. Tuttavia, il trattamento con Livazo potrebbe provocare capogiri. In questo caso, non guidi e non usi macchinari o utensili.

Prima di iniziare il trattamento, informi il suo medico o farmacista,

- se ha una grave insufficienza polmonare (seri problemi di respirazione);
- se ha o ha avuto in passato problemi ai reni;
- se ha avuto in passato problemi al fegato. In un ristretto gruppo di soggetti, le «statine» possono influire sul fegato. Il medico le prescriverà dunque un esame del sangue (test della funzione epatica) prima e nel corso del trattamento con Livazo;
- se ha o ha avuto in passato problemi alla tiroide;
- se lei o un suo familiare ha o ha avuto in passato malattie muscolari;
- se ha avuto precedenti di malattie muscolari durante l'assunzione di altri medicinali che abbassano il colesterolo (ad es. statine o fibrati);
- nel caso faccia un consumo eccessivo di alcolici;



- se ha o ha avuto la miastenia (una malattia caratterizzata da debolezza muscolare generalizzata, compresa, in alcuni casi, la debolezza dei muscoli respiratori) o la miastenia oculare (una malattia che causa debolezza dei muscoli oculari), poiché le statine possono talvolta aggravare questa malattia o causarne la comparsa (cfr. «Quali effetti collaterali può avere Livazo?»).

Se rientra in uno dei casi sopra citati (o in caso di dubbi), consulti il medico o il farmacista prima di assumere Livazo.

Se avverte una debolezza muscolare persistente, consulti il medico o il farmacista. Sono forse necessarie ulteriori analisi per effettuare una diagnosi o una terapia con medicinali.

Informi il medico se sta assumendo uno dei seguenti medicinali:

- medicinali detti «fibrati», come gemfibrozil e fenofibrato
- eritromicina, acido fusidico o rifampicina, antibiotici usati contro le infezioni
- medicinali per diluire il sangue
- medicinali utilizzati per il trattamento dell'HIV chiamati «inibitori delle proteasi»
- niacina (vitamina B3).
- medicinali contenenti i principi attivi glencaprevir e pibrentasvir, utilizzati per il trattamento dell'epatite C. Il medico potrebbe dover aggiustare la dose di Livazo.

Se rientra in uno dei casi sopra citati (o in caso di dubbi), consulti il medico o il farmacista prima di assumere Livazo.

Livazo contiene lattosio (un particolare tipo di zucchero). I pazienti affetti da rari problemi ereditari di intolleranza al galattosio, da deficit totale di lattasi o da malassorbimento di glucosio-galattosio non devono assumere questo medicinale.

Durante il trattamento con Livazo il medico controllerà se manifesta i sintomi del diabete o sussiste il rischio che sviluppi il diabete. Questo rischio è maggiore in presenza di elevati livelli di zuccheri e di grassi nel sangue, nelle persone in sovrappeso o che soffrono di ipertensione.

Bambini e adolescenti

L'uso e la sicurezza di Livazo nei bambini sotto i 6 anni finora non sono stati esaminati.

Prima di utilizzare Livazo le adolescenti devono essere consigliate e istruite in merito ai metodi contraccettivi.

Informi il suo medico o il suo farmacista, nel caso in cui

- soffre di altre malattie,
- soffre di allergie o
- assume altri medicinali (anche se acquistati di sua iniziativa) o li applica esternamente.

Si può assumere/usare Livazo durante la gravidanza o l'allattamento?

Non assuma Livazo se è in stato di gravidanza o durante l'allattamento. In caso di gravidanza sopravvenuta durante il trattamento con Livazo, sospenda immediatamente il trattamento e consulti il medico. Le donne in età fertile dovrebbero fare uso di un metodo contraccettivo affidabile durante il trattamento con Livazo. Se ha intenzione di iniziare una gravidanza, consulti il medico prima di assumere Livazo.

Come usare Livazo?

Non modifichi di propria iniziativa la posologia prescritta. Se ritiene che l'azione del medicinale sia troppo debole o troppo forte, ne parli al suo medico o al suo farmacista.



La compressa rivestita deve essere ingerita intera, con un bicchiere d'acqua, a stomaco pieno o a stomaco vuoto. Può prenderla alla mattina o alla sera, tuttavia cerchi di assumerla ogni giorno alla stessa ora.

- La dose iniziale è solitamente di 1 mg una volta al giorno. Dopo alcune settimane, il medico può decidere di aumentare la dose. La dose massima è 4 mg al giorno per gli adulti e i bambini sopra i 10 anni.
- Se soffre di una malattia epatica, non deve superare la dose di 2 mg al giorno.
- Se soffre di una grave malattia renale, non deve superare la dose di 2 mg al giorno.

Bambini e adolescenti

- La dose massima per i bambini sotto i 10 anni è 2 mg al giorno.
- In caso di necessità, subito prima dell'assunzione le compresse possono essere sciolte in un bicchiere d'acqua; riempire quindi nuovamente il bicchiere con acqua per sciacquarlo e bere immediatamente. Non sciogliere Livazo in succhi di frutta o latte.
- L'uso e la sicurezza di Livazo nei bambini sotto i 6 anni finora non sono stati esaminati.

Altre informazioni importanti sul trattamento con Livazo:

- In caso di ricovero in ospedale o di trattamento per un'altra patologia, informi il personale medico che sta assumendo Livazo.
- Il suo medico eseguirà controlli periodici sul livello di colesterolo.
- Non interrompa il trattamento con Livazo senza avere consultato il medico: i livelli di colesterolo potrebbero aumentare.

Se ha assunto una quantità di compresse rivestite di Livazo superiore a quella prescritta:

Se ha assunto una quantità di compresse rivestite di Livazo superiore a quella prescritta, informi immediatamente il medico.

Se ha dimenticato di prendere una dose di Livazo:

Prenda la dose successiva prescritta all'ora giusta. Non prenda una dose doppia.

Quali effetti collaterali può avere Livazo?

Interrompa *immediatamente* il trattamento con Livazo e consulti il medico se si verifica uno dei seguenti effetti collaterali gravi. Potrebbe essere necessario anche un trattamento medico urgente:

- reazione allergica, che si può manifestare sotto forma di: difficoltà respiratoria, gonfiore del viso, delle labbra, della lingua o della gola, difficoltà di deglutizione, prurito intenso alla pelle;
- dolore o debolezza muscolare inspiegabile, soprattutto in caso di malessere, febbre o urine di colore marrone-rossastro. Livazo causa raramente effetti muscolari indesiderati, i quali tuttavia, se trascurati, possono provocare l'insorgere di problemi seri, quali un anomalo degrado muscolare (rabbdomiolisi), che può causare a sua volta una malattia renale;
- difficoltà respiratorie, anche con tosse persistente e/o affanno o febbre.

Sono stati riscontrati anche i seguenti effetti indesiderati:

Comune (riguarda da 1 a 10 utilizzatori su 100)

- dolori articolari, dolori muscolari
- stitichezza, diarrea, disturbi digestivi, nausea
- cefalea

Non comune (riguarda da 1 a 10 utilizzatori su 1000)



- crampi muscolari
- sensazione di debolezza, stanchezza, malessere
- gonfiore delle caviglie, dei piedi o delle dita delle mani
- dolori addominali, bocca secca, senso di malessere, perdita dell'appetito, vomito, alterazione del gusto
- pallore e sensazione di debolezza o affanno (anemia)
- prurito o eruzione cutanea
- ronzio alle orecchie
- vertigini, stanchezza, insonnia (altri disturbi del sonno, inclusi incubi)
- aumento della frequenza urinaria
- disturbi della sensibilità

Raro (riguarda da 1 a 10 utilizzatori su 10 000)

- malattie al fegato che possono causare ingiallimento della pelle e degli occhi (ittero)
- dolore intenso all'addome e alla schiena a causa di una pancreatite
- pelle arrossata, gonfia o pruriginosa
- peggioramento della vista
- dolore alla lingua
- fastidio al ventre (addome)
- ingrossamento della mammella negli uomini (ginecomastia)

Singoli casi

- debolezza muscolare persistente
- sindrome simile al lupus (comprendente eruzione cutanea, disturbi articolari ed effetti sulle cellule del sangue)

Altri possibili effetti collaterali

- perdita di memoria
- disturbi a livello sessuale
- depressione
- diabete: il rischio di sviluppare il diabete è maggiore in presenza di elevati livelli di zuccheri e di grassi nel sangue, nelle persone in sovrappeso o che soffrono di ipertensione. Il suo medico terrà sotto controllo i sintomi durante l'assunzione di Livazo.

Frequenza non nota (non può essere definita sulla base dei dati disponibili)

miastenia gravis (una malattia caratterizzata da debolezza muscolare generalizzata, compresa, in alcuni casi, la debolezza dei muscoli respiratori), miastenia oculare (una malattia che causa debolezza dei muscoli oculari).

Si rivolga al medico se manifesta una sensazione di debolezza alle braccia o alle gambe che peggiora dopo periodi di attività, visione doppia o abbassamento delle palpebre, disturbi della deglutizione o respiro affannoso.

Se osserva effetti collaterali, si rivolga al suo medico o farmacista, soprattutto se si tratta di effetti collaterali non descritti in questo foglietto illustrativo.



Di che altro occorre tener conto?

Il medicamento non deve essere utilizzato oltre la data indicata con «EXP» sul contenitore.

Istruzioni di conservazione

Non conservare a temperatura superiore a 25 °C.

Conservare i blister nella confezione originale per proteggere il contenuto dalla luce. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Ulteriori indicazioni

Le compresse rivestite sono rotonde, bianche e contrassegnate dalle lettere «KC» su un lato. Per poter distinguere chiaramente i dosaggi hanno dimensioni diverse e sull'altro lato sono contrassegnate con il numero «1», «2» o «4».

I medicinali non devono essere smaltiti nelle acque di scarico o nei rifiuti domestici. Chieda al suo farmacista come smaltire un medicamento quando non ne ha più bisogno. Questa misura aiuta a proteggere l'ambiente.

Il suo medico o il suo farmacista, che sono in possesso di un'informazione professionale dettagliata, possono darle ulteriori informazioni.

Cosa contiene Livazo?

Principi attivi

Pitavastatina sotto forma di pitavastatina calcica (compresse rivestite con film da 1 mg, 2 mg e 4 mg).

Sostanze ausiliarie

Nucleo della compressa

Lattosio monoidrato

Idrossipropilcellulosa

Ipromellosa (E 464)

Alluminio magnesio silicato

Magnesio stearato

Film di rivestimento

Ipromellosa (E 464)

Titanio diossido (E 171)

Trietile citrato (E 1505)

Silice colloidale anidra

Numero dell'omologazione

62329 (Swissmedic).

Dove è ottenibile Livazo? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia, dietro presentazione della prescrizione medica.

Livazo compresse rivestite con film da 1 mg, 2 mg e 4 mg è disponibile in confezioni da 30 e 90 compresse.

Titolare dell'omologazione



RECORDATI AG, 4057 Basel

Fabbricante

Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA, Milano, Italia.

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel febbraio 2025 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

