

Information für Patientinnen und Patienten

Lesen Sie diese Packungsbeilage sorgfältig, bevor Sie das Arzneimittel einnehmen. Dieses Arzneimittel ist Ihnen persönlich verschrieben worden und Sie dürfen es nicht an andere Personen weitergeben. Auch wenn diese die gleichen Krankheitssymptome haben wie Sie, könnte das Arzneimittel ihnen schaden. Bewahren Sie die Packungsbeilage auf, Sie wollen sie vielleicht später nochmals lesen.

Notakehl D5, Tropfen

Homöopathisches Arzneimittel

Wann wird Notakehl D5, Tropfen angewendet?

Gemäß homöopathischem Arzneimittelbild kann Notakehl D5, Tropfen auf Verschreibung Ihres Arztes oder Ihrer Ärztin bei eitrigen Hautaffektionen angewendet werden.

Was sollte dazu beachtet werden?

Wenn Ihnen Ihr Arzt oder Ihre Ärztin andere Arzneimittel verschrieben hat, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker bzw. Ihre Ärztin oder Apothekerin, ob Notakehl D5, Tropfen gleichzeitig eingenommen werden darf.

Wann darf Notakehl D5, Tropfen nicht oder nur mit Vorsicht angewendet werden?

Zur Einnahme von Notakehl D5, Tropfen bei Kinder unter 12 Jahren und zur Einreibung und Inhalation bei Kinder und Jugendlichen unter 18 Jahren liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Die Anwendung bei Kinder unter 12 Jahren bzw. unter 18 Jahren wird daher nicht empfohlen. Nicht anwenden bei bestehender Allergie auf Penicillin oder ähnliche Substanzen sowie bei bekannter Überempfindlichkeit gegenüber Schimmelpilzen (*Penicillium chrysogenum*) und Autoimmunerkrankungen.

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker bzw. Ihre Ärztin oder Apothekerin, wenn Sie

- an anderen Krankheiten leiden
- Allergien haben oder
- andere Arzneimittel (auch selbstgekaufte) einnehmen oder äußerlich anwenden.

Darf Notakehl D5, Tropfen während einer Schwangerschaft oder in der Stillzeit eingenommen werden?

Auf Grund der bisherigen Erfahrungen ist bei bestimmungsgemäßer Anwendung kein Risiko für das Kind bekannt. Systematische wissenschaftliche Untersuchungen wurden aber nie durchgeführt. Vorsichtshalber sollten Sie während der Schwangerschaft und Stillzeit möglichst auf Arzneimittel verzichten oder den Arzt oder den Apotheker bzw. die Ärztin oder die Apothekerin um Rat fragen.

Wie verwenden Sie Notakehl D5, Tropfen?

Dosierung / Anwendung:

Zum Einnehmen:

Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren: 1 mal täglich 8 Tropfen vor einer Mahlzeit

Zum Einreiben: Erwachsene 1 mal täglich 5-10 Tropfen am Ort der Erkrankung oder in die Ellenbeuge einreiben.



Zum Inhalieren: Erwachsene: 5 Tropfen des Arzneimittels in 2,5ml NaCl Inhalationslösung 0.9% geben.

Diese Mischung 1-2 mal täglich mittels eines Inhalationsgeräts (Vernebler) inhalieren.

Ändern Sie nicht von sich aus die verschriebene Dosierung. Wenn Sie glauben, das Arzneimittel wirke zu schwach oder zu stark, so sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker bzw. Ihrer Ärztin oder Apothekerin. Nach längstens 4 Wochen Therapiedauer sollte Notakehl® D5, Tropfen abgesetzt werden.

Welche Nebenwirkungen kann Notakehl D5, Tropfen haben?

Es besteht die Möglichkeit, dass eine Allergie gegen den Bestandteil *Penicillium chrysogenum* ausgelöst wird. Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, die hier nicht beschrieben sind, informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker bzw. Ihre Ärztin oder Apothekerin. Bei Einnahme von homöopathischen Arzneimitteln können sich die Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). Bei andauernder Verschlechterung setzen Sie Notakehl D5, Tropfen ab und informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker bzw. Ihre Ärztin oder Apothekerin.

Was ist ferner zu beachten?

Das Arzneimittel darf nur bis zu dem auf dem Behälter mit „verwendbar bis“ bezeichneten Datum verwendet werden. Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren. Bei Raumtemperatur (15-25 °C) aufbewahren. Weitere Auskünfte erteilt Ihnen Ihr Arzt, Apotheker bzw. Ihre Ärztin, Apothekerin.

Was ist in Notakehl D5, Tropfen enthalten?

1ml Lösung enthält:

1 ml *Penicillium chrysogenum* D5 aquos. dilutio (HAB, 5a).

Zulassungsnummer

50294 (Swissmedic)

Wo erhalten Sie Notakehl D5, Tropfen? Welche Packungen sind erhältlich?

In Apotheken nur gegen ärztliche Verschreibung.

Packung zu 10 ml.

Zulassungsinhaberin

ebi-pharm ag, Lindachstr. 8c, 3038 Kirchlindach

Diese Packungsbeilage wurde im April 2017 letztmals durch die Arzneimittelbehörde (Swissmedic) geprüft.

