

Information destinée aux patients

Lisez attentivement la notice d'emballage avant de prendre le médicament. Ce médicament vous a été remis sur ordonnance médicale. Ne le remettez donc pas à d'autres personnes, même si elles semblent présenter les mêmes symptômes que vous. En effet, ce médicament pourrait nuire à leur santé. Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

Notakehl D5, Gouttes

Médicament homéopathique

Quand Notakehl D5, gouttes est-il utilisé?

Selon la conception homéopathique, Notakehl D5, gouttes peut être utilisé sur ordonnance médicale en cas de dermatose purulente.

De quoi faut-il tenir compte en dehors du traitement?

Si votre médecin vous a prescrit d'autres médicaments, demandez à votre médecin ou à votre pharmacien si Notakehl D5, gouttes peut être pris simultanément.

Quand Notakehl D5, gouttes ne doit-il pas être utilisé ou seulement avec précaution?

On ne dispose pas d'expériences suffisamment documentées concernant la prise de Notakehl D5, gouttes chez les enfants âgés de moins de 12 ans et leur utilisation en friction ou en inhalation chez les enfants et les adolescents de moins de 18 ans. L'utilisation n'est par conséquent pas recommandée chez les enfants âgés de moins de 12 ans et de moins de 18 ans, respectivement. Ne pas utiliser en cas d'allergie connue à la pénicilline ou à des substances similaires, en cas d'hypersensibilité connue aux moisissures (*Penicillium chrysogenum*), ainsi qu'en cas de maladies auto-immunes.

Veuillez informer votre médecin ou votre pharmacien, si

- vous souffrez d'une autre maladie,
- vous êtes allergique
- vous prenez déjà d'autres médicaments en usage interne ou externe (même en automédication).

Notakehl D5, gouttes peut-il être pris pendant la grossesse ou l'allaitement?

Sur la base des expériences faites à ce jour, aucun risque pour l'enfant n'est connu si le médicament est utilisé conformément à l'usage auquel il est destiné. Toutefois, aucune étude scientifique systématique n'a été effectuée. Par mesure de précaution, vous devriez renoncer si possible à prendre des médicaments durant la grossesse et l'allaitement, ou demander l'avis du médecin ou du pharmacien.

Comment utiliser Notakehl D5, gouttes?

Posologie / mode d'emploi:

chez des adultes et les adolescents dès 12 ans : A prendre: 8 gouttes 1 fois par jour avant un repas.

A frictionner: adultes 5-10 gouttes 1 fois par jour sur la partie atteinte ou dans le pli du coude.

à inhaler : adultes: diluer 5 gouttes du médicament dans 2,5 ml de solution de NaCl à 0,9% pour inhalation. Inhaler ce mélange 1 à 2 fois par jour au moyen d'un inhalateur (nébuliseur). Ne changez pas



de votre propre chef le dosage prescrit. Adressez vous à votre médecin ou à votre pharmacien si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte. Notakehl D5, gouttes doit être arrêté au plus tard après un traitement d'une durée de 4 semaines.

Quels effets secondaires Notakehl D5, gouttes peut-il provoquer?

Il est possible qu'une allergie au composant *Penicillium chrysogenum* survienne. Si vous remarquez des effets secondaires qui ne sont pas mentionnés dans cette notice, veuillez-en informer votre médecin ou votre pharmacien. La prise de médicaments homéopathiques peut aggraver passagèrement les troubles (aggravation initiale). Si cette aggravation persiste, cessez le traitement avec Notakehl D5, gouttes et informez-en votre médecin ou votre pharmacien.

A quoi faut-il encore faire attention?

Le médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention «A utiliser jusqu'au» sur le récipient. Garder les médicaments hors de portée des enfants. Conserver à température ambiante (15-25 °C). Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

Que contient Notakehl D5, gouttes?

1 ml de solution contient:

1 ml *Penicillium chrysogenum* D5 aquos. dilutio (HAB, 5a).

Numéro d'autorisation

50294 (Swissmedic)

Où obtenez-vous Notakehl D5, gouttes? Quels sont les emballages à disposition sur le marché?

En pharmacie, sur ordonnance médicale.

Emballage de 10 ml.

Titulaire de l'autorisation

ebi-pharm ag, Lindachstr. 8c, 3038 Kirchlindach

Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en avril 2017 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).

