

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo prima di far uso del medicamento. Questo medicamento le è stato prescritto personalmente e quindi non deve essere consegnato ad altre persone, anche se i sintomi sono gli stessi. Questo medicamento potrebbe nuocere alla loro salute. Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

Notakehl D5, Gocce

Medicamento omeopatico

Quando si usa Notakehl D5, gocce?

Secondo la concezione che sta alla base dei medicinali omeopatici, Notakehl D5, gocce può essere usato su prescrizione del suo medico in caso d'infezioni purulenti della pelle.

Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?

Se il suo medico le ha prescritto altri medicinali, chieda al suo medico o al suo farmacista se simultaneamente può assumere Notakehl D5, gocce.

Quando non si può assumere Notakehl D5, gocce e quando la sua somministrazione uso richiede prudenza?

Non sono disponibili sufficienti esperienze documentate sull'assunzione di Notakehl D5, gocce nei bambini sotto i 12 anni di età e sulla frizione e l'inalazione nei bambini e negli adolescenti sotto i 18 anni di età. Pertanto, si sconsiglia l'uso nei bambini di età inferiore rispettivamente ai 12 anni e ai 18 anni. Non utilizzare in caso di preesistente allergia alla penicillina o a sostanze analoghe così come in caso di ipersensibilità nota alle muffe (*Penicillium chrysogenum*) o di malattie autoimmunitarie. Informi il suo medico o il suo farmacista se

- soffre di altre malattie
- soffre di allergie o
- assume o applica esternamente altri medicinali (anche se acquistati di propria iniziativa).

Si può assumere Notakehl D5, gocce durante la gravidanza o l'allattamento?

In base alle esperienze fatte finora, non sono noti rischi per il bambino se il medicamento è usato correttamente. Tuttavia non sono ancora stati eseguiti studi scientifici sistematici. Per precauzione dovrebbe rinunciare nella misura del possibile ad assumere medicinali durante la gravidanza e il periodo d'allattamento o chiedere consiglio al suo medico o al suo farmacista.

Come usare Notakehl D5, gocce?

Posologia / uso:

Negli adulti e adolescenti sotto i 12 anni: da prendere: 8 gocce una volta al giorno prima di un pasto.

Da frizionare: adulti: 5-10 gocce una volta al giorno sulla zona colpita o al di sopra del gomito.

Per inalazioni: adulti: aggiungere 5 gocce del medicamento a 2,5 ml di soluzione per inalazione di NaCl allo 0,9%. Inalare questa miscela 1-2 volte al giorno per mezzo di un inalatore (nebulizzatore). Non modifichi di propria iniziativa la posologia prescritta. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo



forte ne parli al suo medico o al suo farmacista. Dopo una durata massima della terapia di 4 settimane si consiglia di interrompere la somministrazione di Notakehl D5, gocce.

Quali effetti collaterali può avere Notakehl D5, gocce?

Sussiste la possibilità che si scateni una reazione allergica al componente *Penicillium chrysogenum*. Se osserva effetti collaterali non descritti, dovrebbe informare il suo medico o il suo farmacista. Con l'assunzione di medicinali omeopatici, i disturbi possono momentaneamente aggravarsi (aggravamento iniziale). Se l'aggravamento dovesse persistere, interrompa il trattamento con Notakehl D5, gocce e informi il suo medico o il suo farmacista.

Di che altro occorre tener conto?

Il medicamento non deve essere utilizzato oltre la data indicata con "verwendbar bis" sulla confezione. Conservare il medicamento fuori dalla portata dei bambini. Conservare a temperatura ambiente (15-25 °C). Il medico, il farmacista possono darle ulteriori informazioni.

Cosa contiene Notakehl D5, gocce?

1 ml di soluzione contiene:

1 ml *Penicillium chrysogenum* D5 aquos. dilutio (HAB, 5a)

Numero dell'omologazione

50294 (Swissmedic)

Dove è ottenibile Notakehl D5, gocce? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia dietro presentazione della prescrizione medica.

Confezione da 10 ml.

Titolare dell'omologazione

ebi-pharm ag, Lindachstr. 8c, 3038 Kirchlindach

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel aprile 2017 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

