

Information für Patientinnen und Patienten

Lesen Sie diese Packungsbeilage sorgfältig, bevor Sie das Arzneimittel anwenden. Dieses Arzneimittel ist Ihnen persönlich verschrieben worden und Sie dürfen es nicht an andere Personen weitergeben. Auch wenn diese die gleichen Krankheitssymptome haben wie Sie, könnte ihnen das Arzneimittel schaden.

Bewahren Sie die Packungsbeilage auf, Sie wollen sie vielleicht später nochmals lesen.

Dupixent®, Injektionslösung im Fertigpen

Sanofi-Aventis (Suisse) SA

Was ist Dupixent und wann wird es angewendet?

Dupixent enthält den Wirkstoff Dupilumab; dies ist ein sogenannter monoklonaler Antikörper (ein spezieller Eiweissstoff), der gezielt die Wirkung von zwei anderen Eiweissstoffen namens Interleukin 4 (IL-4) und Interleukin 13 (IL-13) hemmt. Beide Eiweissstoffe spielen eine wichtige Rolle beim Auftreten von Anzeichen und Symptomen von atopischer Dermatitis, Asthma, chronischer Rhinosinusitis mit Nasenpolypen (CRSwNP), Prurigo nodularis, eosinophiler Ösophagitis (EoE) und chronisch obstruktiver Lungenerkrankung (COPD).

Anwendung bei atopischer Dermatitis:

Dupixent wird bei erwachsenen Patienten und bei Kindern ab 2 Jahren zur Behandlung von mittelschwerer bis schwerer atopischer Dermatitis (auch bekannt als atopisches Ekzem) angewendet, wenn Arzneimittel, die auf die Haut aufgetragen werden, den Patienten keine Linderung verschaffen oder diese nicht empfohlen werden. Dupixent kann allein oder zusammen mit anderen Arzneimitteln gegen Ekzeme angewendet werden, die auf die Haut aufgetragen werden – wie von Ihrem Arzt bzw. Ihrer Ärztin verordnet.

Die Anwendung von Dupixent bei atopischer Dermatitis kann den Zustand Ihrer Haut verbessern und den Juckreiz lindern.

Anwendung bei Asthma:

Dupixent wird zusammen mit anderen Asthma-Arzneimitteln zur Basistherapie bei Erwachsenen und Kindern ab 6 Jahren mit schwerem Asthma angewendet, wenn die Erkrankung durch die üblichen Asthma-Arzneimittel allein nicht ausreichend kontrolliert ist. Dupixent trägt zur Vorbeugung von schweren Asthma-Anfällen (Exazerbationen) bei und kann Ihre Atmung verbessern. Dupixent kann auch dazu beitragen, Ihren Bedarf an oralen Kortikosteroiden zu verringern – einer weiteren Gruppe von Arzneimitteln für die Asthma-Kontrolle, die schweren Asthma-Anfällen vorbeugen und zugleich die Atmung verbessern.

Anwendung bei chronischer Rhinosinusitis mit Nasenpolypen (CRSwNP):

Dupixent wird auch zusammen mit anderen Arzneimitteln zur Erhaltungstherapie bei Erwachsenen mit CRSwNP eingesetzt, wenn die Erkrankung durch die übliche Therapie der CRSwNP allein nicht ausreichend kontrolliert ist. Dupixent kann auch die Notwendigkeit eines operativen Eingriffs und den Bedarf an systemischen Kortikosteroiden verringern.

Anwendung bei Prurigo nodularis:

Dupixent wird auch zur Behandlung von mittelschwerer bis schwerer Prurigo nodularis, auch als chronische Prurigo bezeichnet, bei Erwachsenen eingesetzt, wenn Behandlungen, die auf die Haut aufgetragen werden, nicht zur Linderung der Beschwerden führen oder nicht empfohlen werden.

Dupixent kann allein oder zusammen mit anderen Arzneimitteln gegen Prurigo nodularis, die auf die Haut aufgetragen werden, angewendet werden.

Anwendung bei eosinophiler Ösophagitis:

Dupixent wird auch zur Behandlung von eosinophiler Ösophagitis (EoE) bei Erwachsenen und Kindern ab 2 Jahren mit einem Körpergewicht von mindestens 15 kg eingesetzt, wenn die Erkrankung mit den üblichen Arzneimitteln nicht hinreichend kontrolliert werden kann oder wenn diese nicht empfohlen sind.



Anwendung bei chronisch obstruktiver Lungenerkrankung:

Dupixent wird auch in Kombination mit anderen Arzneimitteln bei chronisch obstruktiver Lungenerkrankung (COPD) zur Erhaltungstherapie der unkontrollierten COPD bei Erwachsenen angewendet.

Wann darf Dupixent nicht angewendet werden?

Wenden Sie Dupixent nicht an,

- wenn Sie allergisch gegen Dupilumab oder einen anderen Bestandteil dieses Arzneimittels sind (siehe Rubrik «Was ist in Dupixent enthalten?»).
- wenn Sie glauben, dass Sie allergisch sein könnten, oder sich dessen nicht sicher sind – wenden Sie sich in diesem Fall an Ihren Arzt oder Apotheker bzw. Ihre Ärztin oder Apothekerin oder Ihre Pflegefachperson, bevor Sie Dupixent anwenden.

Wann ist bei der Anwendung von Dupixent Vorsicht geboten?

Dupixent ist kein Notfallmedikament und darf nicht zur Behandlung akuter Asthma- oder COPD-Anfälle (Exazerbationen) verwendet werden.

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt bzw. Ihrer Ärztin, bevor Sie Dupixent anwenden. Dies gilt auch in den folgenden Fällen:

Allergische Reaktionen

In sehr seltenen Fällen kann die Behandlung mit Dupixent schwerwiegende Nebenwirkungen wie insbesondere allergische Reaktionen (Überempfindlichkeitsreaktionen) hervorrufen. Achten Sie während der Anwendung von Dupixent auf Anzeichen solcher Reaktionen (d.h. Fieber, allgemeines Unwohlsein, geschwollene Lymphknoten (z.B. Schwellungen in der Leiste oder am Hals), Quaddeln, Juckreiz, Gelenkschmerzen, Hautausschlag).

Falls Sie Anzeichen einer allergischen Reaktion bemerken, *beenden* Sie die Anwendung von Dupixent, informieren Sie Ihren Arzt bzw. Ihre Ärztin oder fordern Sie *umgehend* medizinische Hilfe an. Eine Liste der möglichen Anzeichen finden Sie in der Rubrik «*Welche Nebenwirkungen kann Dupixent haben?*».

Hypereosinophilie

Bei Patienten, die Dupixent anwenden, kann eine Entzündung der Blutgefäße oder der Lunge auftreten, die durch eine erhöhte Anzahl an Eosinophilen im Blut (eine Unterart der weissen Blutkörperchen) hervorgerufen wird. Diese Patienten werden häufig zunächst mit einem Kortikosteroid behandelt, und das Auftreten dieser Erkrankungen kann damit zusammenhängen, dass das Kortikosteroid später nicht mehr oder in geringerer Dosis angewendet wird. Informieren Sie sofort Ihren Arzt bzw. Ihre Ärztin, wenn bei Ihnen eine Kombination von Symptomen wie grippeähnliche Beschwerden, Kribbeln oder ein taubes Gefühl in Armen oder Beinen, Verschlechterung bestehender Lungenbeschwerden und/oder Hautausschlag auftreten.

Asthma

Falls Sie an Asthma leiden und Arzneimittel dagegen einnehmen, dürfen Sie die Asthma-Behandlung nicht ohne vorherige Absprache mit Ihrem Arzt bzw. Ihrer Ärztin beenden oder verändern. Sprechen Sie mit Ihrem Arzt bzw. Ihrer Ärztin, bevor Sie Dupixent absetzen oder wenn Ihr Asthma während der Behandlung mit diesem Arzneimittel weiterhin nicht unter Kontrolle ist oder sich verschlechtert.

Augenprobleme (wenn Sie eine atopische Dermatitis haben)

Sprechen Sie mit Ihrem Arzt bzw. Ihrer Ärztin, wenn bei Ihnen Augenprobleme auftreten oder sich bestehende Augenprobleme verschlechtern. Hierzu zählen auch Augenschmerzen oder Veränderungen des Sehvermögens. Personen, die kleine Kinder betreuen, sollten besonders auf das Auftreten oder die Verschlimmerung von Augenproblemen achten und ihren Arzt bzw. ihre Ärztin entsprechend informieren.

Parasiteninfektion (Darmparasiten)



Dupixent kann Ihre Widerstandsfähigkeit gegen Infektionen, die durch Parasiten verursacht werden, schwächen. Falls Sie derzeit an einer Parasiteninfektion leiden, muss diese behandelt werden, bevor die Behandlung mit Dupixent beginnt. Fragen Sie Ihren Arzt bzw. Ihre Ärztin, wenn Sie Durchfall (Diarrhö), Blähungen, Magenverstimmungen oder fettigen Stuhl haben oder unter Flüssigkeitsmangel (Dehydratation) leiden; dies können Anzeichen einer Parasiteninfektion sein. Sprechen Sie mit Ihrem Arzt bzw. Ihrer Ärztin, falls Sie in einem Gebiet leben, in dem diese Infektionen häufig vorkommen, oder falls Sie ein solches Gebiet bereisen.

Kinder und Jugendliche

Der Dupixent-Fertigpen ist nicht für die Anwendung bei Kindern unter 2 Jahren bestimmt. Kontaktieren Sie bei Kindern im Alter von 6 Monaten bis unter 2 Jahren mit atopischer Dermatitis oder bei Kindern im Alter von einem Jahr bis unter 2 Jahren mit eosinophiler Ösophagitis Ihren Arzt bzw. Ihre Ärztin, der bzw. die Ihnen die geeignete Dupixent-Fertigspritze verschreiben wird.

Die Anwendungssicherheit und der Nutzen von Dupixent bei Kindern mit atopischer Dermatitis unter 6 Monaten sind noch nicht bekannt. Die Sicherheit und der Nutzen von Dupixent bei Kindern mit einem Körpergewicht unter 7,4 kg sind nicht erwiesen.

Die Sicherheit und der Nutzen von Dupixent bei Kindern mit Asthma unter 6 Jahren sind noch nicht bekannt.

Chronische Rhinosinusitis mit Nasenpolypen (CRSwNP) tritt normalerweise nicht bei Kindern auf. Die Sicherheit und der Nutzen von Dupixent bei Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren mit chronischer Rhinosinusitis mit Nasenpolypen sind noch nicht bekannt.

Die Sicherheit und der Nutzen von Dupixent bei von Prurigo nodularis betroffenen Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren sind noch nicht bekannt.

Die Anwendungssicherheit und der Nutzen von Dupixent bei Kindern mit eosinophiler Ösophagitis unter einem Jahr oder mit einem Körpergewicht von < 15 kg sind noch nicht bekannt.

Die Sicherheit und der Nutzen von Dupixent bei Kindern und Jugendlichen mit COPD unter 18 Jahren sind noch nicht bekannt. COPD tritt bei Kindern normalerweise nicht auf.

Verkehrstüchtigkeit und Bedienen von Maschinen

Es ist unwahrscheinlich, dass Dupixent Auswirkungen auf die Verkehrstüchtigkeit und die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen hat.

Dupixent enthält Natrium

Dieses Arzneimittel enthält weniger als 1 mmol (23 mg) Natrium pro 200- bzw. 300-mg-Dosis, d. h., es ist nahezu «natriumfrei». Wenn Sie Ihren täglichen Salzkonsum einschränken müssen, sprechen Sie mit Ihrem Arzt bzw. Ihrer Ärztin.

Anwendung von Dupixent zusammen mit anderen Arzneimitteln

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker bzw. Ihre Ärztin oder Apothekerin, wenn Sie

- jegliche anderen Arzneimittel anwenden, kürzlich angewendet haben oder eventuell anwenden werden.
- kürzlich geimpft wurden oder eine Impfung bei Ihnen ansteht.

Setzen Sie Ihre Arzneimittel gegen atopische Dermatitis, Asthma, chronische Rhinosinusitis mit Nasenpolypen, Prurigo nodularis oder eosinophile Ösophagitis nicht ab und verringern Sie nicht deren Dosis, es sei denn, Ihr Arzt bzw. Ihre Ärztin hat Sie dazu angewiesen. Diese Arzneimittel (insbesondere Kortikosteroide) müssen schrittweise, unter der direkten Aufsicht Ihres Arztes bzw. Ihrer Ärztin und in Abhängigkeit von Ihrem Ansprechen auf Dupixent abgesetzt werden.

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker bzw. Ihre Ärztin oder Apothekerin, wenn Sie

- an anderen Krankheiten leiden,



- Allergien haben oder
- andere Arzneimittel (auch selbst gekaufte!) einnehmen.

Darf Dupixent während einer Schwangerschaft oder in der Stillzeit angewendet werden?

Wenn Sie schwanger sind oder vermuten, schwanger zu sein, oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Anwendung dieses Arzneimittels Ihren Arzt bzw. Ihre Ärztin um Rat. Es ist nicht bekannt, welche Auswirkungen das Arzneimittel bei schwangeren Frauen hat. Deshalb wird von der Anwendung von Dupixent während der Schwangerschaft abgeraten, es sei denn, Ihr Arzt bzw. Ihre Ärztin empfiehlt Ihnen die Anwendung.

Wenn Sie stillen oder beabsichtigen, zu stillen, sprechen Sie vor der Anwendung des Arzneimittels mit Ihrem Arzt bzw. Ihrer Ärztin. Sie entscheiden gemeinsam mit Ihrem Arzt bzw. Ihrer Ärztin, ob Sie besser stillen oder Dupixent anwenden sollten. Beides gleichzeitig ist nicht möglich.

Wie verwenden Sie Dupixent?

Warnhinweise für die Verwendung des Pens:

Lesen und befolgen Sie unbedingt die Gebrauchsanweisung und stellen Sie sicher, dass Sie den gesamten Inhalt des Fertigpens injizieren. Die Injektion kann bis zu 20 Sekunden lang dauern.

Kinder und Jugendliche:

Bei Jugendlichen (12–17 Jahre) wird empfohlen, dass Dupixent von einem oder unter Aufsicht eines Erwachsenen verabreicht wird.

Bei Kindern von 2 bis unter 12 Jahren muss Dupixent von einer Pflegeperson verabreicht werden.

Dosierung und Dauer der Anwendung von Dupixent:

Ihr Arzt bzw. Ihre Ärztin wird entscheiden, wie viel Dupixent Sie brauchen und wie lange die Behandlung dauern soll. Im Zweifelsfall fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker bzw. Ihre Ärztin oder Apothekerin. Der gesamte Inhalt des Fertigpens muss injiziert (gespritzt) werden.

Achten Sie darauf, das Arzneimittel immer genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers bzw. Ihrer Ärztin oder Apothekerin anzuwenden. Im Zweifelsfall wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker bzw. Ihre Ärztin oder Apothekerin.

Dupixent wird unter die Haut gespritzt (subkutane Injektion). Sie entscheiden gemeinsam mit Ihrem Arzt bzw. Ihrer Ärztin, ob Sie die Dupixent-Injektion selbst durchführen können.

Führen Sie die Dupixent-Injektion nur selbst durch, wenn Sie vorher durch Ihren Arzt bzw. Ihre Ärztin oder Ihre Pflegefachperson entsprechend unterwiesen worden sind. Nach einer ordnungsgemässen Unterweisung kann auch eine nahestehende Pflegeperson die Dupixent-Injektion bei Ihnen durchführen.

Lesen Sie immer aufmerksam die Gebrauchsanweisung des Pens am Ende dieser Packungsbeilage durch, bevor Sie Dupixent anwenden.

Empfohlene Dosis zur Anwendung bei atopischer Dermatitis:

Erwachsene

Die empfohlene Anfangsdosis beträgt 600 mg (zwei Injektionen zu je 300 mg). Danach werden unabhängig vom Körpergewicht des Patienten alle zwei Wochen 300 mg als subkutane Injektion verabreicht.

Bei Kindern und Jugendlichen (von 6 bis 17 Jahren)

Die empfohlene Dosis Dupixent für Kinder und Jugendliche (von 6 bis 17 Jahren) mit atopischer Dermatitis richtet sich nach dem Körpergewicht:

<i>Körpergewicht des Patienten</i>	<i>Anfangsdosis</i>	<i>Weitere Dosen</i>



15 kg bis unter 30 kg	300 mg (eine Injektion zu 300 mg) an Tag 1, gefolgt von 300 mg an Tag 15	300 mg (alle 4 Wochen) beginnend 4 Wochen nach der Dosis von Tag 15
30 kg bis unter 60 kg	400 mg (zwei Injektionen zu je 200 mg)	200 mg (alle 2 Wochen)
60 kg oder mehr	600 mg (zwei Injektionen zu je 300 mg)	300 mg (alle 2 Wochen)

Empfohlene Dosis bei Kindern (von 2 bis 5 Jahren)

Die empfohlene Dosis Dupixent bei Kindern von 2 bis 5 Jahren mit atopischer Dermatitis richtet sich nach dem Körpergewicht:

<i>Körpergewicht des Patienten</i>	<i>Anfangsdosis</i>	<i>Weitere Dosen</i>
5 kg bis unter 15 kg	200 mg (eine Injektion zu 200 mg)	200 mg alle 4 Wochen
15 kg bis unter 30 kg	300 mg (eine Injektion zu 300 mg)	300 mg alle 4 Wochen

Empfohlene Dosis zur Anwendung bei Asthma:

Erwachsene und Jugendliche (ab 12 Jahren)

Bei der Behandlung von schwerem Asthma beträgt die empfohlene Dosis Dupixent für Erwachsene und Jugendliche (ab 12 Jahren):

- eine Anfangsdosis zu 400 mg (2 Injektionen zu je 200 mg),
- gefolgt von 200 mg als subkutane Injektion alle zwei Wochen, unabhängig vom Körpergewicht des Patienten.

Bei schwerem Asthma und gleichzeitiger Anwendung von oralen Kortikosteroiden oder bei schwerem Asthma und gleichzeitigem Vorliegen einer mittelschweren bis schweren atopischen Dermatitis oder komorbider chronischer Rhinosinusitis mit Nasenpolypen (gemäß zugelassenem Anwendungsgebiet):

- eine Anfangsdosis zu 600 mg (2 Injektionen zu je 300 mg),
- gefolgt von 300 mg als subkutane Injektion alle zwei Wochen, unabhängig vom Körpergewicht des Patienten.

Bei Kindern (von 6 bis 11 Jahren)

Die empfohlene Dosis Dupixent für Kinder (von 6 bis 11 Jahren) mit Asthma richtet sich nach dem Körpergewicht:

<i>Körpergewicht des Patienten</i>	<i>Anfangsdosis</i>
15 kg bis unter 30 kg	300 mg alle 4 Wochen



30 kg bis unter 60 kg	200 mg alle 2 Wochen oder 300 mg alle 4 Wochen
60 kg oder mehr	200 mg alle 2 Wochen

Für Kinder von 6 bis 11 Jahren mit schwerem Asthma und gleichzeitigem Vorliegen einer mittelschweren bis schweren atopischen Dermatitis entscheidet Ihr Arzt bzw. Ihre Ärztin über die Dosis Dupixent, die für Sie geeignet ist.

Empfohlene Dosis zur Anwendung bei chronischer Rhinosinusitis mit Nasenpolypen (CRSwNP):

Empfohlene Dosis für Erwachsene mit chronischer Rhinosinusitis mit Nasenpolypen (CRSwNP):

Bei CRSwNP beträgt die empfohlene Anfangsdosis 300 mg. Danach werden alle zwei Wochen 300 mg als subkutane Injektion angewendet, unabhängig vom Körpergewicht des Patienten.

Empfohlene Dosis zur Anwendung bei Prurigo nodularis (PN):

Die empfohlene Dupixent-Dosis bei Erwachsenen mit Prurigo nodularis beträgt:

- eine Anfangsdosis von 600 mg (zwei Injektionen von 300 mg)
- gefolgt von einer Dosis von 300 mg, die alle zwei Wochen als subkutane Injektion verabreicht wird, unabhängig vom Körpergewicht des Patienten.

Empfohlene Dosis zur Anwendung bei eosinophiler Ösophagitis:

Die empfohlene Dosis von Dupixent für Erwachsene und Kinder ab 2 Jahren und einem Körpergewicht von mindestens 15 kg mit eosinophiler Ösophagitis richtet sich nach dem Körpergewicht:

<i>Körpergewicht des Patienten</i>	<i>Dosis</i>
15 bis unter 30 kg	200 mg alle 2 Wochen
30 bis unter 40 kg	300 mg alle 2 Wochen
ab 40 kg	300 mg wöchentlich

Empfohlene Dosis zur Anwendung bei chronisch obstruktiver Lungenerkrankung:

Bei der Behandlung der chronisch obstruktiven Lungenerkrankung bei Erwachsenen beträgt die empfohlene Dosis 300 mg, die alle zwei Wochen als subkutane Injektion unabhängig vom Körpergewicht des Patienten verabreicht wird.

Wenn Sie eine grössere Menge Dupixent angewendet haben, als Sie sollten:

Wenn Sie eine grössere Menge Dupixent angewendet haben, als Sie sollten, oder die Dosis zu früh verabreicht wurde, sprechen Sie mit Ihrem Arzt bzw. Ihrer Ärztin.

Wenn Sie die Anwendung von Dupixent vergessen haben:



Wenn Sie ein *wöchentliches* Dosierungsschema haben und eine Dosis Dupixent vergessen haben:

- Verabreichen Sie sich die Dosis so bald wie möglich und erstellen Sie einen neuen Anwendungszeitplan für die Verabreichung, der mit dem Zeitpunkt beginnt, an dem Sie sich an die Verabreichung der Dupixent-Injektion erinnern.

Wenn Sie ein *zweiwöchentliches* Dosierungsschema haben und eine Dosis Dupixent vergessen haben:

- Verabreichen Sie sich die Injektion von Dupixent innerhalb von 7 Tagen nach der vergessenen Dosis und fahren Sie anschliessend mit Ihrem ursprünglichen Anwendungszeitplan fort.
- Wird die vergessene Dosis nicht innerhalb von 7 Tagen verabreicht, warten Sie die nächste vorgesehene Dosis für die Injektion von Dupixent ab.

Wenn Sie ein *vierwöchentliches* Dosierungsschema haben und eine Dosis Dupixent vergessen haben:

- Verabreichen Sie sich die Injektion von Dupixent innerhalb von 7 Tagen nach der vergessenen Dosis und fahren Sie anschliessend mit Ihrem ursprünglichen Anwendungszeitplan fort.
- Wird die vergessene Dosis nicht innerhalb von 7 Tagen verabreicht, erstellen Sie einen neuen vierwöchigen Anwendungszeitplan für die Verabreichung, der mit dem Zeitpunkt beginnt, an dem Sie sich an die Verabreichung der Dupixent-Injektion von Dupixent erinnern.

Wenn Sie die Behandlung mit Dupixent abbrechen:

Beenden Sie die Anwendung von Dupixent nicht, ohne vorher mit Ihrem Arzt bzw. Ihrer Ärztin darüber zu sprechen.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung dieses Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker bzw. Ihre Ärztin oder Apothekerin oder Ihre Pflegefachperson.

Ändern Sie nicht von sich aus die verschriebene Dosierung. Wenn Sie glauben, das Arzneimittel wirke zu schwach oder zu stark, so sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker bzw. mit Ihrer Ärztin oder Apothekerin.

Welche Nebenwirkungen kann Dupixent haben?

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Die Behandlung mit Dupixent kann schwerwiegende Nebenwirkungen hervorrufen. Dazu gehören insbesondere sehr selten allergische Reaktionen (Überempfindlichkeitsreaktionen). Anzeichen für eine allergische Reaktion sind unter anderem:

- Atembeschwerden
- Schwellungen von Gesicht, Mund oder Zunge
- Ohnmacht, Schwindel, Benommenheit (niedriger Blutdruck)
- Fieber
- allgemeines Unwohlsein
- geschwollene Lymphknoten (z.B. Schwellungen in der Leiste oder am Hals)
- Quaddeln
- Juckreiz
- Gelenkschmerzen
- Hautausschlag

Falls bei Ihnen eine allergische Reaktion auftritt, *beenden Sie sofort* die Anwendung von Dupixent und sprechen Sie sofort mit Ihrem Arzt bzw. Ihrer Ärztin.

Andere Nebenwirkungen, die gemeldet wurden:



Sehr häufig (betrifft mehr als einen von 10 Behandelten)

- Reaktionen an der Injektionsstelle, einschliesslich Schwellung, Kontusion und Rötung

Häufig (betrifft 1 bis 10 von 100 Behandelten)

- Schmerzen, Juckreiz, Induration, Hautausschlag, Hautentzündung und Bluterguss (Ekchymose) an der Injektionsstelle
- Kopfschmerzen
- Gerötete Augen
- Augeninfektion
- Fieberbläschen (auf den Lippen und der Haut)
- Infektion durch andere Herpes-simplex-Viren (Herpes-Ekzem ausgenommen)
- Entzündung der Magenschleimhaut (Gastritis)
- Zahnschmerzen
- Gelenkschmerzen
- Schlaflosigkeit (Schlafstörung)
- Madenwürmer (Enterobiasis)
- Zunahme einer bestimmten Art von weissen Blutkörperchen (Eosinophile) im Blut (siehe Abschnitt «Hypereosinophilie» unter «Wann ist bei der Anwendung von Dupixent Vorsicht geboten?»)

Gelegentlich (betrifft 1 bis 10 von 1'000 Behandelten)

- Entzündung der Augenoberfläche, gelegentlich verbunden mit verschwommenem Sehen (Keratitis)
- Trockene und juckende Augen
- Juckende, gerötete, geschwollene Augenlider

Selten (betrifft 1 bis 10 von 10'000 Behandelten)

- Serumkrankheit oder serumkrankheitsähnliche Reaktion, die sich unter anderem durch Fieber, allgemeines Unwohlsein, geschwollene Lymphknoten, Quaddeln, Juckreiz, Gelenkschmerzen und Hautausschlag äussert

Häufigkeit nicht bekannt (kann aus den verfügbaren Daten nicht abgeschätzt werden)

- Geschwüre an der durchsichtigen äusseren Augenschicht (Hornhaut), gelegentlich verbunden mit verschwommenem Sehen (ulzerative Keratitis)
- Hautausschlag im Gesicht
- Schwellungen von Gesicht, Lippen, Mund, Hals oder Zunge (Angioödem)

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker bzw. Ihre Ärztin oder Apothekerin. Dies gilt insbesondere auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind.

Was ist ferner zu beachten?

Das Arzneimittel darf nur bis zu dem auf dem Behälter mit «EXP» bezeichneten Datum verwendet werden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Lagerungshinweis

Den Pen im Umkarton aufbewahren, um den Inhalt vor Licht zu schützen.



Im Kühlschrank (2–8 °C) lagern. Arzneimittel nicht einfrieren oder erhitzen.

Gegebenenfalls können die Fertigpens bis zu 14 Tage lang bei Raumtemperatur unter 25 °C gelagert werden. Wenn Sie die Schachtel dauerhaft aus dem Kühlschrank entnehmen müssen, notieren Sie das Datum der Entnahme in dem dafür vorgesehenen Bereich auf der Schachtel und verwenden Sie das enthaltene Dupixent innerhalb der nächsten 14 Tage.

Dupixent ist eine klare bis leicht schimmernde, farblose bis blassgelbe Lösung in einem Fertigpen.

Verwenden Sie das Arzneimittel nicht, wenn Sie bemerken, dass die Lösung trüb oder verfärbt ist oder schwebende Teilchen enthält.

Den Pen nicht schütteln.

Entsorgen Sie Arzneimittel nicht über die Kanalisation oder den Haushaltsabfall. Bewahren Sie die verwendeten Pens in einem durchstichsicheren Behälter auf und entsorgen Sie sie gemäss den lokalen Vorschriften bzw. geben Sie sie für eine korrekte Entsorgung in einer Sammelstelle oder Apotheke ab. Fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker bzw. Ihre Ärztin oder Apothekerin oder Ihre Pflegefachperson, wie Arzneimittel zu entsorgen sind, die Sie nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei.

Der Dupixent-Pen ist nur zum einmaligen Gebrauch bestimmt.

Was ist in Dupixent enthalten?

Wirkstoffe

Der Wirkstoff ist Dupilumab.

Jeder Fertigpen enthält 300 mg Dupilumab in 2 ml Injektionslösung oder 200 mg Dupilumab in 1,14 ml Injektionslösung.

Hilfsstoffe

Argininhydrochlorid, Histidin, Histidinhydrochlorid-Monohydrat, Polysorbat 80, Natriumacetat-Trihydrat, Essigsäure 99 %, Saccharose, Wasser für Injektionszwecke.

Zulassungsnummer

67661 (Swissmedic)

Wo erhalten Sie Dupixent? Welche Packungen sind erhältlich?

In Apotheken gegen ärztliche Verschreibung.

Der Fertigpen kann entweder eine runde Schutzkappe und ein ovales, von einem Pfeil umrandetes Sichtfenster haben oder eine geriffelte, quadratische Schutzkappe und ein ovales Sichtfenster ohne Pfeil. Obwohl es geringfügige Unterschiede im Aussehen der beiden Fertigpens gibt, funktionieren beide gleich (siehe Gebrauchsanweisung, welche dieser Packungsbeilage beigelegt ist).

Dupixent 300 mg ist erhältlich in:

- einer Schachtel mit 2 Fertigpens.

Dupixent 200 mg ist erhältlich in:

- einer Schachtel mit 2 Fertigpens.

ZulassungsinhaberIn

sanofi-aventis (schweiz) ag, 1214 Vernier/GE

Diese Packungsbeilage wurde im Januar 2025 letztmals durch die Arzneimittelbehörde (Swissmedic) geprüft.

Gebrauchsanweisung

Dupixent 300 mg, Injektionslösung im Fertigpen (Dupilumab)



Dupixent 200 mg, Injektionslösung im Fertigpen (Dupilumab)


Es ist wichtig, dass Sie die Packungsbeilage und die vorliegende Gebrauchsanweisung vollständig durchlesen, bevor Sie Dupixent anwenden. Auch wenn Sie bereits selbst eine Dupixent-Injektion bei sich durchgeführt haben, lesen Sie vor jeder Anwendung die Packungsbeilage und die Gebrauchsanweisung, da diese sich seit Ihrer letzten Injektion geändert haben können.

Bewahren Sie dieses Dokument auf, damit Sie es auch später nochmals lesen können.


Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker bzw. Ihre Ärztin oder Apothekerin.

Diese Abbildungen zeigen die Bestandteile des Dupixent-Fertigpens mit Nadelabdeckung.

Die untenstehenden Bilder zeigen den grünen 300-mg-Pen mit der gelben Nadelabdeckung.



Die untenstehenden Bilder zeigen den gelben 200-mg-Pen mit der orangefarbenen Nadelabdeckung.



Wichtige Informationen

Bei diesem Produkt handelt es sich um einen Fertigpen zur einmaligen Anwendung. Er enthält Dupixent zur Injektion unter die Haut (subkutane Injektion).

Sie dürfen sich das Arzneimittel weder selbst verabreichen noch von einer anderen Person verabreichen lassen, es sei denn, Sie bzw. die andere Person wurden durch Ihren Arzt, Apotheker bzw. Ihrer Ärztin oder Apothekerin oder das medizinische Fachpersonal entsprechend unterwiesen.



Bei Jugendlichen von 12 bis 17 Jahren wird empfohlen, dass Dupixent von einem Erwachsenen oder unter dessen Aufsicht verabreicht wird. Bei Kindern von 2 bis unter 12 Jahren muss Dupixent von einer Pflegeperson verabreicht werden. Dupixent im Fertigpen wird nur bei Erwachsenen und bei Kindern ab 2 Jahren angewendet.

- Lesen Sie die gesamte Gebrauchsanweisung aufmerksam durch, bevor Sie den Fertigpen anwenden.
- Fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker bzw. Ihre Ärztin oder Apothekerin oder Ihre Pflegefachperson, wie oft Sie das Arzneimittel spritzen müssen.
- Lassen Sie sich von Ihrem Arzt oder Apotheker bzw. Ihrer Ärztin oder Apothekerin oder Ihrer Pflegefachperson zeigen, wie der Pen richtig angewendet wird, bevor Sie sich zum ersten Mal selbst eine Injektion verabreichen.
- Wechseln Sie die Einstichstelle (Injektionsstelle) bei jeder Injektion.
- **Verwenden Sie den Fertigpen nicht**, wenn er beschädigt ist.
- **Verwenden Sie den Fertigpen nicht**, wenn die Schutzkappe fehlt oder nicht ordnungsgemäss aufgesteckt ist.
- **Drücken oder berühren Sie nicht** die Nadelabdeckung mit den Fingern.
- **Stechen Sie nicht** durch die Kleidung hindurch.
- **Entfernen Sie** die Schutzkappe **erst**, wenn Sie zur Injektion bereit sind.
- **Versuchen Sie nicht**, die Schutzkappe wieder auf den Fertigpen zu stecken.
- **Verwenden Sie** den Fertigpen **nicht mehrmals**.

Befolgen Sie die Empfehlungen zur Lagerung in der Patienteninformation.

Wie ist Dupixent aufzubewahren?

- Bewahren Sie den/die Fertigpen(s) sowie sämtliche Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.
- Bewahren Sie nicht verwendete Fertigpens in der Originalverpackung im Kühlschrank bei Temperaturen zwischen 2 °C und 8 °C auf.
- Die Fertigpens in der Originalverpackung aufbewahren, um den Inhalt vor Licht zu schützen.
- **Bewahren Sie die Dupixent-Pens nicht länger als 14 Tage bei Raumtemperatur (nicht über 25 °C) auf. Entsorgen Sie alle Dupixent-Pens, die länger als 14 Tage bei Raumtemperatur aufbewahrt wurden.**
- **Schütteln Sie** den Fertigpen **niemals**.
- **Erhitzen Sie** den Fertigpen **nicht**.
- **Frieren Sie** den Fertigpen **nicht ein**.
- **Setzen Sie** den Fertigpen **nicht** direkter Sonneneinstrahlung **aus**.

A. Vorbereitung

A1. Materialien zusammentragen

Vergewissern Sie sich, dass Folgendes bereitliegt:

- Dupixent-Fertigpen
- 1 Alkoholtupfer*
- 1 Wattebausch oder Gazetupfer*
- 1 durchstichsicheres Behältnis* (siehe Schritt D)

** Nicht im Umkarton enthalten.*

A2. Etikett anschauen



- Vergewissern Sie sich, dass es sich um das korrekte Arzneimittel und **die korrekte Dosis** handelt.

Etikett anschauen: 300 mg



Etikett anschauen: 200 mg



A3. Verfalldatum prüfen

- Überprüfen Sie das Verfalldatum.



Verwenden Sie den Fertigpen nicht nach Ablauf des Verfalldatums.

Verfalldatum 300 mg



Verfalldatum 200 mg



A4. Arzneimittel prüfen

Schauen Sie sich das Arzneimittel durch das Sichtfenster des Fertigpens an.

Überprüfen Sie, ob die Flüssigkeit klar und farblos bis blassgelb ist.

Hinweis: Sie sehen möglicherweise Luftblasen. Das ist normal.



Verwenden Sie den Fertigpen nicht, wenn die Flüssigkeit trüb oder verfärbt ist oder Ausflockungen oder schwebende Teilchen (Partikel) enthält.




Verwenden Sie den Fertigpen nicht, wenn das Sichtfenster gelb ist.



300 mg

200 mg



A5. 30 bis 45 Minuten warten Lassen Sie den Dupixent-Fertigpen mit 300 mg für mindestens 45 Minuten und den Dupixent-Fertigpen mit 200 mg für mindestens 30 Minuten auf einer ebenen Oberfläche liegen, bis er Raumtemperatur (unter 25 °C) angenommen hat.

⚠ Sie dürfen den Fertigpen nicht in der Mikrowelle, mit warmem Wasser oder durch direkte Sonneneinstrahlung aufwärmen.

⚠ Setzen Sie den Fertigpen nicht direkter Sonneneinstrahlung aus.

⚠ Bewahren Sie Dupixent nicht länger als 14 Tage bei Raumtemperatur auf.

Fertigpen mit 300 mg	Fertigpen mit 200 mg

B. Auswahl der Injektionsstelle

B1. Empfohlene Injektionsstellen:


- **Oberschenkel**
- **Bauch**, ausserhalb eines Umkreises von 5 cm um Ihren Bauchnabel herum
- **Oberarm**: Wenn eine Pflegeperson die Injektion durchführt, kann auch in die Aussenseite des Oberarms injiziert werden.

Wechseln Sie die Injektionsstelle bei jeder Dupixent-Injektion.



 **Stechen Sie nicht durch die Kleidung hindurch.**

 **Injizieren Sie nicht in empfindliche, verletzte oder vernarbte Hautstellen oder in Hautstellen mit blauen Flecken.**



 = Selbstinjektion oder Injektion durch eine Pflegeperson

 = Injektion nur durch eine Pflegeperson

B2. Hände waschen



B3. Injektionsstelle vorbereiten

- Reinigen Sie die Haut an der Injektionsstelle mit einem Alkoholtupfer.
- Lassen Sie die Haut an der Injektionsstelle trocknen, bevor Sie injizieren.

 **Berühren Sie die Injektionsstelle vor der Injektion nicht mehr und pusten Sie nicht darauf.**



C. Verabreichung der Injektion

C1. Schutzkappe entfernen




Ziehen Sie die Schutzkappe gerade ab. Die Schutzkappe dabei **nicht abdrehen**.

Entfernen Sie die Schutzkappe **erst**, wenn Sie zur Injektion bereit sind.

Drücken oder berühren Sie nicht die Nadelabdeckung mit den Fingern. Die Nadel befindet sich im Inneren.


⚠ **Setzen Sie die Schutzkappe nach dem Entfernen nicht wieder auf den Fertipen.**



C2. Zusammendrücken und platzieren

- Drücken Sie die Haut vor und während der Injektion zusammen.
- Ein Zusammendrücken der Haut ist bei Erwachsenen und bei Jugendlichen ab 12 Jahren nicht notwendig.
- Halten Sie den Fertipen beim Platzieren der Nadelabdeckung auf Ihrer Haut so, dass Sie das Sichtfenster sehen können.
- Platzieren Sie die Nadelabdeckung etwa im 90°-Winkel auf Ihrer Haut, ohne sie herunterzudrücken.

⚠ **Drücken oder berühren Sie nicht die Nadelabdeckung mit den Fingern. Die Nadel befindet sich im Inneren.**



C3. Herunterdrücken




Wenn der Fertigpen korrekt platziert ist, drücken Sie den Fertigpen fest gegen Ihre Haut, bis Sie die Nadelabdeckung nicht mehr sehen können, und halten Sie diese Position.

- Zu Beginn der Injektion ist ein Klicken zu hören.
- Das Sichtfenster färbt sich gelb.

Die Injektion kann bis zu 20 Sekunden lang dauern.

Ein Zusammendrücken der Haut ist bei Erwachsenen und bei Jugendlichen ab 12 Jahren nicht notwendig.



C4. Festhalten

Halten Sie den Fertigpen weiter fest gegen Ihre Haut gedrückt.

- Möglicherweise hören Sie ein zweites Klicken.
- Überprüfen Sie, ob sich das gesamte Sichtfenster gelb gefärbt hat.
- Zählen Sie dann langsam bis fünf.
- Heben Sie anschliessend den Pen von der Haut ab; Ihre Injektion ist abgeschlossen.


Sollte sich das Sichtfenster nicht vollständig gelb färben, entfernen Sie den Pen und wenden Sie sich an Ihr medizinisches Fachpersonal.

⚠ Verabreichen Sie sich keine zweite Dosis, ohne vorher mit Ihrem medizinischen Fachpersonal zu sprechen.

Ein Zusammendrücken der Haut ist bei Erwachsenen und bei Jugendlichen ab 12 Jahren nicht notwendig.

300 mg	200 mg
--------	--------






C5. Entfernen

- Ziehen Sie den Pen nach Abschluss der Injektion gerade nach oben von der Haut weg.
- Falls Sie etwas Blut an der Injektionsstelle sehen, drücken Sie einen Wattebausch oder Gazetupfer behutsam auf die Injektionsstelle.



Reiben Sie nach der Injektion nicht über die Hautstelle.



D. Entsorgung




Setzen Sie die Schutzkappe nicht wieder auf den Fertigpen.

Der Fertigpen ist zum einmaligen Gebrauch bestimmt und darf auf keinen Fall wiederverwendet werden. Entsorgen Sie den Fertigpen nach dem Gebrauch umgehend so, wie von Ihrem Arzt oder Apotheker bzw. Ihrer Ärztin oder Apothekerin oder Ihrer Pflegefachperson angewiesen.

- Entsorgen Sie den gebrauchten Fertigpen (mitsamt der Nadel im Inneren) und die Schutzkappe in einem durchstichsicheren Behälter: Für die Entsorgung der Fertigpens gibt es spezielle Behälter.
- **Entsorgen Sie** den gebrauchten Fertigpen (mitsamt der Nadel im Inneren) **nicht** im Haushaltsabfall.



- Fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker bzw. Ihre Ärztin oder Apothekerin, wie das Behältnis zu entsorgen ist.



Gebrauchsanweisung

Dupixent 300 mg, Injektionslösung im Fertigpen (Dupilumab)

Dupixent 200 mg, Injektionslösung im Fertigpen (Dupilumab)


Es ist wichtig, dass Sie die Packungsbeilage und die vorliegende Gebrauchsanweisung vollständig durchlesen, bevor Sie Dupixent anwenden. Auch wenn Sie bereits selbst eine Dupixent-Injektion bei sich durchgeführt haben, lesen Sie vor jeder Anwendung die Packungsbeilage und die Gebrauchsanweisung, da diese sich seit Ihrer letzten Injektion geändert haben können.

Bewahren Sie dieses Dokument auf, damit Sie es auch später nochmals lesen können.

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker bzw. Ihre Ärztin oder Apothekerin.


Diese Abbildungen zeigen die Bestandteile des Dupixent-Fertigpens mit Nadelabdeckung.

Die untenstehenden Bilder zeigen den grünen 300-mg-Pen mit der gelben Nadelabdeckung.



Die untenstehenden Bilder zeigen den gelben 200-mg-Pen mit der orangefarbenen Nadelabdeckung.





Wichtige Informationen

Bei diesem Produkt handelt es sich um einen Fertipen zur einmaligen Anwendung. Er enthält Dupixent zur Injektion unter die Haut (subkutane Injektion).

Sie dürfen sich Dupixent weder selbst verabreichen noch einer anderen Person verabreichen, es sei denn, Sie wurden durch eine Gesundheitsfachperson entsprechend unterwiesen. Bei Jugendlichen von 12 bis 17 Jahren wird empfohlen, dass Dupixent von einem Erwachsenen oder unter dessen Aufsicht verabreicht wird. Bei Kindern von 2 Jahren bis unter 12 Jahren muss Dupixent von einer Pflegeperson verabreicht werden. Dupixent in einem Fertipen wird nur bei Erwachsenen und Kindern ab 2 Jahren eingesetzt.

- Lesen Sie die gesamte Gebrauchsanweisung aufmerksam durch, bevor Sie den Fertipen anwenden.
- Fragen Sie Ihre Gesundheitsfachperson, wie oft Sie das Arzneimittel spritzen müssen.
- Wechseln Sie die Einstichstelle (Injektionsstelle) bei jeder Injektion.
- **Verwenden Sie den Fertipen nicht**, wenn er beschädigt ist.
- **Verwenden Sie den Fertipen nicht**, wenn die Schutzkappe fehlt oder nicht ordnungsgemäss aufgesteckt ist.
- **Drücken** oder berühren **Sie nicht** die Nadelabdeckung mit den Fingern.
- **Stechen Sie nicht** durch die Kleidung hindurch.
- **Entfernen Sie** die Schutzkappe **erst**, wenn Sie zur Injektion bereit sind.
- **Versuchen Sie nicht**, die Schutzkappe wieder auf den Fertipen zu stecken.
- **Verwenden Sie den Fertipen nicht mehrmals.**

Wie ist Dupixent aufzubewahren?

- Bewahren Sie den/die Fertipen(s) sowie sämtliche Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.
- Bewahren Sie nicht verwendete Fertipens in der Originalverpackung im Kühlschrank bei Temperaturen zwischen 2 °C und 8 °C auf.
- Die Fertipens in der Originalverpackung aufbewahren, um den Inhalt vor Licht zu schützen.
- **Bewahren Sie** die Fertipens **nicht** länger als 14 Tage bei Raumtemperatur (nicht über 25 °C) auf. Wenn Sie die Schachtel dauerhaft aus dem Kühlschrank entnehmen müssen, notieren Sie das Datum der Entnahme in dem dafür vorgesehenen Bereich auf der Schachtel und verwenden Sie das enthaltene Dupixent innerhalb der nächsten 14 Tage.
- **Schütteln Sie** den Fertipen **niemals**.
- **Erhitzen Sie** den Fertipen **nicht**.



- **Frieren Sie** den Fertigpen **nicht ein**.
- **Setzen Sie** den Fertigpen **nicht** direkter Sonneneinstrahlung **aus**.

A. Vorbereitung

A1. Materialien zusammentragen

Vergewissern Sie sich, dass Folgendes bereitliegt:

- Dupixent-Fertigpen
- 1 Alkoholtupfer*
- 1 Wattebausch oder Gazetupfer*
- 1 durchstichsicheres Behältnis* (siehe Schritt D)

** Nicht im Umkarton enthalten.*

A2. Etikett anschauen

- Vergewissern Sie sich, dass es sich um das korrekte Arzneimittel und die korrekte Dosis handelt.



A3. Verfalldatum prüfen

- Überprüfen Sie das Verfalldatum.

⚠ **Verwenden Sie den Fertigpen nicht nach Ablauf des Verfalldatums.**

⚠ **Bewahren Sie Dupixent nicht länger als 14 Tage bei Raumtemperatur auf.**



A4. Arzneimittel prüfen

Schauen Sie sich das Arzneimittel durch das Sichtfenster des Fertigpens an.


Überprüfen Sie, ob die Flüssigkeit klar und farblos bis blassgelb ist.

Hinweis: Sie sehen möglicherweise Luftblasen. Das ist normal.

⚠ **Verwenden Sie den Fertigpen nicht, wenn die Flüssigkeit trüb oder verfärbt ist oder Ausflockungen oder schwebende Teilchen (Partikel) enthält.**

⚠ **Verwenden Sie den Fertigpen nicht, wenn das Sichtfenster gelb ist.**





A5. Bei Dupixent 300 mg 45 Minuten bzw. bei Dupixent 200 mg 30 Minuten warten

Lassen Sie den Dupixent-Fertigpen mit 300 mg für mindestens 45 Minuten bzw. den Dupixent-Fertigpen mit 200 mg für mindestens 30 Minuten auf einer ebenen Oberfläche liegen, bis er Raumtemperatur (unter 25 °C) angenommen hat.

 Sie dürfen den Fertigpen nicht in der Mikrowelle, mit warmem Wasser oder durch direkte Sonneneinstrahlung aufwärmen.

 Setzen Sie den Fertigpen nicht direkter Sonneneinstrahlung aus.

 Bewahren Sie Dupixent nicht länger als 14 Tage bei Raumtemperatur auf.

Fertigpen mit 300 mg	Fertigpen mit 200 mg
	

B. Auswahl der Injektionsstelle

B1. Empfohlene Injektionsstellen:


- **Oberschenkel**
- **Bauch**, ausserhalb eines Umkreises von 5 cm um Ihren Bauchnabel herum
- **Oberarm**. Wenn eine Pflegeperson die Injektion durchführt, kann auch in die Aussenseite des Oberarms injiziert werden.

Wechseln Sie die Injektionsstelle bei jeder Dupixent-Injektion.

 Stechen Sie nicht durch die Kleidung hindurch.



 Injizieren Sie nicht in empfindliche, verletzte oder vernarbte Hautstellen oder in Hautstellen mit blauen Flecken.



 = Selbstinjektion oder Injektion durch eine Pflegeperson

 = Injektion nur durch eine Pflegeperson


B2. Hände waschen



B3. Injektionsstelle vorbereiten

- Reinigen Sie die Haut an der Injektionsstelle mit einem Alkoholtupfer.
- Lassen Sie die Haut an der Injektionsstelle trocknen, bevor Sie injizieren.

 Berühren Sie die Injektionsstelle vor der Injektion nicht mehr und pusten Sie nicht darauf.



C. Verabreichung der Injektion

C1. Schutzkappe entfernen

Ziehen Sie die Schutzkappe gerade ab.

Die Schutzkappe dabei **nicht abdrehen**.



Entfernen Sie die Schutzkappe **erst**, wenn Sie zur Injektion bereit sind.

Drücken oder berühren Sie **nicht** die Nadelabdeckung mit den Fingern.



Die Nadel befindet sich im Inneren.


⚠ Setzen Sie die Schutzkappe nach dem Entfernen nicht wieder auf den Fertipen.



C2. Zusammendrücken und platzieren

- Drücken Sie die Haut vor und während der Injektion zusammen.
- Ein Zusammendrücken der Haut ist bei Erwachsenen und bei Jugendlichen ab 12 Jahren nicht notwendig.
- Halten Sie den Fertipen beim Platzieren der Nadelabdeckung auf Ihrer Haut so, dass Sie das Sichtfenster sehen können.
- Platzieren Sie die Nadelabdeckung etwa im 90°-Winkel auf Ihrer Haut.

⚠ Drücken oder berühren Sie nicht die Nadelabdeckung mit den Fingern. Die Nadel befindet sich im Inneren.



C3. Herunterdrücken


Drücken Sie den Fertipen fest gegen Ihre Haut, bis Sie die Nadelabdeckung nicht mehr sehen können, und halten Sie diese Position.



- Zu Beginn der Injektion ist ein Klicken zu hören.
- Das Sichtfenster färbt sich gelb.

Die Injektion kann bis zu 15 Sekunden lang dauern.

Ein Zusammendrücken der Haut ist bei Erwachsenen und bei Jugendlichen ab 12 Jahren nicht notwendig.



C4. Festhalten

Halten Sie den Fertipen weiter fest gegen Ihre Haut gedrückt.

- Möglicherweise hören Sie ein zweites Klicken.
- Überprüfen Sie, ob sich das gesamte Sichtfenster gelb gefärbt hat.
- Zählen Sie dann langsam bis fünf.
- Heben Sie anschliessend den Pen von der Haut ab; Ihre Injektion ist abgeschlossen.


Sollte sich das Sichtfenster nicht vollständig gelb färben, entfernen Sie den Pen und wenden Sie sich an Ihre Gesundheitsfachperson.

⚠ Verabreichen Sie sich keine zweite Dosis, ohne vorher mit Ihrer Gesundheitsfachperson zu sprechen.

Ein Zusammendrücken der Haut ist bei Erwachsenen und bei Jugendlichen ab 12 Jahren nicht notwendig.

300 mg	200 mg
--------	--------






C5. Entfernen

- Ziehen Sie den Fertipen nach Abschluss der Injektion gerade nach oben von der Haut weg und entsorgen Sie ihn umgehend wie in Abschnitt D beschrieben.
- Falls Sie etwas Blut an der Injektionsstelle sehen, drücken Sie einen Wattebausch oder Gazetupfer behutsam auf die Injektionsstelle.



Reiben Sie nach der Injektion nicht über die Hautstelle.



D. Entsorgung

- Entsorgen Sie die gebrauchten Fertipens (mitsamt der Nadel im Inneren) und die Nadelschutzkappen in einem durchstichsicheren Behälter.

Entsorgen Sie die gebrauchten Fertipens (mitsamt der Nadel im Inneren) und die Nadelschutzkappen **nicht** im Haushaltsabfall.



Setzen Sie die Schutzkappe nicht wieder auf den Fertipen.



