

Information für Patientinnen und Patienten

Lesen Sie diese Packungsbeilage sorgfältig, bevor Sie das Arzneimittel einnehmen bzw. anwenden. Dieses Arzneimittel ist Ihnen persönlich verschrieben worden und Sie dürfen es nicht an andere Personen weitergeben. Auch wenn diese die gleichen Krankheitssymptome haben wie Sie, könnte ihnen das Arzneimittel schaden.

Bewahren Sie die Packungsbeilage auf, Sie wollen sie vielleicht später nochmals lesen.

Vitamin B₂ Streuli[®], Dragées

Streuli Pharma AG

Was ist Vitamin B₂ Streuli und wann wird es angewendet?

Vitamin B₂ wird vom ganzen Körper für eine Vielzahl von Aufgaben benötigt.

Vitamin B₂ wird bei Mangelerscheinungen und auf Verschreibung des Arztes oder der Ärztin eingenommen. Eine isolierte Unterversorgung des Körpers mit diesem Vitamin tritt nur in seltenen Situationen auf.

Wann darf Vitamin B₂ Streuli nicht eingenommen werden?

Bei Überempfindlichkeit gegen einen der Inhaltsstoffe.

Wann ist bei der Einnahme von Vitamin B₂ Streuli Vorsicht geboten?

Dieses Arzneimittel enthält Lactose und Saccharose. Bitte nehmen Sie Vitamin B₂ Streuli erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt bzw. Ihrer Ärztin ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Zuckerunverträglichkeit leiden.

Dieses Arzneimittel enthält Methyl-4-hydroxybenzoat. Methyl-4-hydroxybenzoat kann allergische Reaktionen, auch Spätreaktionen, hervorrufen.

Bei bestimmungsgemäsem Gebrauch sind keine besonderen Vorsichtsmassnahmen zu befolgen.

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker bzw. Ihre Ärztin oder Apothekerin, wenn Sie

- an anderen Krankheiten leiden,
- Allergien haben oder
- andere Arzneimittel (auch selbst gekaufte!) einnehmen.

Darf Vitamin B₂ Streuli während einer Schwangerschaft oder in der Stillzeit eingenommen werden?

Auf Grund der bisherigen Erfahrung ist bei bestimmungsgemässer Anwendung kein Risiko für das Kind bekannt. Systematische wissenschaftliche Untersuchungen wurden aber nie durchgeführt. Vorsichtshalber sollten Sie während der Schwangerschaft und Stillzeit möglichst auf Arzneimittel verzichten oder den Arzt oder den Apotheker bzw. die Ärztin oder die Apothekerin um Rat fragen.

Wie verwenden Sie Vitamin B₂ Streuli?

Über die genaue Dosierung informiert Sie Ihr Arzt bzw. Ihre Ärztin.

Mit etwas Wasser einnehmen.

Ändern Sie nicht von sich aus die verschriebene Dosierung. Wenn Sie glauben, das Arzneimittel wirke zu schwach oder zu stark, so sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker bzw. mit Ihrer Ärztin oder Apothekerin.

Welche Nebenwirkungen kann Vitamin B₂ Streuli haben?

Für Vitamin B₂ Streuli sind bisher bei bestimmungsgemäsem Gebrauch keine Nebenwirkungen beobachtet worden.



Wenn Sie dennoch Nebenwirkungen beobachten, informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker bzw. Ihre Ärztin oder Apothekerin.

Was ist ferner zu beachten?

Eine Gelbfärbung des Urins unter der Therapie ist völlig normal und soll Sie nicht weiter beunruhigen.

Das Arzneimittel darf nur bis zu dem auf dem Behälter mit «EXP» bezeichneten Datum verwendet werden.

Bei Raumtemperatur (15-25 °C) und ausser Reichweite von Kindern aufbewahren.

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen Ihr Arzt oder Apotheker bzw. Ihre Ärztin oder Apothekerin. Diese Personen verfügen über die ausführliche Fachinformation.

Was ist in Vitamin B₂ Streuli enthalten?

Wirkstoffe

1 überzogene Tablette enthält:

10 mg Riboflavin (Vitamin B₂)

Hilfsstoffe

Tablettenkern: Lactose-Monohydrat, Kartoffelstärke, getrocknetes arabisches Gummi, Gelatine, Talkum, mikrokristalline Cellulose.

Überzug: Saccharose, Methylparahydroxybenzoat (E 218), Schellack, natives Rizinusöl, getrocknetes arabisches Gummi, Gelatine, Calciumcarbonat, Siliciumdioxid-Hydrat, Talkum, hochdisperses Siliciumdioxid, gebleichtes Wachs, Carnaubawachs, Chinolingelb (E 104), Erythrosin (E 127), Indigotin (E132).

Zulassungsnummer

48864 (Swissmedic).

Wo erhalten Sie Vitamin B₂ Streuli? Welche Packungen sind erhältlich?

In Apotheken nur gegen ärztliche Verschreibung.

Packungen mit 100 Dragées.

ZulassungsinhaberIn

Streuli Pharma AG, 8730 Uznach.

Diese Packungsbeilage wurde im Dezember 2023 letztmals durch die Arzneimittelbehörde (Swissmedic) geprüft.

