

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo che contiene importanti informazioni.

Questo medicamento le è stato prescritto dal suo medico o le è stato consegnato senza prescrizione medica in farmacia o in drogheria. Per ottenere il massimo beneficio, usi il medicamento conformemente al foglietto illustrativo o segua le indicazioni del suo medico, del suo farmacista o del suo droghiere.

Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

Coop Vitality Flurbiprofen, Lutschtabletten

Coop Vitality Health Care GmbH

Che cos'è Coop Vitality Flurbiprofene e quando si usa?

Coop Vitality Flurbiprofene, pastiglie, contiene il principio attivo flurbiprofene. Coop Vitality Flurbiprofene è un medicamento indicato per il trattamento di breve durata, ossia per 3 giorni al massimo, delle infiammazioni della mucosa della gola accompagnate da dolore.

L'instaurazione dell'effetto si è osservata circa 30-40 minuti dopo l'uso.

Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?

Coop Vitality Flurbiprofene, pastiglie contiene 2,5 g di carboidrati digeribili per ogni pastiglia ed è adatto alle persone diabetiche.

Quando non si può assumere Coop Vitality Flurbiprofene?

- Se ha un'ipersensibilità al principio attivo flurbiprofene o ad altri antinfiammatori (antireumatici), analgesici e antipiretici (es. acido acetilsalicilico, aspirina). Un'ipersensibilità a questi farmaci si manifesta per esempio con asma, mancanza di respiro, disturbi circolatori, gonfiore della pelle e delle mucose o eruzioni cutanee (orticaria).
- Durante la gravidanza o l'allattamento (vedi anche «Si può somministrare Coop Vitality Flurbiprofene durante la gravidanza o l'allattamento?»)
- Se soffre di un'ulcera gastrica o duodenale o di sanguinamenti gastrointestinali;
- Nei bambini di età inferiore ai 12 anni. Coop Vitality Flurbiprofene non è ancora stato testato nei bambini sotto i 12 anni.
- Se soffre di disturbi emorragici, emopoietici (di produzione delle cellule del sangue) o della coagulazione.
- In caso d'insufficienza cardiaca o di grave insufficienza renale o epatica.
- Se soffre di intolleranza ad alcuni tipi di zuccheri.

Quando è richiesta prudenza nella somministrazione di Coop Vitality Flurbiprofene?

Nelle seguenti situazioni l'uso di Coop Vitality Flurbiprofene è concesso solo su prescrizione medica e sotto controllo medico:

- se soffre d'asma;
- se nel passato ha sofferto di ulcera gastrica o duodenale;
- se soffre di un disturbo dei reni o del fegato;
- se è in cura per una malattia del cuore, in particolare un'insufficienza cardiaca o un'ipertensione arteriosa;
- se riceve un trattamento con anticoagulanti (medicamenti che mantengono liquido il sangue) o se soffre di un disturbo della coagulazione;
- se assume farmaci antireumatici o altri antidolorifici (es. acido acetilsalicilico, aspirina);
-



se soffre di una malattia autoimmune cronica come il lupus eritematoso sistemico (LES) o la connettivite mista;

- se è anziano, perché in tal caso ha maggiori probabilità di sviluppare gli effetti collaterali elencati in questo foglietto illustrativo.

Con l'utilizzo di medicinali antinfiammatori non steroidei (FANS), tra cui anche Coop Vitality Flurbiprofene, sono stati segnalati dolori toracici, che possono essere un segno di una reazione allergica potenzialmente grave chiamata sindrome di Kounis.

Sostanze ausiliarie

Coop Vitality Flurbiprofene contiene un aroma contenente allergeni (citrale, citronellolo et e-dlimonene). Gli allergeni possono causare reazioni allergiche.

Coop Vitality Flurbiprofene può provocare reazioni allergiche nei pazienti che sono ipersensibili ai coloranti azoici.

Coop Vitality Flurbiprofene contiene isomalto e maltitolo. Se sa di presentare una intolleranza a determinati zuccheri, le consigliamo di assumere Coop Vitality Flurbiprofene soltanto dopo aver consultato il suo medico. Il valore calorico è di 2,3 kcal/g di isomalto e di maltitolo. Coop Vitality Flurbiprofene, pastiglie può avere un lieve effetto lassativo.

Interrompa l'assunzione delle pastiglie ai primi segni di reazioni cutanee (eruzione cutanea, desquamazione della pelle, formazione di vescicole) o in presenza di altri segni di una reazione allergica e si rivolga immediatamente a un medico. Informi il suo medico se manifesta sintomi gastrici insoliti (soprattutto sanguinamenti).

Se nota un peggioramento dei sintomi o la comparsa di nuovi disturbi (es. febbre, difficoltà di deglutizione), deve consultare un medico.

Informi il suo medico o il suo farmacista o il suo droghiere, nel caso in cui soffre di altre malattie, soffre di allergie o assume altri medicinali (anche se acquistati di sua iniziativa)!

Si può assumere Coop Vitality Flurbiprofene durante la gravidanza o l'allattamento?

Coop Vitality Flurbiprofene non può essere utilizzato durante la gravidanza o l'allattamento, a meno che non l'abbia esplicitamente prescritto il medico. **Importante:** nell'ultimo trimestre di gravidanza e durante l'allattamento, l'uso di Coop Vitality Flurbiprofene è in linea di principio vietato.

Coop Vitality Flurbiprofene fa parte di un gruppo di medicinali che possono compromettere la fertilità delle donne. Questo effetto è reversibile dopo l'interruzione dell'assunzione delle pastiglie. È improbabile che l'uso occasionale di Coop Vitality Flurbiprofene influenzi la possibilità di restare incinte. Tuttavia, se ha difficoltà a restare incinta, parli con il suo medico prima di utilizzare questo medicamento.

Come usare Coop Vitality Flurbiprofene?

Adulti e adolescenti dai 12 anni:

Lasciar sciogliere lentamente in bocca una pastiglia ogni 3-6 ore. La dose totale giornaliera non deve superare 5 pastiglie.

La pastiglia deve essere mossa nella bocca mentre si scioglie. Se insorgono irritazioni nella bocca, interrompere il trattamento con Coop Vitality Flurbiprofene.

Non utilizzi Coop Vitality Flurbiprofene per più di 3 giorni e lo usi solo per trattare i disturbi indicati all'inizio. Impieghi il numero minimo di pastiglie richieste per l'attenuazione dei sintomi, e solo per il tempo necessario. Se i disturbi non migliorano al più tardi entro 3 giorni, consulti il medico per chiarirne la causa.

Bambini di età inferiore ai 12 anni:

Coop Vitality Flurbiprofene non può essere somministrato a bambini sotto i 12 anni.

Pazienti anziani:



Gli anziani possono reagire al medicamento in modo più sensibile rispetto ai giovani adulti. È quindi particolarmente importante che i pazienti anziani notifichino subito eventuali effetti collaterali al medico, al farmacista o al droghiere.

Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal medico. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico, al suo farmacista o al suo droghiere.

Quali effetti collaterali può avere Coop Vitality Flurbiprofene?

Con l'assunzione di Coop Vitality Flurbiprofene possono manifestarsi i seguenti effetti collaterali, che in particolari circostanze potrebbero richiedere un trattamento medico.

Molto comune (riguarda più di 1 utilizzatore su 10)

Sensazione di fastidio in bocca (calore, bruciore o prurito).

Comune (riguarda da 1 a 10 utilizzatori su 100)

Diarrea, nausea, ulcere nella mucosa orale, secchezza della bocca, dolore alla bocca, irritazione della faringe, capogiri, mal di testa.

Non comune (riguarda da 1 a 10 utilizzatori su 1000)

Sonnolenza, formazione di vescicole nell'orofaringe, ridotta sensibilità della faringe, flatulenza, vomito, disturbi digestivi, bruciore di stomaco o dolori nella parte superiore dell'addome, gonfiore di stomaco, stipsi, alterazione del senso del gusto, disturbi cutanei come eruzioni cutanee e prurito, peggioramento dell'asma, respiro sibilante, fiato corto, stanchezza o difficoltà ad addormentarsi, febbre, dolori.

Raro (riguarda da 1 a 10 utilizzatori su 10'000)

Reazioni anafilattiche.

Casi isolati

Anemia, basso numero di piastrine, gonfiori, ipertensione arteriosa, insufficienza cardiaca, gravi reazioni cutanee come formazione di vescicole, epatite, dolori alla gabbia toracica (sindrome di Kounis).

Se osserva effetti collaterali qui non descritti, si rivolga al suo medico, il suo farmacista o il suo droghiere.

Di che altro occorre tener conto?

Stabilità

Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con «EXP» sulla confezione.

Istruzioni di conservazione

Conservare Coop Vitality Flurbiprofene nella sua confezione originale e a temperatura non superiore ai 30°C. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Ulteriori indicazioni

Il medico, il farmacista o il droghiere, che sono in possesso di documentazione professionale, possono darle ulteriori informazioni.

Cosa contiene Coop Vitality Flurbiprofene?

Una pastiglia di Coop Vitality Flurbiprofene contiene:

Principio attivo

flurbiprofene 8,75 mg

Sostanze ausiliarie

isomalto (E 953), maltitolo (E 965), ponceau 4R (E 124), giallo tramonto FCF (E 110), acesulfame potassico (E 950), idrossido di potassio, aromi (aroma d'arancia contenente citrale, citronellolo e d-



limonene; levomentolo).

Numero dell'omologazione

69182 (Swissmedic).

Dov'è ottenibile Coop Vitality Flurbiprofene? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia e in drogheria, senza prescrizione medica.

Coop Vitality Flurbiprofene è disponibile in confezioni da 16 pastiglie.

Titolare dell'omologazione

Coop Vitality Health Care Sagl, 4704 Niederbipp.

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel settembre 2024 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

