

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo prima di fare uso del medicamento. Questo medicamento le è stato prescritto personalmente e quindi non deve essere consegnato ad altre persone, anche se i sintomi sono gli stessi. Il medicamento potrebbe nuocere alla loro salute.

Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

MOVIPREP® Orange

Norgine AG

Che cos'è Moviprep Orange e quando si usa?

Su prescrizione medica.

Moviprep Orange viene impiegato nella pulizia intestinale prima di procedure cliniche che richiedono un intestino pulito, come ad esempio prima di indagini diagnostiche intestinali (endoscopia, radiografia). Moviprep Orange agisce svuotando l'intestino. Uno degli effetti attesi nell'uso di Moviprep Orange è, quindi, una diarrea acquosa.

Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?

Se prende altri medicinali per via orale (come anticoncezionali orali), non deve assumerli 1 ora prima, durante e fino a 1 ora dopo l'assunzione di Moviprep Orange, perché altrimenti verrebbero eliminati dal apparato digerente e dunque non essere efficaci.

Se prende contraccettivi orali, deve utilizzare altri metodi contraccettivi (ad esempio preservativi) per prevenire la gravidanza.

Quando non si può assumere/usare Moviprep Orange?

- se è ipersensibile (allergico/a) al macrogol 3350, ad un altro principio attivo o ad un qualsiasi componente di Moviprep Orange;
- se l'intestino non è completamente accessibile o se è presente un blocco (ostruzione) del tratto digerente o un'occlusione intestinale (ileo);
- se è presente una perforazione nella parete del tratto intestinale;
- se soffre di un disturbo dello svuotamento dello stomaco (es. atonia gastrica);
- se soffre di paralisi intestinale (ciò può costituire una manifestazione conseguente a un intervento chirurgico sulla cavità addominale);
- se soffre di fenilchetonuria. La fenilchetonuria è una malattia metabolica congenita, nella quale la fenilalanina non può essere ulteriormente elaborata all'interno dell'organismo. Moviprep Orange contiene aspartame come fonte di fenilalanina;
- se soffre di deficit di glucosio-6-fosfato deidrogenasi;
- se soffre di una dilatazione acuta del colon (megacolon tossico) come conseguenza di una malattia infiammatoria cronica dell'intestino, quale ad esempio la colite ulcerosa o la malattia di Crohn.

Quando è richiesta prudenza nella somministrazione/nell'uso di Moviprep Orange?

Se le sue condizioni generali o di salute sono cattive o se soffre di una malattia grave.

Informi il suo medico, se soffre dei seguenti disturbi:

- se ha difficoltà o disturbi nella deglutizione dei liquidi, per cui questi devono essere resi meno fluidi;
- se soffre di disturbi da reflusso (rigurgito del contenuto dello stomaco nell'esofago);
- se soffre di disturbi della funzionalità dei reni;
- se soffre di insufficienza cardiaca o gravi problemi renali o se assume medicinali per la pressione sanguigna;



- se soffre di debolezza cardiaca; malattie cardiocircolatorie, aritmia o palpitazioni oppure assume medicinali contro queste malattie
- se soffre di un'affezione tiroidea;
- se soffre di una carenza di liquidi;
- se soffre di una riacutizzazione di una malattia infiammatoria cronica dell'intestino (morbo di Crohn o colite ulcerosa);
- se soffre di epilessia o ha mai avuto attacchi convulsivi.

Nei pazienti con disturbi della coscienza, Moviprep Orange va usato solo sotto controllo medico.

Se si avverte un dolore addominale improvviso o un'emorragia rettale durante l'assunzione di Moviprep Orange per la preparazione dell'intestino, contattare il medico o richiedere assistenza medica immediatamente.

Se durante l'assunzione di Moviprep Orange si verificano episodi di vomito (con sangue), seguiti da improvvisi dolori al petto, al collo o all'addome, difficoltà a deglutire o respirare, interrompa l'assunzione del medicamento e contatti immediatamente il medico.

Se soffre di un'intolleranza accertata dal suo medico contro determinati zuccheri, assuma Moviprep Orange solo dopo averlo consultato.

Moviprep Orange contiene 363,2 mmol (8,4 g) di sodio per trattamento. Da tenere in considerazione soprattutto in pazienti che seguono una dieta a basso contenuto di sodio. Solo una parte del sodio viene assorbita.

Moviprep Orange contiene 28,4 mmol (1,1 g) di potassio per trattamento. Da tenere in considerazione in pazienti con ridotta funzionalità renale o in pazienti che seguono una dieta a basso contenuto di potassio.

Moviprep contiene 0,175 g di aspartame per bustina A. Aspartame è una fonte di fenilalanina. Può esserle dannoso se è affetto da fenilchetonuria, una rara malattia genetica che causa l'accumulo di fenilalanina perché il corpo non riesce a smaltirla correttamente.

L'assunzione della soluzione preparata Moviprep Orange non sostituisce l'apporto regolare di liquidi, che deve essere sempre garantito.

Se ha la necessità di addensare liquidi per poterli deglutire in sicurezza, Moviprep Orange può contrastare l'effetto dell'addensante.

Moviprep Orange non agisce sulla capacità di condurre un veicolo o di utilizzare attrezzi o macchine.

Informi il suo medico o il suo farmacista, nel caso in cui

- soffre di altre malattie
- soffre di allergie o
- assume altri medicinali (anche se acquistati di sua iniziativa) o li applica esternamente

Si può assumere/usare Moviprep Orange durante la gravidanza o l'allattamento?

Siccome non sono disponibili dati sull'uso di Moviprep Orange durante la gravidanza, Moviprep Orange va impiegato solo quando il medico lo ritenga assolutamente indispensabile. Se ne sconsiglia la somministrazione durante l'allattamento.

Perciò informi il suo medico se è incinta o pensa di aspettare un bambino oppure se allatta.

Come usare Moviprep Orange?

Dosaggio: adulti a partire dai 18 anni e pazienti più anziani:

Se non diversamente prescritto dal medico, il dosaggio corrisponde a 2 litri (una confezione). La confezione contiene due scatole, ciascuna a sua volta contenente 1 bustina A e 1 bustina B. Il contenuto di una bustina A e di una bustina B è sufficiente a preparare 1 litro di soluzione Moviprep Orange.



Diluire contemporaneamente il contenuto di entrambe le bustine (A e B) in acqua in modo da ottenere 1 litro di liquido.

Il suo medico o il suo farmacista le spiegherà esattamente come prendere Moviprep Orange.

Il medicamento può essere assunto in dose singola o frazionata come descritto qui di seguito e le tempistiche dipendono dal fatto che la procedura clinica sia eseguita in anestesia generale o senza anestesia generale:

Per indagini diagnostiche eseguite in anestesia generale:

1. Dose frazionata: un litro di Moviprep Orange la sera precedente e un litro di Moviprep Orange al mattino presto del giorno dell'indagine diagnostica. Tra la fine dell'assunzione di liquido (Moviprep Orange o liquido limpido) e l'inizio dell'indagine diagnostica devono trascorrere almeno due ore.
2. Dose singola: due litri di Moviprep Orange la sera precedente o due litri di Moviprep Orange al mattino del giorno dell'indagine diagnostica. Tra la fine dell'assunzione di liquido (Moviprep Orange o liquido limpido) e l'inizio dell'indagine diagnostica devono trascorrere almeno due ore.

Per indagini diagnostiche eseguite senza anestesia generale:

1. Dose frazionata: un litro di Moviprep Orange la sera precedente e un litro di Moviprep Orange al mattino presto del giorno dell'indagine diagnostica. Tra la fine dell'assunzione di liquido (Moviprep Orange o liquido limpido) e l'inizio dell'indagine diagnostica deve trascorrere almeno un'ora.
2. Dose singola: due litri di Moviprep Orange la sera precedente o due litri di Moviprep Orange al mattino del giorno dell'indagine diagnostica. Tra la fine dell'assunzione di Moviprep Orange e l'inizio dell'indagine diagnostica devono trascorrere almeno due ore. L'assunzione di qualsiasi liquido limpido deve essere interrotta almeno un'ora prima dell'indagine diagnostica.

Durante l'impiego di Moviprep Orange, bisogna inoltre bere un altro litro di liquidi, quali acqua, brodo, succo di frutta senza polpa, bevande contenenti limonata, tè o caffè (senza latte).


Programmi tempo a sufficienza per arrivare nel luogo dove si sottoporrà a colonscopia.

Importante: dall'inizio dell'assunzione di Moviprep Orange fino alla fine dell'indagine diagnostica programmata, non deve assumere cibi solidi.

Non modifichi di propria iniziativa la posologia prescritta. Se ritiene che l'azione del medicinale sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico o al suo farmacista.

Preparazione della soluzione

- Aprire una delle due scatole trasparenti ed estrarre la bustina A e la bustina B
- Versare il contenuto di entrambe le bustine A e B in un recipiente da 1 litro
- Versare in un contenitore acqua sufficiente per ottenere un litro di soluzione di Moviprep Orange e mescolare fin quando tutta la polvere non sia disciolta e la soluzione Moviprep Orange non sia trasparente o lievemente torbida. Questo processo può durare fino a cinque minuti.



Bere la soluzione

Beva il primo litro di soluzione Moviprep Orange entro 1 – 2 ore. Cerchi di bere un bicchiere di Moviprep Orange ogni 10 – 15 minuti.

Alla fine, prepari il secondo litro di soluzione Moviprep Orange con la bustina A e la bustina B dell'altra scatola. Beva, quindi, la seconda soluzione come la prima.



Durante questo periodo di tempo è necessario bere un altro litro di liquidi, per prevenire la sete e la disidratazione dell'organismo. Possibili bevande sono acqua, brodo, succo di frutta (senza polpa), bibite contenenti limonate, tè o caffè (senza latte). Queste bevande possono essere assunte fino a un'ora prima dell'indagine diagnostica, rispettivamente due ore prima dell'indagine diagnostica eseguita in anestesia generale.

Dopo l'assunzione della soluzione

Iniziare a bere la soluzione nelle vicinanze della toilette. All'improvviso, inizierà la diarrea acquosa. Ciò è perfettamente normale ed è segno dell'effetto di Moviprep Orange. La diarrea scomparirà subito dopo aver finito di bere la soluzione.

In caso di forte sovradosaggio o di intensa diarrea, è sufficiente adottare misure di supporto quali l'introduzione di una sufficiente quantità di liquidi, ad esempio succhi di frutta.

L'uso e la sicurezza di Moviprep Orange nei bambini e negli adolescenti sotto i 18 anni finora non sono stati esaminati.

Quali effetti collaterali può avere Moviprep Orange?

La diarrea è un effetto normale di Moviprep Orange.

Molto comune (riguarda più di 1 utilizzatore su 10)

Disturbi nella regione anale, dolori addominali*, ventre gonfio (gonfiore addominale)*, stanchezza, nausea*, febbre.

Comune (riguarda da 1 a 10 utilizzatori su 100)

Disturbi del sonno, vertigini, mal di testa, vomito*, disturbi della digestione*, tremore muscolare/brividi, sete, fame.

Non comune (riguarda da 1 a 10 utilizzatori su 1000)

Malessere, difficoltà di deglutizione*, valori alterati della funzionalità epatica.

Singoli casi

Reazioni allergiche comprese reazioni anafilattiche, difficoltà respiratorie, attacchi convulsivi collegati a iponatremia particolarmente severa nel sangue, ipertensione temporanea, battito cardiaco irregolare o palpitazioni, disidratazione, gonfiori, sensazione di vomito, rottura dell'esofago a seguito di episodi di vomito, orticaria, prurito, eruzioni cutanee, arrossamenti cutanei, disturbi dell'equilibrio elettrolitico, in particolare aumentata concentrazione di calcio nel sangue, ridotta concentrazione di bicarbonato, calcio, fosfato, potassio e sodio nel sangue [i due ultimi disturbi elencati si presentano più frequentemente nei pazienti che assumono medicinali che agiscono sulla funzionalità renale come, ad esempio, ECA-inibitori e diuretici per il trattamento di malattie cardiache (nei casi di iponatremia particolarmente severa, si possono presentare nei pazienti attacchi convulsivi)] e variazioni della concentrazione di cloruro nel sangue.

* Solitamente questi sintomi migliorano in parte quando si rallenta o sospende l'assunzione di Moviprep Orange.

Queste reazioni compaiono di regola solo durante l'impiego; se dovessero persistere più a lungo, consulti il suo medico.

Importanti effetti collaterali o segni ai quali prestare attenzione e misure da adottare in caso di loro comparsa:

Se compare uno dei seguenti sintomi, sospenda l'assunzione di Moviprep Orange e si rivolga il più presto possibile al medico.

- eruzioni cutanee o prurito
- gonfiori del volto, delle caviglie o di altre parti del corpo
- tachicardia



- pronunciata stanchezza
- difficoltà respiratorie
- attacchi convulsivi

Se entro sei ore dall'assunzione di Moviprep Orange non compare la diarrea, sospenda l'assunzione di Moviprep Orange e si rivolga il più presto possibile al suo medico.

Se osserva effetti collaterali, si rivolga al suo medico o farmacista, soprattutto se si tratta di effetti collaterali non descritti in questo foglietto illustrativo.

Di che altro occorre tener conto?

Moviprep Orange non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con «EXP» sul contenitore.

Termine di consumo dopo l'apertura

La soluzione preparata va consumata entro 24 ore.

Indicazione di stoccaggio

Conservare Moviprep Orange nell'imballaggio originale a temperatura ambiente (15 – 25 °C).

Una volta preparata, la soluzione può essere conservata in un recipiente pulito chiuso o coperto, a temperatura ambiente (15 – 25 °C) o in frigorifero (a 2 – 8 °C). Non congelare la soluzione.

Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Ulteriori indicazioni

Il medico o il farmacista, che sono in possesso di un'informazione professionale dettagliata, possono darle ulteriori informazioni.

Cosa contiene Moviprep Orange?

Principi attivi

1 bustina A contiene: 100 g di macrogol 3350; 7,5 g di sodio solfato anidro; 2,691 g di sodio cloruro; 1,015 g di potassio cloruro.

1 bustina B contiene: 4,7 g d'acido ascorbico, 5,9 g di sodio ascorbato.

La concentrazione di elettroliti dopo miscelazione di entrambe le bustine in una soluzione da 1 litro è la seguente:

Sodio 181,6 mmol/l (di cui al massimo 56,2 mmol/l riassorbibili)

Solfato 52,8 mmol/l

Cloruro 59,8 mmol/l

Potassio 14,2 mmol/l

Ascorbato 56,5 mmol/l

Sostanze ausiliarie

1 bustina A contiene: 0,175 g di aspartame (E951), acesulfame-K (E950); aroma: orange (contiene 0,120 g di glucosio)

Numero dell'omologazione

61631 (Swissmedic)

Dove è ottenibile Moviprep Orange? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia, dietro presentazione della prescrizione medica.

Confezioni con 2 bustine A et 2 bustine B. [B]



Titolare dell'omologazione

Norgine AG

6005 Lucerna

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel giugno 2025 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

