

Information destinée aux patients

Lisez attentivement cette notice d'emballage. Vous y trouverez tous les renseignements importants concernant ce médicament.

Ce médicament vous a été prescrit par votre médecin ou vous a été remis sans ordonnance médicale par votre pharmacien ou votre droguiste. Pour en tirer le meilleur bénéfice, veuillez l'utiliser conformément à la notice d'emballage ou, le cas échéant, aux indications de votre médecin ou de votre pharmacien ou de votre droguiste. Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

Ricura, liquide oral en gouttes

Médicament homéopathique-spagyrique

Quand Ricura est-il utilisé?

Selon la conception homéopathique et les principes thérapeutiques de la spagyrie, Ricura peut être utilisé en cas de rhume avec troubles des sinus.

L'utilisation de ce médicament dans le champ d'applications indiqué est basée sur les principes de l'homéopathie et les principes thérapeutiques de la spagyrie.

De quoi faut-il tenir compte en dehors du traitement?

Si votre médecin vous a prescrit d'autres médicaments, demandez à votre médecin ou à votre pharmacien si Ricura peut être pris simultanément.

En cas de tendance aux refroidissements chez les enfants, il est recommandé de consulter le médecin.

Quand Ricura ne doit-il pas être pris ou seulement avec précaution?

Ne pas utiliser en cas d'hypersensibilité connue au venin d'abeille (*Apis mellifica* D4) ainsi qu'aux astéracées (par exemple *arnica*, camomille, échinacée). Ricura ne doit pas être utilisé en cas d'affections systémiques évolutives telles que la tuberculose, les maladies des globules blancs (leucémie), les collagénoses (processus auto-immunitaires généralisés avec modification du tissu conjonctif tel que le lupus érythémateux) et la sclérose en plaques.

Ricura ne doit pas être utilisé chez les enfants de moins de 6 ans.

Ce médicament contient 88 mg d'alcool (éthanol) dans une prise de 20 gouttes et 66 mg d'alcool (éthanol) dans une prise de 15 gouttes, cela correspond à 176 mg/ml (17,6 % p/v). La quantité d'alcool contenue dans la prise de 20 gouttes de ce médicament équivaut à moins de 3 ml de bière ou 1 ml de vin. La quantité d'alcool contenue dans la prise de 15 gouttes de ce médicament équivaut à moins de 2 ml de bière ou 1 ml de vin.

La petite quantité d'alcool contenue dans ce médicament n'a aucun effet notable.

Veuillez informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste si

- vous souffrez d'une autre maladie
- vous êtes allergique
- vous prenez déjà d'autres médicaments (même en automédication!).

Ricura peut-il être pris pendant la grossesse ou l'allaitement?



Sur la base des expériences faites à ce jour, aucun risque pour l'enfant n'est connu si ce médicament est utilisé conformément à l'usage auquel il est destiné. Toutefois, aucune étude scientifique systématique n'a été effectuée. Par mesure de précaution, vous devriez renoncer si possible à prendre des médicaments durant la grossesse et l'allaitement, ou demander l'avis de votre médecin, de votre pharmacien ou de votre droguiste.

Comment utiliser Ricura?

Sauf prescription contraire du médecin:

Adultes: 20 gouttes, enfants à partir de 6 ans et adolescents: 10-15 gouttes, à prendre 4 fois par jour dans un peu d'eau avant les repas.

Ricura ne doit pas être utilisé chez les enfants de moins de 6 ans.

Veuillez vous conformer au dosage figurant sur la notice d'emballage ou prescrit par votre médecin. En l'absence de l'amélioration escomptée lors d'un traitement chez l'enfant, veuillez consulter un médecin. Si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte, veuillez vous adresser à votre médecin, à votre pharmacien ou à votre droguiste.

Quels effets secondaires Ricura peut-il provoquer?

La prise de Ricura peut provoquer les effets secondaires suivants: Réactions d'hypersensibilité à l'un des ingrédients (apis, echinacea), (telles que des éruptions cutanées et très rarement, de l'essoufflement ou des réactions circulatoires).

Si vous remarquez des effets secondaires, veuillez en informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste. Ceci vaut en particulier pour les effets secondaires non mentionnés dans cette notice d'emballage.

La prise de médicaments homéopathiques peut aggraver passagèrement les troubles (aggravation initiale). Si cette aggravation persiste, cessez le traitement avec Ricura et informez-en votre médecin ou votre pharmacien ou votre droguiste.

À quoi faut-il encore faire attention?

Stabilité

Ce médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention «à utiliser jusqu'au» sur le récipient.

Remarques concernant le stockage

Conserver à température ambiante (15-25 °C).

Conserver hors de portée des enfants.

Remarques complémentaires

Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste.

Que contient Ricura?

1 g de liquide (= 0,98 ml / 37 gouttes) contient:

Principes actifs

Allium cepa e bulbo spag. Peka D3 (HAB 47a) 140 mg



Apis mellifica (HAB) D4 140 mg

Echinacea angustifolia et/aut Echinacea pallida ex planta tota
cum floribus spag. Peka TM (HAB 47a) 150 mg

Luffa operculata (HAB) D4 140 mg

Magnesium fluoratum (HAB) D8 140 mg

Plantago major ex herba spag. Peka TM (HAB 47a) 150 mg

Thuja occidentalis (HAB) D6 140 mg

Excipients

éthanol, eau purifiée

Contient 22 % de vol d'éthanol

Numéro d'autorisation

51285 (Swissmedic)

Où obtenez-vous Ricura? Quels sont les emballages à disposition sur le marché?

En pharmacie et en droguerie, sans ordonnance médicale.

Emballage de 50 ml.

Titulaire de l'autorisation

ebi-pharm ag, Lindachstr. 8c, 3038 Kirchlindach

Fabricant

PEKANA® Naturheilmittel GmbH, D-88353 Kisslegg

Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en juin 2024 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).

