

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo prima di fare uso del medicamento. Questo medicamento è stato prescritto soltanto per lei e non può essere somministrato ad altre persone: anche in presenza degli stessi sintomi, il medicamento potrebbe nuocere alla loro salute.

Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

Desomedin®

Bausch & Lomb Swiss AG

Che cos'è Desomedin e quando si usa?

Desomedin collirio, soluzione contiene una sostanza attiva antibatterica. Il medicamento si usa in caso di affezioni batteriche dell'occhio e dei suoi annessi come congiuntiviti, infezioni della palpebra (orzaiolo) e delle vie lacrimali.

Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?

Questo medicamento le è stato prescritto dal suo medico o dal suo farmacista per il trattamento dei disturbi dell'occhio di cui soffre attualmente. Non lo usi per il trattamento di altre malattie o di altre persone.

Indicazione per i portatori di lenti a contatto: durante il trattamento con Desomedin non si devono portare lenti a contatto.

In caso di trattamento concomitante con altri preparati oftalmici, attendere 15 minuti tra le singole instillazioni.

Quando non si può usare Desomedin?

In caso di ipersensibilità (allergia) nota o presunta a uno dei componenti di questo preparato oftalmico.

Quando è richiesta prudenza nell'uso di Desomedin?

Se dopo 2-3 giorni di trattamento con Desomedin collirio, soluzione i suoi disturbi oculari peggiorano o compaiono nuovi sintomi, consulti immediatamente il suo medico.

Dato che in seguito all'uso di Desomedin può manifestarsi visione offuscata, si deve attendere il ripristino di una vista chiara, prima di condurre veicoli o utilizzare macchine.

Questo medicamento contiene 0,09 mg di boro in ciascuna goccia equivalenti a 2,188 mg/ml. Questo medicamento non deve essere somministrato a bambini al di sotto dei 2 anni di età senza indicazione del medico, poiché contiene boro e può danneggiare la fertilità in futuro.

Informi il suo medico o il suo farmacista, nel caso in cui soffre di altre malattie, soffre di allergie o assume o applica nell'occhio altri medicinali (anche se acquistati di sua iniziativa).

Si può usare Desomedin durante la gravidanza o l'allattamento?

L'uso durante la gravidanza è possibile solo previo consenso del suo medico o del suo farmacista. Il medicamento non deve essere usato durante l'allattamento.

Come usare Desomedin?

Adulti: in generale si instilla 1 goccia di Desomedin nell'occhio da 4 a 6 volte al giorno. Eviti un uso prolungato o ripetuto, poiché i batteri possono sviluppare resistenze. La durata del trattamento non deve pertanto superare gli 8 giorni.

L'uso e la sicurezza di questo medicamento nei bambini e negli adolescenti finora non sono stati esaminati in maniera sistematica, pertanto se ne sconsiglia l'utilizzo!

Prima del primo utilizzo, rimuova l'anello di sicurezza. Si lavi accuratamente le mani prima dell'applicazione. Per mantenere la sterilità del medicamento, non toccare la punta del contagocce né con le mani né con l'occhio e richiudere bene il flaconcino subito dopo l'uso.



Dopo l'instillazione, chiudere l'occhio trattato per circa 2 minuti esercitando con il dito indice una leggera pressione sull'angolo interno dell'occhio. Ciò ritarda il deflusso del collirio verso il naso.

Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal suo medico. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico o al suo farmacista.

Quali effetti collaterali può avere Desomedin?

Con l'uso di Desomedin possono verificarsi i seguenti effetti collaterali:

Non nota (la frequenza non può essere definita sulla base dei dati disponibili):

Potrebbero manifestarsi un'irritazione oculare transitoria, sensibilità degli occhi o reazioni allergiche. I principi attivi contenuti nei preparati oftalmici possono entrare nella circolazione sanguigna. Pertanto, sono possibili effetti collaterali anche nel corpo. Se osserva effetti collaterali, si rivolga al suo medico o farmacista, soprattutto se si tratta di effetti collaterali non descritti in questo foglietto illustrativo.

Di che altro occorre tener conto?

Stabilità

Il medicamento non deve essere utilizzato oltre la data indicata con «EXP» sul contenitore.

Termine di consumo dopo l'apertura

Dopo l'apertura, utilizzare entro 30 giorni.

Indicazioni di stoccaggio

Conservare nella confezione originale chiusa a temperatura ambiente (15-25 °C) e fuori dalla portata dei bambini. Al termine del trattamento riportare il medicamento al punto di consegna (medico o farmacista) per uno smaltimento conforme. Il suo medico e il suo farmacista, che sono in possesso di un'informazione professionale dettagliata, possono darle ulteriori informazioni.

Indicazioni per lo smaltimento

Non gettare i medicinali nell'acqua di scarico o nei rifiuti domestici. I medicinali scaduti o non più necessari, in uso nelle economie domestiche, possono essere consegnati nelle farmacie o nei punti di raccolta. Queste misure aiutano a proteggere l'ambiente.

Cosa contiene Desomedin?

1 ml Desomedin collirio, soluzione contiene:

Principi attivi

1 mg di esamidina diisetionato.

Sostanze ausiliarie

Cloruro di sodio, acido bórico, borace, acqua depurata.

Numero dell'omologazione

53037 (Swissmedic).

Dove è ottenibile Desomedin? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia, senza prescrizione medica previa consulenza specialistica personale del farmacista.

Desomedin collirio, soluzione 10 ml.

Titolare dell'omologazione

Bausch & Lomb Swiss AG, Zug.

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel giugno 2026 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

