

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo che contiene importanti informazioni. Questo medicamento le è stato prescritto dal suo medico o le è stato consegnato senza prescrizione medica in farmacia. Faccia uso corretto del medicamento o segua le indicazioni del suo medico o del suo farmacista, al fine di ottenere il maggior beneficio. Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

Fortakehl D5, compresse

Medicamento omeopatico

Quando si usa Fortakehl D5, compresse?

Secondo la concezione che sta alla base dei medicinali omeopatici Fortakehl D5, compresse può essere usato in caso di disturbi allo stomaco.

Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?

Se il suo medico le ha prescritto altri medicinali, chieda al suo medico o al suo farmacista se contemporaneamente può assumere Fortakehl D5, compresse.

Quando non si può usare Fortakehl D5, compresse e quando la sua somministrazione richiede prudenza?

Fortakehl D5, compresse non può essere usato in caso di allergia conosciuta alla penicillina e a sostanze simili. In caso di disturbi della digestione intestinale dei bambini sotto 12 anni, bisogna consultare il medico. Per questo ragione, nei bambini sotto i 12 anni, il medicamento non deve essere usato senza consultazione medica. Informi il suo medico o il suo farmacista se

- soffre di altre malattie
- soffre di allergie o
- assume o applica esternamente altri medicinali (anche se acquistati di propria iniziativa).

Si può usare Fortakehl D5, compresse durante la gravidanza o l'allattamento?

In base alle esperienze fatte finora, non sono noti rischi per il bambino se il medicamento è usato correttamente. Tutta via non sono ancora stati eseguiti studi scientifici sistematici. Per precauzione dovrebbe rinunciare nella misura del possibile ad assumere medicinali durante la gravidanza e il periodo d'allattamento o chiedere consiglio al suo medico o al suo farmacista.

Come usare Fortakehl D5, compresse?

Salvo diversa prescrizione medica, prendere 1 – 3 compresse al giorno dopo la cena o 2 ore prima della colazione, con un po' di liquido. Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal suo medico. Se non si manifesta il miglioramento desiderato nel trattamento di un bambino piccolo/bambino, deve essere consultato un medico. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico o al suo farmacista.

Quali effetti collaterali può avere Fortakehl D5, compresse?



In seguito all'assunzione di Fortakehl D5, compresse possono manifestarsi i seguenti effetti collaterali: In casi rari, reazioni allergiche quali prurito, arrossamenti cutanei, difficoltà respiratorie. In casi di questo genere, si deve subito sospendere il medicamento e consultare immediatamente il medico. Se osserva effetti collaterali non descritti, dovrebbe informare il suo medico o il suo farmacista. Con l'assunzione di medicinali omeopatici, i disturbi possono momentaneamente aggravarsi (aggravamento iniziale). Se l'aggravamento dovesse persistere, interrompa il trattamento con Fortakehl D5, compresse e informi il suo medico o il suo farmacista.

Di che altro occorre tener conto?

Il medicamento non deve essere utilizzato oltre la data indicata con "verwendbar bis" sulla confezione. Conservare il medicamento fuori dalla portata dei bambini. Conservare a temperatura ambiente (15-25 °C). Il medico, il farmacista possono darle ulteriori informazioni.

Cosa contiene Fortakehl D5, compresse?

1 compressa contiene:

250 mg Penicillium roquefortii D5 trituratio (HAB, 6).

Questo preparato contiene inoltre lattosio come sostanza ausiliaria.

Numero dell'omologazione

50288 (Swissmedic)

Dove è ottenibile Fortakehl D5, compresse? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia senza prescrizione medica.

Confezione da 20 compresse.

Titolare dell'omologazione

ebi-pharm ag, Lindachstr. 8c, 3038 Kirchlintal

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel novembre 2005 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

