

Information destinée aux patients

Lisez attentivement cette notice d'emballage. Vous y trouverez tous les renseignements importants concernant ce médicament.

Ce médicament vous a été prescrit par votre médecin ou vous a été remis sans ordonnance médicale par votre pharmacien ou votre droguiste. Pour en tirer le meilleur bénéfice, veuillez l'utiliser conformément à la notice d'emballage ou, le cas échéant, aux indications de votre médecin, de votre pharmacien ou de votre droguiste. Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

PROALLER, globules

Médicament homéopathique-spagyrique

Quand PROALLER est-il utilisé?

Selon la conception homéopathique et les principes thérapeutiques de la spagyrie, PROALLER peut être utilisé en cas d'allergies. L'utilisation de ce médicament dans le champ d'applications indiqué est basée sur les principes de l'homéopathie et les principes thérapeutiques de la spagyrie.

De quoi faut-il tenir compte en dehors du traitement?

Si votre médecin vous a prescrit d'autres médicaments, demandez à votre médecin ou à votre pharmacien si PROALLER peut être pris simultanément.

Quand PROALLER ne doit-il pas être pris ou seulement avec précaution?

Si votre médecin vous a informé d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament. Veuillez informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste si

- vous souffrez d'une autre maladie
- vous êtes allergique
- vous prenez déjà d'autres médicaments (même en automédication!).

PROALLER peut-il être pris pendant la grossesse ou l'allaitement?

Sur la base des expériences faites à ce jour, aucun risque pour l'enfant n'est connu si ce médicament est utilisé conformément à l'usage auquel il est destiné. Toutefois, aucune étude scientifique systématique n'a été effectuée. Par mesure de précaution, vous devriez renoncer si possible à prendre des médicaments durant la grossesse et l'allaitement, ou demander l'avis de votre médecin, de votre pharmacien ou de votre droguiste.

Comment utiliser PROALLER?

Sauf prescription contraire du médecin: adultes et adolescents à partir de 12 ans, 10 globules 3 - 4 fois par jour, enfants de moins de 12 ans, 8 globules 3 - 4 fois par jour, enfants de moins de 6 ans 4 - 6 globules 3 - 4 fois par jour.

Laisser fondre les globules dans la bouche.

Veuillez vous conformer au dosage figurant sur la notice d'emballage ou prescrit par votre médecin. En l'absence de l'amélioration escomptée lors d'un traitement chez le petit enfant / l'enfant, veuillez consulter un médecin. Si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte, veuillez vous adresser à votre médecin, à votre pharmacien ou à votre droguiste.

Quels effets secondaires PROALLER peut-il provoquer?



La prise de médicaments homéopathiques peut aggraver passagèrement les troubles (aggravation initiale). Si cette aggravation persiste, cessez le traitement avec PROALLER et informez-en votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste.

Aucun effet secondaire de PROALLER n'a été constaté à ce jour en cas d'usage conforme à celui auquel le médicament est destiné.

Si vous remarquez toutefois des effets secondaires, veuillez en informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste.

À quoi faut-il encore faire attention?

Stabilité

Ce médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention «à utiliser jusqu'au» sur le récipient.

Remarques concernant le stockage

Conserver à température ambiante (15-25 °C).

Conserver hors de portée des enfants.

Remarques complémentaires

Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin ou votre pharmacien ou votre droguiste.

Que contient PROALLER?

1 g de globules (70 à 90 globules) contient:

Principes actifs

Acidum formicicum(HAB) D3 1,0 mg

Calcium fluoratum (HAB) D8 1,6 mg

Euphrasia stricta et/aut Euphrasia officinalis ex planta tota cum floribus spag. Peka D4 (HAB 47a) 1,2 mg

Nerium oleander (HAB) D4 1,6 mg

Pulsatilla pratensis ex planta tota cum floribus spag. Peka D4 (HAB 47a) 1,2 mg

Schoenocaulon officinale (HAB) D12 1,8 mg

Scrophularia nodosa (HAB) TM 1,6 mg

Excipients

Saccharose 1 g

Numéro d'autorisation

54389 (Swissmedic)

Où obtenez-vous PROALLER? Quels sont les emballages à disposition sur le marché?

En pharmacie et en droguerie, sans ordonnance médicale.

Emballage de 10 g.



Titulaire de l'autorisation

ebi-pharm ag, Lindachstr. 8c, CH-3038 Kirchlintach

Fabricant

PEKANA® Naturheilmittel GmbH, DE-88353 Kisslegg

Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en octobre 2024 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).

