

Information destinée aux patients

Lisez attentivement la notice d'emballage avant de prendre ou d'utiliser le médicament. Ce médicament vous a été remis personnellement sur ordonnance médicale. Ne le remettez donc pas à d'autres personnes, même si elles semblent présenter les mêmes symptômes que vous. En effet, ce médicament pourrait nuire à leur santé. Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

Gouttes Dr. Reckeweg® R3 Corvosan

Quand les gouttes Dr. Reckeweg® R3 Corvosan sont-elles utilisées?

Selon la conception homéopathique, les gouttes Dr. Reckeweg® R3 Corvosan peuvent être utilisées sur prescription de votre médecin en cas de faiblesse cardiaque légère et moyenne.

De quoi faut-il tenir compte en dehors du traitement?

Si votre médecin vous a prescrit d'autres médicaments, demandez à votre médecin ou à votre pharmacien si les gouttes Dr. Reckeweg® R3 Corvosan peuvent être prises simultanément.

Quand les gouttes Dr. Reckeweg® R3 Corvosan ne doivent-elles pas être utilisées ou seulement avec précaution?

Lors de troubles tels que pouls irrégulier, fortes palpitations, douleurs poignantes dans la poitrine, dyspnée (difficulté à respirer) d'apparition soudaine ou se prolongeant, il faut consulter un médecin. Celui-ci constatera si le cœur ou les vaisseaux sont atteints du point de vue organique ou si les douleurs sont d'origine nerveuse.

Veillez informer votre médecin ou votre pharmacien si:

- vous souffrez d'une autre maladie,
- vous êtes allergique,
- vous prenez déjà d'autres médicaments en usage interne ou externe (même en automédication)!

Les gouttes Dr. Reckeweg® R3 Corvosan peuvent-elles être prises/utilisées pendant la grossesse ou l'allaitement?

Sur la base des expériences faites à ce jour, aucun risque pour l'enfant n'est connu si le médicament est utilisé conformément à l'usage auquel il est destiné. Toutefois, aucune étude scientifique systématique n'a été effectuée. Par mesure de précaution, vous devriez renoncer si possible à prendre des médicaments durant la grossesse et l'allaitement ou demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

Comment utiliser les gouttes Dr. Reckeweg® R3 Corvosan?

Sauf prescription contraire du médecin, prendre 10-20-30 gouttes 3 à 6 fois par jour dans un peu d'eau. Réduire lentement la dose selon l'amélioration, mais continuer à prendre 10 à 15 gouttes 2 à 3 fois par jour sur une assez longue période. Ne changez pas de votre propre chef le dosage prescrit. Adressez-vous à votre médecin ou à votre pharmacien si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte.

Quels effets secondaires les gouttes Dr. Reckeweg® R3 Corvosan peuvent-elles provoquer?

L'emploi approprié du médicament n'a donné lieu à aucun effet secondaire attesté à ce jour. Si vous remarquez toutefois des effets secondaires, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien. La prise de médicaments homéopathiques peut aggraver passagèrement les troubles (aggravation initiale). Si cette aggravation persiste, cessez le traitement avec les gouttes.

Dr. Reckeweg® R3 Corvosan et informez votre médecin ou votre pharmacien.

A quoi faut-il encore faire attention?



Le médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention «EXP» sur le récipient. Conserver à température ambiante (15-25° C) et hors de portée des enfants. Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin ou votre pharmacien. Les gouttes contiennent 39 % vol. d'alcool.

Que contiennent les gouttes Dr. Reckeweg® R3 Corvosan?

10 ml contiennent: Acidum arsenicosum (Arsenicum album) D5 0,5 ml, Crataegus TM 2 ml, Digitalis purpurea D3 1 ml, Kalium carbonicum D3 0,5 ml, Kalmia latifolia D3 1 ml, Phosphorus D5 1 ml, Selenicereus grandiflorus (Cactus) D2 1 ml, Spigelia anthelmia D3 1 ml, Strophanthus D3 1 ml, Urginea maritima var. rubra (Scilla) D2 1 ml. Contient 39 % vol. d'alcool.

Numéro d'autorisation

45035

Où obtenez-vous les gouttes Dr. Reckeweg® R3 Corvosan? Quels sont les emballages à disposition sur le marché?

En pharmacie sur ordonnance médicale. Flacons compte-gouttes de 50 ml.

Titulaire de l'autorisation

Laboratoire Jacques Reboh et fils SA

Route de la Glâne 4

CH-1680 Romont

Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en 07/2004 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).

