

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo prima di fare uso del medicamento. Questo medicamento le è stato prescritto personalmente e quindi non deve essere consegnato ad altre persone, anche se i sintomi sono gli stessi. Il medicamento potrebbe nuocere alla loro salute. Conservi questo foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

Gocce Dr. Reckeweg® R3 Corvosan

Che cosa sono le gocce Dr. Reckeweg® R3 Corvosan e quando si usano?

Secondo i canoni della medicina omeopatica le gocce Dr. Reckeweg® R3 Corvosan trovano principalmente impiego, su prescrizione del suo medico, in caso di insufficienza cardiaca di grado lieve e medio.

Quali precauzioni sono da osservare durante il trattamento?

Nel caso in cui il medico le avesse già prescritto altri medicinali, chieda al suo medico o al suo farmacista se è possibile associare ad essi le gocce Dr. Reckeweg® R3 Corvosan.

Quando non si possono usare le gocce Dr. Reckeweg® R3 Corvosan e quando la loro somministrazione richiede prudenza?

In caso di insorgenza improvvisa o persistenza di polso irregolare, cardiopalma, dolori puntori nella regione toracica e dispnea rivolgersi al medico per chiarire l'origine organica o nervosa dei disturbi.

Informi il suo medico o il suo farmacista se:

- soffre di altre malattie,
- soffre di allergie,
- assume altri medicinali o fa uso di medicinali per uso esterno (anche acquistati di propria iniziativa).

Si possono somministrare le gocce Dr. Reckeweg® R3 Corvosan durante la gravidanza o l'allattamento?

In base alle esperienze fatte finora, non sono noti rischi per il bambino se il medicamento è usato correttamente. Tuttavia non sono mai stati effettuati studi scientifici sistematici. Per precauzione dovrebbe rinunciare, nella misura del possibile, ad assumere medicinali durante la gravidanza e l'allattamento o chiedere consiglio al suo medico o al suo farmacista.

Come usare le gocce Dr. Reckeweg® R3 Corvosan?

Salvo diversa prescrizione medica, e secondo la gravità dell'insufficienza cardiaca, assumere 10-20-30 gocce, in poca acqua, 3-6 volte al dì. A miglioramento avvenuto, ridurre lentamente il dosaggio somministrando 10-15 gocce 2-3 volte al giorno per un periodo prolungato. Non modifichi di propria iniziativa la posologia prescritta. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico o al suo farmacista.

Quali effetti collaterali possono avere le gocce Dr. Reckeweg® R3 Corvosan?

Finora non sono stati osservati effetti collaterali in seguito all'uso corretto delle gocce Dr. Reckeweg® R3 Corvosan. Se ciononostante osserva effetti collaterali dovrebbe informare il suo medico o il suo farmacista. Nel corso dell'assunzione di medicinali omeopatici si può verificare un aggravamento temporaneo dei sintomi (aggravamento iniziale). In caso di aggravamento persistente interrompa il trattamento con le gocce Dr. Reckeweg® R3 Corvosan e informi il medico o il farmacista.

Di che altro occorre tener conto?

Il medicinale può essere utilizzato solamente fino alla data indicata con «EXP» sul contenitore. Conservare a temperatura ambiente (15-25° C). Conservare fuori della portata dei bambini. Altre informazioni possono essere fornite dal suo medico o farmacista. Le gocce contengono alcool 39 % Vol.

Cosa contengono le gocce Dr. Reckeweg® R3 Corvosan?



10 ml contengono: Acidum arsenicosum (Arsenicum album) D5 0,5 ml, Crataegus TM 2 ml, Digitalis purpurea D3 1 ml, Kalium carbonicum D3 0,5 ml, Kalmia latifolia D3 1 ml, Phosphorus D5 1 ml, Selenicereus grandiflorus (Cactus) D2 1 ml, Spigelia anthelmia D3 1 ml, Strophanthus D3 1 ml, Urginea maritima var. rubra (Scilla) D2 1 ml. Contiene alcool 39 % Vol.

Numero dell'omologazione

45035

Dove sono ottenibili le gocce Dr. Reckeweg® R3 Corvosan? Quali confezioni sono disponibili?

In vendita in farmacia su ricetta medica. Flaconi di gocce da 50 ml.

Titolare dell'omologazione

Laboratoire Jacques Reboh et fils SA

Route de la Glâne 4

CH-1680 Romont

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel 07/2004 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

