

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo prima di far uso del medicamento. Questo medicamento le è stato prescritto personalmente e quindi non deve essere consegnato ad altre persone, anche se i sintomi sono gli stessi. Questo medicamento potrebbe nuocere alla loro salute. Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

Pefrakehl® D6, soluzione per iniezione

Medicamento omeopatico

Quando si usa Pefrakehl® D6, soluzione per iniezione?

Secondo la concezione che sta alla base dei medicinali omeopatici, Pefrakehl® D6, soluzione per iniezione può essere usato su prescrizione del suo medico in caso di micosi della pelle e delle mucose.

Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?

Se il suo medico le ha prescritto altri medicinali, chieda al suo medico o al suo farmacista se simultaneamente può usare Pefrakehl® D6, soluzione per iniezione.

Quando non si può usare Pefrakehl® D6, soluzione per iniezione e quando il suo uso richiede prudenza?

Non deve essere utilizzato nei bambini e negli adolescenti sotto i 18 anni. Non sono necessarie precauzioni particolari, a condizione che il preparato sia usato correttamente. Informi il suo medico o il suo farmacista se

-soffre di altre malattie,

-soffre di allergie o

-se assume o applica esternamente (in caso di medicinali per uso esterno) altri medicinali (anche se acquistati di propria iniziativa).

Si può usare Pefrakehl® D6, soluzione per iniezione durante la gravidanza o l'allattamento?

In base alle esperienze fatte finora, non sono noti rischi per il bambino se il medicamento è usato correttamente. Tuttavia non sono ancora stati eseguiti studi scientifici sistematici. Per precauzione dovrebbe rinunciare nella misura del possibile ad usare medicinali durante la gravidanza e il periodo d'allattamento o chiedere consiglio al suo medico o al suo farmacista.

Come usare Pefrakehl® D6 soluzione per iniezione?

Posologia negli adulti:

Iniettare 2 volte alla settimana 1 fiala da 1 ml per via intramuscolare, intramuscolare, sottocutanea o intracutanea. L'uso e la sicurezza dell Pefrakehl® D6, soluzione per iniezione nei bambini e negli adolescenti sotto i 18 anni finora non sono stati esaminati.

Quali effetti collaterali può avere Pefrakehl® D6, soluzione per iniezione?

Finora non sono stati osservati effetti collaterali in seguito all'uso corretto di Pefrakehl® D6, soluzione per iniezione. Se osserva effetti collaterali, dovrebbe informare il suo medico o il suo farmacista. Con l'uso di



medicamenti omeopatici, i disturbi possono momentaneamente aggravarsi (aggravamento iniziale). Se l'aggravamento dovesse persistere, interrompa il trattamento con Pefrakehl® D6, soluzione per iniezione e informi il suo medico o il suo farmacista.

Di che altro occorre tener conto?

Il medicamento non deve essere utilizzato oltre la data indicata con "verwendbar bis" sulla confezione. Conservare il medicamento fuori dalla portata dei bambini. Conservare a temperatura ambiente (15-25 °C). Il medico, il farmacista possono darle ulteriori informazioni.

Cosa contiene Pefrakehl® D6, soluzione per iniezione?

1 fiala di 1 ml contiene:

1 ml Candida parapsilosis D6 aquos. dilutio (HAB; 5b, 11).

Questo preparato contiene inoltre cloruro di sodio come sostanza ausiliaria.

Numero dell'omologazione

50299 (Swissmedic)

Dove è ottenibile Pefrakehl® D6, soluzione per iniezione? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia dietro presentazione della prescrizione medica.

Confezioni da 10 x 1 ml o 50 x 1 ml.

Titolare dell'omologazione

ebi-pharm ag, Lindachstr. 8c, 3038 Kirchlindach

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel novembre 2004 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

