

Information für Patientinnen und Patienten

Lesen Sie diese Packungsbeilage sorgfältig, denn sie enthält wichtige Informationen. Dieses Arzneimittel haben Sie entweder persönlich von Ihrem Arzt oder Ihrer Ärztin verschrieben erhalten oder Sie haben es ohne ärztliche Verschreibung in der Apotheke oder Drogerie bezogen. Wenden Sie das Arzneimittel gemäss Packungsbeilage beziehungsweise nach Anweisung des Arztes, Apothekers (oder Drogisten*) bzw. der Ärztin, der Apothekerin (oder der Drogistin*) an, um den grössten Nutzen zu haben. Bewahren Sie die Packungsbeilage auf, Sie wollen sie vielleicht später nochmals lesen.

DIMETINDENE LEMAN, Tropfen zum Einnehmen, Lösung

Was ist DIMETINDENE LEMAN und wann wird es angewendet?

DIMETINDENE LEMAN Tropfen zum Einnehmen, Lösung hemmt die Wirkung von Histamin, eine der Substanzen, die bei allergischen Reaktionen freigesetzt werden. DIMETINDENE LEMAN Tropfen zum Einnehmen, Lösung lindert den Juckreiz und die Hautreizungen, die durch allergische Reaktionen hervorgerufen werden, vermindert Ödeme (krankhafte Flüssigkeitsansammlung in der Haut oder der Schleimhaut) und lindert die Symptome allergischen Schnupfens, wie Nasenlaufen, Tränenfluss und Niesreiz.

DIMETINDENE LEMAN Tropfen zum Einnehmen, Lösung wird in folgenden Fällen angewendet:

- bei allergischen Hautleiden: Juckreiz verschiedenen Ursprungs (ausser Juckreiz bei Gelbsucht), Ekzemen und anderen juckenden Hauterkrankungen, Nesselfieber, Juckreiz bei Erkrankungen mit Hautausschlägen, wie Windpocken; bei Insektenstichen;
- bei allergischen Erkrankungen der oberen Atemwege: Heuschnupfen und anderen Formen allergischen Schnupfens;
- für die Behandlung von durch Nahrungs- oder Arzneimittelallergien hervorgerufenen Symptomen.

Wann darf DIMETINDENE LEMAN nicht angewendet werden?

Sie dürfen DIMETINDENE LEMAN Tropfen zum Einnehmen, Lösung nicht anwenden, wenn Sie auf den Wirkstoff Dimetindenmaleat oder einen der Hilfsstoffe allergisch (überempfindlich) sind.

Bei Neugeborenen unter 1 Monat, insbesondere bei Frühgeborenen, darf DIMETINDENE LEMAN Tropfen zum Einnehmen, Lösung nicht angewendet werden.

Sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker bzw. mit Ihrer Ärztin oder Apothekerin falls oben erwähntes zutrifft, denn dann ist DIMETINDENE LEMAN Tropfen zum Einnehmen, Lösung für Sie nicht geeignet.

Wann ist bei der Anwendung von DIMETINDENE LEMAN Vorsicht geboten?

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker bzw. Ihre Ärztin oder Apothekerin bevor Sie DIMETINDENE LEMAN Tropfen zum Einnehmen, Lösung, Tropfen einnehmen, wenn Sie

- an einem Glaukom (grüner Star),
- an Harnverhalten (zum Beispiel aufgrund einer Vergrösserung der Prostata),
- an Epilepsie,
- an einer chronischen obstruktiven Lungenerkrankung oder an anderen Krankheiten leiden.

Ältere Patienten sollten vor der Einnahme dieses Arzneimittels Ihren Arzt / Ihre Ärztin konsultieren, da Nebenwirkungen wie Erregungszustände und Müdigkeit auftreten können.

Wenn Sie eines der nachfolgenden Arzneimittel einnehmen, sollte die Einnahme von DIMETINDENE LEMAN Tropfen zum Einnehmen, Lösung nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt oder Ihrer Ärztin erfolgen:



- Arzneimittel gegen Depressionen (MAO-Hemmer oder trizyklische Antidepressiva),
- Anticholinergika, wie Bronchodilatoren (Arzneimittel, die zur Behandlung von Asthma oder Bronchospasmen eingesetzt werden), gastrointestinale Spasmolytika (Arzneimittel gegen Magen-Darmkrämpfe), Mydriatika (Arzneimittel zur Erweiterung der Pupille), urologische Spasmolytika (Arzneimittel zur Behandlung der Symptome einer Harninkontinenz oder einer überaktiven Blase),
- Arzneimittel, welche das zentrale Nervensystem dämpfen (wie Beruhigungs- oder Schlafmittel),
- Arzneimittel gegen Epilepsie,
- Opiat-Schmerzmittel (starke Schmerzmittel),
- Antihistaminika (Arzneimittel, welche bei Husten, Erkältung oder Allergien eingesetzt werden),
- Antiemetika (Arzneimittel gegen Erbrechen),
- Procarbazin (Arzneimittel zur Behandlung von bestimmten Krebsarten),
- Scopolamin (Arzneimittel zur Vorbeugung von Reisekrankheiten),
- bei gleichzeitiger Einnahme von Alkohol.

Dieses Arzneimittel kann die Reaktionsfähigkeit, die Fahrtüchtigkeit und die Fähigkeit, Werkzeuge oder Maschinen zu bedienen, beeinträchtigen! Wie andere Antihistaminika, kann DIMETINDENE LEMAN Tropfen zum Einnehmen, Lösung die Wirkung von Alkohol verstärken.

Bei Kleinkindern ab 1 Monat bis 1 Jahr darf DIMETINDENE LEMAN Tropfen zum Einnehmen, Lösung nur auf ärztliche Empfehlung angewendet werden. Die empfohlene Dosierung darf nicht überschritten werden. Die dämpfende Wirkung kann während des Schlafes von Atempausen begleitet sein. Besonders bei Kindern und älteren Patienten können Antihistaminika Erregungszustände auslösen.

Dieses Arzneimittel enthält Propylenglycol 100 mg/ml (bzw. pro 20 Tropfen).

Dieses Arzneimittel enthält Benzoesäure 1 mg/ml (bzw. pro 20 Tropfen).

Dieses Arzneimittel enthält weniger als 1 mmol (=23 mg) Natrium pro 1 ml (bzw. pro 20 Tropfen), d.h. es ist nahezu «natriumfrei».

Informieren Sie Ihren Arzt, Apotheker oder Drogisten bzw. Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin, wenn Sie

- an anderen Krankheiten leiden,
- Allergien haben oder
- andere Arzneimittel (auch selbst gekaufte!) anwenden!

Darf DIMETINDENE LEMAN während einer Schwangerschaft oder in der Stillzeit angewendet werden?

Wenn Sie schwanger sind, sollten Sie DIMETINDENE LEMAN Tropfen zum Einnehmen, Lösung nicht einnehmen, es sei denn, Ihr Arzt oder Ihre Ärztin habe es Ihnen verordnet. Die Einnahme von DIMETINDENE LEMAN Tropfen zum Einnehmen, Lösung während dem Stillen wird nicht empfohlen. Wenn Sie schwanger sind oder stillen, wenn Sie glauben schwanger zu sein oder eine Schwangerschaft planen, fragen Sie Ihren Arzt/Ihre Ärztin bevor Sie dieses Arzneimittel einnehmen.

Wie verwenden Sie DIMETINDENE LEMAN, Tropfen zum Einnehmen, Lösung?

Erwachsene und Jugendliche über 12 Jahren

Empfohlene Tagesdosis:

Tropfen 1 mg/ml: 20-40 Tropfen, 3× täglich.

Anwendungshinweise

Um das Produkt zu verabreichen, halten Sie die Flasche mit dem Tropfenzähler senkrecht nach unten. Falls sich die Tropfen nur schwer entnehmen lassen, klopfen Sie mehrmals mit dem Finger auf den



Flaschenboden.

Die Tropfen werden unverdünnt eingenommen, zum Beispiel mit einem Teelöffel.

Kinder

Bei Kleinkindern ab 1 Monat bis 1 Jahr dürfen DIMETINDENE LEMAN Tropfen zum Einnehmen, Lösung, nur gemäss ärztlicher Empfehlung angewendet werden.

Die empfohlene Tagesdosis beträgt:

2 Tropfen pro kg Körpergewicht pro Tag, aufgeteilt auf 3 Einnahmen.

Alter/Gewicht	Dosis in Tropfen
1 Monat – 1 Jahr/4,5–15 kg	3-10 Tropfen, 3× täglich
1-3 Jahre/15–22,5 kg	10-15 Tropfen, 3× täglich
3-12 Jahre/22,5–30 kg	15-20 Tropfen, 3× täglich

Die optimale Dosis wird von Ihrem Arzt oder Ihrer Ärztin bestimmt.

Die DIMETINDENE LEMAN Tropfen zum Einnehmen, Lösung sind hitzeempfindlich. Geben Sie die Tropfen deshalb im letzten Moment der lauwarmen Schoppenflasche bei. Wenn das Kind bereits mit dem Löffel essen kann, geben Sie ihm die angenehm schmeckenden Tropfen unverdünnt mit einem Teelöffel.

DIMETINDENE LEMAN Tropfen zum Einnehmen, Lösung, sollten ohne ärztliche Anweisung nicht länger als 14 Tage eingenommen werden.

*Falls Sie zuviel DIMETINDENE LEMAN Tropfen zum Einnehmen, Lösung **eingenommen haben**:* Sprechen Sie unverzüglich mit Ihrem Arzt oder Apotheker bzw. mit Ihrer Ärztin oder Apothekerin.

Wenn Sie eine Dosis vergessen haben: Nehmen Sie DIMETINDENE LEMAN Tropfen zum Einnehmen, Lösung ein, sobald Sie das Versäumnis bemerkt haben, ausser es liegen weniger als 2 Stunden vor bis zur geplanten Einnahme. In diesem Fall sollten Sie die vergessene Dosis nicht einnehmen, sondern die nächste Dosis zum üblichen Zeitpunkt gemäss dem Dosierungsschema einnehmen. Nehmen Sie nicht die doppelte Dosis ein, um die vergessene Dosis nachzuholen.

Halten Sie sich an die in der Packungsbeilage angegebene oder vom Arzt oder der Ärztin verschriebene Dosierung. Wenn Sie glauben, das Arzneimittel wirke zu schwach oder zu stark, so sprechen Sie mit Ihrem Arzt, Apotheker oder Drogisten bzw. mit Ihrer Ärztin, Apothekerin oder Drogistin.

Welche Nebenwirkungen kann DIMETINDENE LEMAN haben?

Wie alle Arzneimittel kann DIMETINDENE LEMAN Tropfen zum Einnehmen, Lösung Nebenwirkungen hervorrufen, die aber nicht bei jedem Patienten auftreten müssen.

Stoppen Sie die Behandlung mit DIMETINDENE LEMAN Tropfen zum Einnehmen, Lösung und informieren Sie sofort Ihren Arzt oder Ihre Ärztin, wenn bei Ihnen eines oder mehrere der folgenden Symptome auftreten, die Zeichen einer allergischen Reaktion sein können:

- Schwierigkeiten beim Atmen oder Schlucken,
- Schwellung im Gesicht, der Lippen, der Zunge oder des Rachens,
-



starker Juckreiz der Haut mit rotem Ausschlag oder Blasen, Muskelspasmen.

Diese Nebenwirkungen treten sehr selten auf (betrifft weniger als 1 von 10'000 Behandelten).

Andere Nebenwirkungen sind meistens leicht und vorübergehender Natur. Sie treten vor allem zu Behandlungsbeginn auf.

Sehr häufig (betrifft mehr als 1 von 10 Behandelten)

Müdigkeit

Häufig (betrifft 1 bis 10 von 100 Behandelten)

Schläfrigkeit, Nervosität

Selten (betrifft 1 bis 10 von 10'000 Behandelten)

Erregungszustände, Kopfschmerzen, Schwindel, gastrointestinale Störungen wie Erbrechen, Trockenheit des Mundes oder des Rachens.

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt, Apotheker oder Drogisten bzw. Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin. Dies gilt insbesondere auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind.

Was ist ferner zu beachten?

Haltbarkeit

Das Arzneimittel darf nur bis zu dem auf dem Behälter mit «EXP» bezeichneten Datum verwendet werden.

Lagerungshinweis

Bei 15 bis 25 °C lagern. Den Behälter in der Originalverpackung aufbewahren, um ihn vor Licht zu schützen.

Nach dem Öffnen innerhalb von 3 Monaten aufbrauchen.

Für Kinder un erreichbar aufbewahren.

Weitere Hinweise

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen Ihr Arzt, Apotheker oder Drogist bzw. Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin. Diese Personen verfügen über die ausführliche Fachinformation.

Was ist in DIMETINDENE LEMAN enthalten?

1 ml DIMETINDENE LEMAN Tropfen zum Einnehmen, Lösung enthält

Wirkstoffe

1 mg Dimetindenmaleat.

Hilfsstoffe

Benzoessäure (E 210), Propylenglycol (E 1520), Natriummonohydrogenphosphat-Dodecahydrat (E 339), Citronensäure-Monohydrat (E 330), Natriumedetat, Saccharin-Natrium (E 954), gereinigtes Wasser.

Zulassungsnummer

69452 (Swissmedic).

Wo erhalten Sie DIMETINDENE LEMAN? Welche Packungen sind erhältlich?

In Apotheken und Drogerien, ohne ärztliche Verschreibung.

DIMETINDENE LEMAN, Tropfen zum Einnehmen, Lösung 20 ml, Packung mit 1 Flasche (D)

DIMETINDENE LEMAN, Tropfen zum Einnehmen, Lösung 50 ml, Packung mit 1 Flasche (D)

DIMETINDENE LEMAN, Tropfen zum Einnehmen, Lösung 20 ml, Packung mit 3 Flaschen (D)



Zulassungsinhaberin

Leman SKL SA, Lancy.

Diese Packungsbeilage wurde im Juni 2021 letztmals durch die Arzneimittelbehörde (Swissmedic) geprüft.

