

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo prima di assumere il medicamento.

Questo medicamento le è stato prescritto personalmente e quindi non deve essere consegnato ad altre persone, anche se i sintomi sono gli stessi. Il medicamento potrebbe nuocere alla loro salute.

Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

Pregabalin Viatris, capsule rigide

Viatris Pharma GmbH

Che cos'è Pregabalin Viatris e quando si usa?

Su prescrizione medica.

Pregabalin Viatris appartiene una classe di medicinali chiamati alfa-2-delta ligandi. Questi medicinali vengono impiegati per il trattamento dell'epilessia e del dolore neuropatico negli adulti. Inoltre, Pregabalin Viatris viene utilizzato negli adulti per il trattamento dei disturbi d'ansia generalizzata.

Dolore neuropatico periferico e centrale

Pregabalin Viatris è utilizzato negli adulti per il trattamento di dolori persistenti causati da lesioni dei nervi. Il dolore è descrivibile come scottante, bruciante, pulsante, a fitte o lancinante. Possono insorgere anche intorpidimento, prurito o formicolio. Il dolore neuropatico può essere accompagnato da cambiamenti dello stato d'animo, disturbi del sonno e stanchezza.

Epilessia

Pregabalin Viatris è utilizzato negli adulti per il trattamento di una forma specifica di epilessia (crisi parziali con o senza generalizzazione secondaria). Il suo medico le prescriverà Pregabalin Viatris se il suo attuale trattamento non è sufficiente per tenere la malattia completamente sotto controllo. Pregabalin Viatris va assunto in aggiunta alla sua attuale terapia medicamentosa.

Disturbi d'ansia generalizzata

Pregabalin Viatris è utilizzato negli adulti per la terapia dei disturbi d'ansia generalizzata. I sintomi dei disturbi d'ansia generalizzata sono stati d'ansia e di preoccupazione prolungati e difficili da trattare. I disturbi d'ansia generalizzata possono provocare anche irrequietezza, stati di tensione, lieve spossatezza, disturbi della concentrazione e vuoti di memoria, irritabilità, tensione muscolare o disturbi del sonno.

L'uso di Pregabalin Viatris nei bambini e negli adolescenti sotto i 18 anni finora non è stato esaminato e pertanto non può essere raccomandato.

Quando non si può assumere Pregabalin Viatris?

Non deve assumere Pregabalin Viatris se lei è allergico al principio attivo pregabalin, a un altro medicamento della stessa classe (ad es. Neurontin) o a una delle sostanze ausiliarie.

Quando è richiesta prudenza nella somministrazione di Pregabalin Viatris?

Pregabalin Viatris può provocare stordimento, sonnolenza o stanchezza. Sono state anche descritte perdita di coscienza, confusione e alterazione dello stato mentale. Di conseguenza, questo medicamento può ridurre la capacità di reazione, la capacità di condurre un veicolo e la capacità di utilizzare attrezzi o macchine. Inoltre, può accrescere la possibilità di infortuni (rischio di cadute). Occorre pertanto prestare attenzione finché non si sarà abituato a tutti gli effetti che il medicamento potrebbe avere.

Informi il medico prima di assumere questo medicamento se soffre o ha sofferto di una patologia cardiaca (insufficienza cardiaca).

Alcuni pazienti che hanno assunto Pregabalin Viatris hanno riportato disturbi che potrebbero far supporre una reazione allergica. Questi disturbi comprendevano, ad es., gonfiore del volto, delle labbra, della lingua o delle vie respiratorie o anche un vasto arrossamento cutaneo. Nel caso in cui compaiano questi disturbi, dovrà consultare immediatamente il suo medico.



Gravi eruzioni cutanee, tra cui la sindrome di Stevens-Johnson e la necrolisi tossica epidermica, sono state riportate in associazione al trattamento con pregabalin. Interrompa immediatamente l'uso di pregabalin e si rivolga subito a un medico se manifesta uno qualsiasi dei seguenti sintomi: eruzione cutanea, eruzione vescicolare, esfoliazione della cute e dolore (cfr. «Quali effetti collaterali può avere Pregabalin Viatris?»).

Durante l'assunzione di Pregabalin Viatris possono manifestarsi visione annebbiata o altri disturbi visivi. Informi immediatamente il medico qualora dovesse notare qualsiasi alterazione della sua capacità visiva.

Un piccolo numero di pazienti trattati con antiepilettici come Pregabalin Viatris hanno avuto pensieri autolesionistici o suicidari. Se in un momento qualsiasi dovesse avere pensieri di questo tipo, si metta immediatamente in contatto con il suo medico.

In caso di funzionalità renale limitata, il suo medico regolerà di conseguenza la dose di Pregabalin Viatris. In caso di funzionalità renale fortemente limitata, lei non deve assumere Pregabalin Viatris.

In alcuni pazienti è stata riportata insufficienza renale in seguito all'assunzione di Pregabalin Viatris. Se durante l'assunzione di Pregabalin Viatris nota una riduzione della quantità di urina, deve contattare il suo medico perché ciò potrebbe essere corretto sospendendo il medicamento.

Pregabalin Viatris deve essere assunto con cautela nei pazienti con disturbi della funzionalità epatica.

In alcuni pazienti è stata riportata una riduzione delle funzionalità cerebrali.

Alcune persone possono diventare dipendenti da Pregabalin Viatris (ossia non riescono a fare a meno di assumere il medicamento). Potrebbe manifestare sintomi di astinenza (cfr. più avanti) quando smette di assumere Pregabalin Viatris.

Se la preoccupa la possibilità di sviluppare una dipendenza da Pregabalin Viatris, è importante che ne parli con il suo medico.

Se durante l'assunzione di Pregabalin Viatris nota uno qualsiasi dei seguenti segni, potrebbe aver sviluppato una dipendenza.

- Sente il bisogno di assumere il medicamento più a lungo di quanto raccomandato dal suo medico.
- Sente il bisogno di dover assumere una dose maggiore di quella raccomandata.
- Assume il medicamento per motivi diversi da quelli per cui è stato prescritto.
- Ha cercato ripetutamente, senza riuscirci, di smettere o controllare l'assunzione del medicamento.
- Quando smette di assumere il medicamento, non si sente bene e si sente meglio non appena ricomincia a prenderlo.

Se nota uno qualsiasi di questi segni, si rivolga al medico per discutere del percorso terapeutico migliore per lei, incluso quando deve interrompere l'assunzione e come farlo in modo sicuro.

Dopo la sospensione di una terapia a breve o a lungo termine con Pregabalin Viatris, in alcuni pazienti sono stati osservati sintomi da astinenza (quali ad es. disturbi del sonno, mal di testa, nausea, diarrea, sintomi influenzali, nervosismo, depressione, sensazione di ansia, dolore, convulsioni, sudorazione e vertigini), che possono anche essere interpretati come dipendenza fisica.

Se è o è stato affetto da dipendenza da alcool o stupefacenti, è opportuno che lei consulti il suo medico prima di assumere questo medicamento, in quanto si potrebbe essere maggiormente esposti al rischio di un uso dannoso di Pregabalin Viatris.

Informi il suo medico se ritiene di avere bisogno di una quantità di medicamento maggiore di quanto le è stato prescritto.

In alcuni pazienti diabetici che aumentano di peso durante il trattamento con pregabalin può essere necessario un adeguamento dei medicinali antidiabetici.

In pazienti con lesioni del midollo spinale si possono verificare con maggiore frequenza effetti collaterali come ad esempio la sonnolenza, visto che tali pazienti probabilmente assumono altri medicinali per il trattamento del dolore o dei crampi (spasticità) che hanno effetti collaterali simili a quelli di Pregabalin Viatris. Ciò può aumentare la gravità di tali effetti collaterali.



Sono state riportate difficoltà respiratorie. Se soffre di malattie del sistema nervoso, malattie respiratorie o compromissione renale o se ha più di 65 anni, il medico potrebbe prescrivere una posologia diversa. Si rivolga al medico se ha problemi a respirare o respirazione superficiale.

Pregabalin Viatris e alcuni altri medicinali possono influenzarsi a vicenda. In particolare, l'ossicodone (un antidolorifico) e il lorazepam (per il trattamento degli stati d'ansia) possono peggiorare l'entità dello stordimento e della sonnolenza e ridurre ulteriormente la capacità di concentrazione. Con l'assunzione concomitante di altri tranquillanti sono stati riportati difficoltà respiratorie, coma e casi di morte. L'effetto costipante di altri medicinali, ad es. degli oppioidi (antidolorifici), può essere accentuato dall'uso concomitante con Pregabalin Viatris.

Pregabalin Viatris può essere assunto insieme alla pillola anticoncezionale.

L'uso di Pregabalin Viatris durante il primo trimestre di gravidanza può causare gravi difetti alla nascita nel nascituro e influire negativamente sull'esito alla nascita e sullo sviluppo postnatale del bambino (cfr. «Si può assumere Pregabalin Viatris durante la gravidanza o l'allattamento?»).

L'assunzione di Pregabalin Viatris può potenziare l'effetto dell'alcool.

Pregabalin Viatris contiene lattosio. Se il medico le ha diagnosticato una intolleranza ad alcuni zuccheri, lo contatti prima di prendere questo medicamento.

Questo medicamento contiene meno di 1 mmol di sodio (23 mg) per capsula rigida, cioè è essenzialmente «senza sodio».

Informi il suo medico o il suo farmacista nel caso in cui

- soffre di altre malattie,
- soffre di allergie o
- assume altri medicinali (anche se acquistati di sua iniziativa!) o li applica esternamente.

Si può assumere Pregabalin Viatris durante la gravidanza o l'allattamento?

Pregabalin Viatris non deve essere utilizzato durante la gravidanza, salvo diversa prescrizione del medico. Le donne in età fertile devono adottare un metodo contraccettivo efficace.

Se il pregabalin viene assunto durante la gravidanza, nei neonati possono manifestarsi sintomi da astinenza. Questo rischio può essere aumentato se il pregabalin viene assunto insieme ad analgesici oppioidi (medicamenti utilizzati per il trattamento del dolore intenso).

Informi immediatamente il medico se inizia una gravidanza durante il trattamento con Pregabalin Viatris.

Il principio attivo di Pregabalin Viatris, il pregabalin, passa nel latte materno. È quindi necessario interrompere l'allattamento o il trattamento con Pregabalin Viatris. Il suo medico le illustrerà la soluzione più adatta al suo caso tenendo in considerazione i benefici della terapia.

Come usare Pregabalin Viatris?

Prenda Pregabalin Viatris seguendo sempre esattamente le indicazioni del medico, che stabilirà la posologia adeguata al suo caso. La dose adatta a lei e alla sua malattia in genere è compresa tra 150 mg e 600 mg al giorno.

Pregabalin Viatris deve essere assunto due o tre volte al giorno. Ad esempio, per una dose giornaliera da 150 mg assuma una capsula rigida da 75 mg la mattina e una la sera, oppure una capsula rigida da 50 mg la mattina, una a mezzogiorno e una la sera. Il medico potrà aumentare gradualmente la dose, a seconda della sua reazione al medicamento.

Deglutisca le capsule rigide senza masticarle con una quantità sufficiente di acqua. Le capsule rigide di Pregabalin Viatris possono essere assunte sia durante che tra i pasti.

Assuma Pregabalin Viatris regolarmente finché il medico non deciderà di cessare la terapia.

Non interrompa l'assunzione di Pregabalin Viatris all'improvviso. Se desidera interrompere il trattamento con Pregabalin Viatris, ne parli prima con il medico. Il medico le spiegherà come procedere. Di norma, la dose viene ridotta gradualmente in modo da ridurre al minimo eventuali sintomi da astinenza. L'interruzione



del trattamento può richiedere diverse settimane o addirittura mesi.

Quando la dose viene ridotta o il trattamento con pregabalin viene interrotto, possono manifestarsi alcuni effetti indesiderati come sintomi da astinenza.

Questi comprendono disturbi del sonno, mal di testa, nausea, diarrea, sintomi influenzali, nervosismo, depressione, ansia, dolore, sudorazione e stordimento.

Questi disturbi possono manifestarsi più frequentemente o in forma più intensa se ha assunto Pregabalin Viatris per un periodo prolungato e possono comparire anche dopo una riduzione della dose. Se nota sintomi da astinenza, deve contattare il medico.

L'uso e la sicurezza di Pregabalin Viatris nei bambini e negli adolescenti sotto i 18 anni finora non sono stati esaminati. Pertanto, l'uso in questa fascia di età non può essere raccomandato.

Non modifichi di propria iniziativa la posologia prescritta. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico o al suo farmacista.

Se ha assunto una dose eccessiva di Pregabalin Viatris

Informi immediatamente il medico o si rechi al pronto soccorso più vicino. Porti con sé la confezione con le capsule rigide di Pregabalin Viatris.

Se ha dimenticato di assumere Pregabalin Viatris

È importante assumere Pregabalin Viatris regolarmente, ogni giorno circa alla stessa ora. Se una volta si dimentica di assumerlo, assuma la dose appena se ne accorge, a meno che non sia già ora della dose successiva. In questo caso assuma solo la dose successiva, come d'abitudine. Non assuma due dosi contemporaneamente per compensare una dimenticanza.

Quali effetti collaterali può avere Pregabalin Viatris?

In seguito all'assunzione di Pregabalin Viatris possono manifestarsi i seguenti effetti collaterali.

Molto comune (riguarda più di 1 persona su 10)

Stordimento, sonnolenza.

Comune (riguarda da 1 a 10 persone su 100)

Infezioni delle vie respiratorie superiori, appetito aumentato, aumento di peso, euforia, confusione, irritabilità, depressione, disorientamento, insonnia, libido diminuita, disturbi del movimento, amnesia, disturbi dell'attenzione, della coordinazione, dell'equilibrio, della memoria e del linguaggio, tremori, alterazioni sensoriali quali formicolio, bruciore o intorpidimento (parestesie), ridotta sensibilità agli stimoli tattili, apatia, visione annebbiata, visione doppia, vertigini, vomito, stipsi, flatulenza, bocca secca, crampi muscolari, dolore ai muscoli, alle articolazioni, agli arti e alla schiena, spasmi nella regione del collo, ritenzione di liquidi nei tessuti (edema), andatura anormale, cadute, sensazione di ebbrezza, disturbi sensoriali, spossatezza.

Non comune (riguarda da 1 a 10 persone su 1000)

Riduzione del numero di globuli bianchi, riduzione del numero di piastrine, aumento dei valori epatici (alanina aminotransferasi, aspartato aminotransferasi), mancanza d'appetito, glicemia troppo alta o troppo bassa, perdita di peso, allucinazioni, irrequietezza, sconcerto, sbalzi d'umore, cambiamenti della personalità, sogni anormali, problemi a trovare le parole, libido aumentata, incapacità di raggiungere l'orgasmo, svenimenti improvvisi, spasmi muscolari, iperattività, disturbi del movimento in una regione del corpo o in una parte del corpo, vertigini quando si cambia posizione, tremori da movimento, movimenti oculari insoliti, disturbi del pensiero, disturbi del linguaggio, riflessi diminuiti, aumentata sensibilità agli stimoli tattili, sensazione di bruciore, visione a tunnel, disturbi visivi, occhi gonfi, secchi, doloranti o lacrimanti, riduzione del campo visivo, ridotta acuità visiva, occhio pigro, disturbi della percezione visiva, irritazione oculare, frequenza del polso aumentata o diminuita, disturbi del ritmo cardiaco, pressione arteriosa elevata o diminuita, arrossamento del viso o della cute, vampate di calore, mani e piedi freddi, problemi respiratori, sangue dal naso, tosse, naso chiuso o che cola, russamento, reflusso acido, salivazione aumentata, ridotta sensibilità al tocco e al dolore nella zona della bocca, eruzione cutanea,



orticaria, sudorazione, gonfiore delle articolazioni, dolore muscolare, spasmi muscolari, dolore al collo, rigidità della muscolatura, perdita involontaria d'urina (incontinenza), dolore e difficoltà nella minzione, disturbi dell'erezione, disfunzioni sessuali, eiaculazione ritardata, mestruazioni dolorose, sensazione di costrizione al torace, dolore, febbre, sete, brividi, sensazione di debolezza.

Raro (riguarda da 1 a 10 persone su 10'000)

Attacchi di panico, disinibizione, apatia, pietrificazione (totale perdita di attività durante lo stato cosciente), allucinazioni olfattive, perdita del gusto, riduzione della capacità di movimento, disturbi della scrittura, oscillopsia (un disturbo visivo caratterizzato dalla percezione di movimento degli oggetti circostanti), alterazione della visione binoculare, disfunzione pupillare, strabismo, sensibilità alla luce, aumentata sensibilità al rumore, costrizione alla gola, naso secco, ascite, pancreatite, disturbi della deglutizione, sudorazione fredda, insufficienza muscolare, insufficienza renale, diuresi ridotta, dolore al seno, mancata mestruazione, secrezione mammaria, aumento del volume mammario.

Frequenza non nota (non può essere definita sulla base dei dati disponibili)

Ittero (colorazione giallastra della pelle e della parte bianca degli occhi), insufficienza epatica, infiammazione del fegato (epatite), mal di testa, nausea, diarrea, reazioni allergiche compresi gonfiore del volto o della lingua o disturbi respiratori o anche una grave reazione cutanea caratterizzata da eruzione, eruzione vescicolare, esfoliazione della cute e dolore (sindrome di Stevens-Johnson, necrolisi tossica epidermica), edema polmonare (accumulo di liquido nei polmoni), difficoltà respiratorie, perdita di coscienza, alterazione dello stato mentale, riduzione della funzionalità cerebrale, dipendenza da medicamento e uso dannoso del medicamento, ritenzione urinaria, insufficienza cardiaca, prurito, infiammazione degli occhi, malessere, aumento del volume mammario, stipsi, pensieri suicidi, suicidio.

Nel caso in cui notasse la comparsa di gonfiore del volto o della lingua o un arrossamento della pelle che inizia a formare vescicole o a esfoliarsi, ne informi immediatamente il suo medico.

Se uno di questi effetti collaterali le crea disturbi o non si attenua nel corso del trattamento, informi il suo medico.

Se osserva effetti collaterali, si rivolga al suo medico o farmacista, soprattutto se si tratta di effetti collaterali non descritti in questo foglietto illustrativo.

Di che altro occorre tener conto?

Stabilità

Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con «EXP» sulla confezione.

Indicazione di stoccaggio

Conservare a temperatura ambiente (15-25 °C) e tenere fuori dalla portata dei bambini.

Ulteriori indicazioni

Il medico o il farmacista, che sono in possesso di un'informazione professionale dettagliata, possono darle ulteriori informazioni.

Indicazioni per lo smaltimento

Non gettare i medicinali nell'acqua di scarico o nei rifiuti domestici. Restituite i medicinali scaduti o non più necessari, in uso nelle economie domestiche, presso un punto di dispensazione (farmacie, drogherie, studi medici) o nei punti di raccolta. Queste misure aiutano a proteggere l'ambiente.

Cosa contiene Pregabalin Viatris?

Le capsule rigide da 25 mg sono bianche e sono contrassegnate dalla scritta «VTRS»/«PGN 25» in nero.

Le capsule rigide da 50 mg sono bianche e sono contrassegnate dalla scritta «VTRS»/«PGN 50» in nero. La parte inferiore della capsula rigida è contrassegnata inoltre da una banda nera.

Le capsule rigide da 75 mg sono bianche e arancioni e sono contrassegnate dalla scritta «VTRS»/«PGN 75» in nero.



Le capsule rigide da 100 mg sono arancioni e sono contrassegnate dalla scritta «VTRS»/«PGN 100» in nero.

Le capsule rigide da 150 mg sono bianche e sono contrassegnate dalla scritta «VTRS»/«PGN 150» in nero.

Le capsule rigide da 200 mg sono arancione chiaro e sono contrassegnate dalla scritta «VTRS»/«PGN 200» in nero.

Le capsule rigide da 300 mg sono bianche e arancioni e sono contrassegnate dalla scritta «VTRS»/«PGN 300» in nero.

Principi attivi

1 capsula rigida da 25 mg contiene 25 mg di pregabalin.

1 capsula rigida da 50 mg contiene 50 mg di pregabalin.

1 capsula rigida da 75 mg contiene 75 mg di pregabalin.

1 capsula rigida da 100 mg contiene 100 mg di pregabalin.

1 capsula rigida da 150 mg contiene 150 mg di pregabalin.

1 capsula rigida da 200 mg contiene 200 mg di pregabalin.

1 capsula rigida da 300 mg contiene 300 mg di pregabalin.

Sostanze ausiliarie

Capsula rigida da 25 mg: lattosio (35 mg), amido di mais, talco, gelatina, acqua, titanio diossido, sodio laurilsolfato (E487), silice colloidale anidra, gomma lacca, ossido di ferro nero, propilene glicole (E1520), potassio idrossido.

Capsula rigida da 50 mg: lattosio (70 mg), amido di mais, talco, gelatina, acqua, titanio diossido, sodio laurilsolfato (E487), silice colloidale anidra, gomma lacca, ossido di ferro nero, propilene glicole (E1520), potassio idrossido.

Capsula rigida da 75 mg: lattosio (8,25 mg), amido di mais, talco, gelatina, acqua, titanio diossido, ossido di ferro rosso, sodio laurilsolfato (E487), silice colloidale anidra, gomma lacca, ossido di ferro nero, propilene glicole (E1520), potassio idrossido.

Capsula rigida da 100 mg: lattosio (11 mg), amido di mais, talco, gelatina, acqua, titanio diossido, ossido di ferro rosso, sodio laurilsolfato (E487), silice colloidale anidra, gomma lacca, ossido di ferro nero, propilene glicole (E1520), potassio idrossido.

Capsula rigida da 150 mg: lattosio (16,50 mg), amido di mais, talco, gelatina, acqua, titanio diossido, sodio laurilsolfato (E487), silice colloidale anidra, gomma lacca, ossido di ferro nero, propilene glicole (E1520), potassio idrossido.

Capsula rigida da 200 mg: lattosio (22 mg), amido di mais, talco, gelatina, acqua, titanio diossido, ossido di ferro rosso, sodio laurilsolfato (E487), silice colloidale anidra, gomma lacca, ossido di ferro nero, propilene glicole (E1520), potassio idrossido.

Capsula rigida da 300 mg: lattosio (33 mg), amido di mais, talco, gelatina, acqua, titanio diossido, ossido di ferro rosso, sodio laurilsolfato (E487), silice colloidale anidra, gomma lacca, ossido di ferro nero, propilene glicole (E1520), potassio idrossido.

Numero dell'omologazione

65678 (Swissmedic).

Dove è ottenibile Pregabalin Viatris? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia, dietro presentazione della prescrizione medica.

Pregabalin Viatris 25 mg: 14 e 56 capsule rigide.



Pregabalin Viatris 50 mg: 14 e 84 capsule rigide.

Pregabalin Viatris 75 mg: 14 e 56 capsule rigide.

Pregabalin Viatris 100 mg: 84 capsule rigide.

Pregabalin Viatris 150 mg: 56 e 168 capsule rigide.

Pregabalin Viatris 200 mg: 84 capsule rigide.

Pregabalin Viatris 300 mg: 56 e 168 capsule rigide.

Titolare dell'omologazione

Viatris Pharma GmbH, 6312 Steinhausen.

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel luglio 2026 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

[Version 210 I]

