

Information destinée aux patients

Lisez attentivement cette notice d'emballage avant de prendre ou d'utiliser ce médicament. Ce médicament vous a été remis personnellement sur ordonnance médicale. Ne le remettez donc pas à d'autres personnes, même si elles semblent présenter les mêmes symptômes que vous. En effet, ce médicament pourrait nuire à leur santé.

Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

FERRODONA, liquide oral en gouttes

Médicament homéopathique-spagyrique

Quand FERRODONA est-il utilisé?

Selon la conception homéopathique et les principes thérapeutiques de la spagyrie, FERRODONA peut être utilisé sur prescription de votre médecin en cas d'anémie.

L'utilisation de ce médicament dans le champ d'applications indiqué est basée sur les principes de l'homéopathie et les principes thérapeutiques de la spagyrie.

De quoi faut-il tenir compte en dehors du traitement?

Si votre médecin vous a prescrit d'autres médicaments, demandez à votre médecin ou à votre pharmacien si FERRODONA peut être pris simultanément.

Quand FERRODONA ne doit-il pas être pris ou seulement avec précaution?

Ce médicament est contre-indiqué en cas d'hypersensibilité à la quinine.

Ne pas utiliser chez les enfants de moins de 2 ans.

L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les enfants de moins de 11 ans.

Ce médicament contient 75 mg d'alcool (éthanol) par prise de 20 gouttes, cela correspond à 144 mg/ml (14,4 % p/v) d'éthanol. La quantité d'alcool contenue dans la prise de 20 gouttes de ce médicament équivaut à moins de 2 ml de bière ou 1 ml de vin. La faible quantité d'alcool contenue dans ce médicament n'a pas d'effet perceptible.

Veuillez informer votre médecin ou votre pharmacien si

- vous souffrez d'une autre maladie
- vous êtes allergique
- vous prenez déjà d'autres médicaments (même en automédication!).

FERRODONA peut-il être pris pendant la grossesse ou l'allaitement?

Sur la base des expériences faites à ce jour, aucun risque pour l'enfant n'est connu si ce médicament est utilisé conformément à l'usage auquel il est destiné. Toutefois, aucune étude scientifique systématique n'a été effectuée. Par mesure de précaution, vous devriez renoncer si possible à prendre des médicaments durant la grossesse et l'allaitement, ou demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

Comment utiliser FERRODONA?

Ne changez pas le dosage prescrit de votre propre chef. Adressez-vous à votre médecin ou à votre pharmacien si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte.

Posologie pour adulte: prendre 20 gouttes 2 fois par jour dans un peu d'eau avant les repas.



Posologie pour les adolescents de 12 ans et plus: prendre 10 à 15 gouttes 2 fois par jour dans un peu d'eau avant les repas.

L'utilisation de ce médicament n'est pas recommandée chez les enfants de moins de 11 ans.

Ne convient pas aux enfants de moins de 2 ans.

Quels effets secondaires FERRODONA peut-il provoquer?

La prise de FERRODONA peut provoquer les effets secondaires suivants: rarement une réaction d'hypersensibilité à la quinine (*Cinchona succiruba*). Dans ce cas-là, il faut suspendre la prise du médicament et consulter un médecin. Si vous remarquez des effets secondaires, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien. Ceci vaut en particulier pour les effets secondaires non mentionnés dans cette notice d'emballage.

La prise de médicaments homéopathiques peut aggraver passagèrement les troubles (aggravation initiale). Si cette aggravation persiste, cessez le traitement avec FERRODONA et informez-en votre médecin ou votre pharmacien.

À quoi faut-il encore faire attention?

Stabilité

Ce médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention «à utiliser jusqu'au» sur le récipient.

Remarques concernant le stockage

Conserver à température ambiante (15-25 °C).

Conserver le médicament hors de portée des enfants.

Remarques complémentaires

Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

Que contient FERRODONA?

1 g de liquide (= 1,02 ml / 39 gouttes) contient:

Principes actifs

Acidum arsenicosum (HAB) D12 (HAB SV) 75 mg

Ceanothus americanus (HAB) D5 160 mg

Cinchona pubescens e cortice spag. Peka D4 (HAB 47b) 210 mg

Cobaltum nitricum D6 (HAB 5a) 85 mg

Cuprum sulfuricum (HAB) D6 (HAB 5a) 140 mg

Ferrum metallicum (Ph.Eur.Hom.) D12 (Ph.Eur.Hom. 4.1.1) 100 mg

Manganum aceticum (HAB) D6 (HAB SV) 155 mg

Natrium chloratum (HAB) D12 (HAB 5a) 75 mg

Excipients



éthanol, eau purifiée. Contient 20 % de vol. d'alcool.

Numéro d'autorisation

53400 (Swissmedic)

Où obtenez-vous FERRODONA? Quels sont les emballages à disposition sur le marché?

En pharmacie, sur ordonnance médicale.

Emballage de 100 ml.

Titulaire de l'autorisation

ebi-pharm ag, Lindachstr. 8c, CH-3038 Kirchlindach

Fabricant

PEKANA® Naturheilmittel GmbH, D-88353 Kisslegg

Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en juillet 2025 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).

