

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo prima di fare uso del medicamento. Questo medicamento le è stato prescritto personalmente e quindi non deve essere consegnato ad altre persone, anche se i sintomi sono gli stessi. Il medicamento potrebbe nuocere alla loro salute.

Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

FERRODONA, gocce orali

Medicamento omeopatico spagirico

Quando si usa FERRODONA?

Secondo la concezione che sta alla base dei medicinali omeopatici e il principio terapeutico della spagirica, FERRODONA può essere su prescrizione del suo medico usato in caso di anemia. L'uso di questo medicamento nel settore di applicazione citato si basa sui principi di un indirizzo terapeutico omeopatico e il principio terapeutico della spagirica.

Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?

Se il suo medico le ha prescritto altri medicinali, chieda al suo medico o al suo farmacista se simultaneamente può assumere FERRODONA.

Quando non si può assumere FERRODONA e quando la sua somministrazione richiede prudenza?

FERRODONA non può essere usato in caso di ipersensibilità al chinino.

Non usare su bambini di età inferiore a 2 anni.

L'uso di questo medicinale non è raccomandato nei bambini di età inferiore agli 11 anni.

Questo medicamento contiene 75 mg di alcol (etanolo) per dose (20 gocce), corrispondente a 144 mg/ml (14,4 % w/v). La quantità in 20 gocce di questo medicamento è equivalente a meno di 2 ml di birra o 1 ml di vino. La piccola quantità di alcol contenuta in questo medicinale non ha effetti evidenti.

Informi il suo medico o il suo farmacista, nel caso in cui

- soffre di altre malattie
- soffre di allergie o
- assume altri medicinali (anche acquistati di sua iniziativa)!

Si può assumere FERRODONA durante la gravidanza o l'allattamento?

In base alle esperienze fatte finora, non sono noti rischi per il bambino se il medicamento è usato correttamente. Tuttavia, non sono ancora state eseguite indagini scientifiche sistematiche. Per prudenza dovrebbe rinunciare nella misura del possibile ad assumere medicinali durante la gravidanza e il periodo d'allattamento o chiedere consiglio al proprio medico o farmacista.

Come usare FERRODONA?

Non modifichi di propria iniziativa la posologia prescritta. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico o al suo farmacista.

Posologia per adulti: assumere 20 gocce due volte al giorno in un po' d'acqua prima dei pasti.

Posologia per adolescenti dai 12 anni in su: assumere 10-15 gocce due volte al giorno in un po' d'acqua prima dei pasti.



Questo medicinale non è raccomandato per bambini di età inferiore agli 11 anni. Non usare su bambini di età inferiore a 2 anni.

Quali effetti collaterali può avere FERRODONA?

In seguito all'assunzione di FERRODONA possono manifestarsi i seguenti effetti collaterali: In casi rari ipersensibilità al chinino (Cichona succiruba). In questi casi si deve sospendere la cura con FERRODONA e rivolgersi al medico.

Se osserva effetti collaterali, si rivolga al suo medico o farmacista soprattutto se si tratta di effetti collaterali non descritti in questo foglietto illustrativo.

Con l'assunzione di medicinali omeopatici, i disturbi possono momentaneamente aggravarsi (aggravamento iniziale). Se l'aggravamento dovesse persistere, interrompa il trattamento con FERRODONA e informi il suo medico o il suo farmacista.

Di che altro occorre tener conto?

Stabilità

Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con «Verwendbar bis» sul contenitore.

Indicazione di stoccaggio

Conservare a temperatura ambiente (15-25 °C).

Conservare il medicamento fuori dalla portata dei bambini.

Ulteriori indicazioni

Il medico o il farmacista possono darle ulteriori informazioni.

Cosa contiene FERRODONA?

1 g di liquido (= 1,02 ml / 39 gocce) contiene:

Principi attivi

Acidum arsenicosum (HAB) D12 (HAB SV) 75 mg

Ceanothus americanus (HAB) D5 160 mg

Cinchona pubescens e cortice spag. Peka D4 (HAB 47b) 210 mg

Cobaltum nitricum D6 (HAB 5a) 85 mg

Cuprum sulfuricum (HAB) D6 (HAB 5a) 140 mg

Ferrum metallicum (Ph.Eur.Hom.) D12 (Ph.Eur.Hom. 4.1.1) 100 mg

Manganum aceticum (HAB) D6 (HAB SV) 155 mg

Natrium chloratum (HAB) D12 (HAB 5a) 75 mg

Sostanze ausiliarie

ethanol, acqua purificata. Contiene 20 % vol. di alcol.

Numero dell'omologazione

53400 (Swissmedic)



Dove è ottenibile FERRODONA? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia, dietro presentazione della prescrizione medica.

Confezioni da 100 ml.

Titolare dell'omologazione

ebi-pharm ag, Lindachstr. 8c, 3038 Kirchlindach

Fabbricante

PEKANA® Naturheilmittel GmbH, D-88353 Kisslegg

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel luglio 2025 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

