

Information destinée aux patients

Lisez attentivement cette notice d'emballage. Vous y trouverez tous les renseignements importants concernant ce médicament.

Ce médicament vous a été prescrit par votre médecin ou vous a été remis sans ordonnance médicale par votre pharmacien ou votre droguiste. Pour en tirer le meilleur bénéfice, veuillez l'utiliser conformément à la notice d'emballage ou, le cas échéant, aux indications de votre médecin ou de votre pharmacien ou de votre droguiste. Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

Inflamac® Lotion

Spirig HealthCare AG

Qu'est-ce que l'Inflamac Lotion et quand est-il utilisé?

Inflamac Lotion est une préparation réservée à l'usage externe destinée à calmer les douleurs et à inhiber les inflammations. Cette émulsion refroidissante et non grasse se laisse frictionner légèrement et pénètre dans la peau jusqu'au site de l'inflammation.

Inflamac Lotion convient

- au traitement local des douleurs, des inflammations et des œdèmes, par exemple secondaires à des entorses, des contusions et des distorsions;
- comme mesure supportive pour le traitement local de troubles rhumatismaux de l'appareil locomoteur.

Quand Inflamac Lotion ne doit-il pas être utilisé?

Inflamac Lotion ne doit pas être utilisé en cas d'hypersensibilité au principe actif, le diclofénac, ou à d'autres substances analgésiques ou anti-inflammatoires, en particulier l'acide acétylsalicylique/l'aspirine, ainsi qu'en cas d'hypersensibilité à l'un des excipients.

Vous ne devez pas utiliser Inflamac Lotio si vous vous trouvez dans les 3 derniers mois de votre grossesse.

Quelles sont les précautions à observer lors de l'utilisation d'Inflamac Lotion?

Inflamac Lotion ne doit pas être appliqué sur des plaies cutanées ouvertes (par exemple, excoriations, coupures) ou sur une peau eczémateuse.

Inflamac Lotion ne doit pas être utilisé sur de grandes surfaces durant une période prolongée, à moins que le médecin ne l'ait prescrit.

Veillez à ce qu'Inflamac Lotion n'entre pas en contact avec les yeux et les muqueuses.

Veuillez informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste si vous avez utilisé des produits semblables (pommades antirhumatismales) et si ceux-ci ont entraîné des réactions allergiques, si vous souffrez d'une autre maladie, si vous êtes allergique ou si vous prenez déjà d'autres médicaments (même en automédication!) en usage interne ou externe.

Inflamac Lotion peut-il être utilisé pendant la grossesse et l'allaitement?

Si vous êtes enceinte ou si vous allaitez, ou si vous pensez être enceinte ou envisager une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant d'utiliser Inflamac Lotio.

N'utilisez pas Inflamac Lotio si vous vous êtes dans les 3 derniers mois de votre grossesse. Vous ne devez pas utiliser Inflamac Lotio pendant les 6 premiers mois de la grossesse, à moins que cela ne soit clairement nécessaire et que votre médecin vous l'ait recommandé. Si vous l'utilisez pendant cette période, la dose doit être aussi faible que possible et la durée du traitement aussi courte que possible.

Les formes orales (par exemple les comprimés) de diclofénac peuvent avoir des effets néfastes sur votre enfant à naître. On ne sait pas si le même risque existe pour Inflamac Lotio lorsqu'il est appliqué sur la peau.



Comment utiliser Inflamac Lotion?

Adultes

En fonction de l'étendue des sites douloureux ou des surfaces douloureuses à traiter, appliquer 3 à 4 fois par jour une quantité de 2 à 4 g d'Inflamac Lotion (quantité correspondant au volume d'une noisette ou d'une noix), frictionner légèrement ou faire pénétrer en massant en cas de douleurs musculaires.

Informez votre médecin si les troubles ne s'améliorent pas au bout de 2 semaines ou s'aggravent.

Enfants

Jusqu'à présent, l'utilisation et l'innocuité d'Inflamac Lotion n'ont pas été testées systématiquement chez l'enfant.

Veillez vous conformer au dosage figurant sur la notice d'emballage ou prescrit par votre médecin. Si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte, veuillez vous adresser à votre médecin, à votre pharmacien ou à votre droguiste.

Quels effets secondaires Inflamac Lotion peut-il provoquer?

L'utilisation d'Inflamac Lotion peut provoquer les effets secondaires suivants: dans des cas rares à très rares, les effets secondaires peuvent être très sévères. Informez votre médecin immédiatement si l'un des effets secondaires suivants survient et arrêtez l'utilisation de Inflamac Lotion.

- grave éruption cutanée avec vésicules, urticaire
- respiration haletante, souffle court, asthme
- gonflement du visage, des lèvres, de la langue et de la gorge.

Les effets secondaires suivants sont généralement légers et passagers:

- Fréquents: éruption cutanée, démangeaisons, rougeurs, irritations de la peau
- Dans de très rares cas, une sensibilisation accrue de la peau au soleil peut survenir. Les symptômes d'une telle sensibilisation cutanée sont coup de soleil avec démangeaisons, gonflement de la peau et formation de vésicules.
- Fréquence inconnue: Brûlure sur le site d'application, peau sèche

Si vous remarquez des effets secondaires, veuillez en informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste. Ceci vaut en particulier pour les effets secondaires non mentionnés dans cette notice d'emballage.

A quoi faut-il encore faire attention?

Le médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention «EXP» sur le récipient.

Remarques concernant le stockage

A conserver hors de portée des enfants. Stocker à température ambiante (15-25° C).

Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste, qui disposent d'une information détaillée destinée aux professionnels.

Que contient Inflamac Lotion?

Principes actifs

10 mg de Diclofenacum natricum

Excipients

Eau purifiée, éthanol, triglycérides, polyacrylamide, isoparaffine, laureth-7, diméticone, tocopherol.

Numéro d'autorisation

55375 (Swissmedic).



Où obtenez-vous Inflamac Lotion? Quels sont les emballages à disposition sur le marché?

En pharmacie et en droguerie, sans ordonnance médicale.

Tubes de 50 g et de 100 g.

Titulaire de l'autorisation

Spirig HealthCare SA, 4622 Egerkingen

Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en décembre 2024 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).

