

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo che contiene importanti informazioni.

Questo medicamento le è stato prescritto dal suo medico o le è stato consegnato senza prescrizione medica in farmacia o in drogheria. Per ottenere il maggior beneficio, usi il medicamento conformemente al foglietto illustrativo o segua le indicazioni del suo medico o del suo farmacista o del suo droghiere. Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

Inflamac® Lozione

Spirig HealthCare AG

Che cos'è Inflamac Lozione e quando si usa?

Inflamac Lozione è un preparato analgesico e antinfiammatorio per uso esterno. Questa emulsione rinfrescante e non grassa si applica con una leggera frizione e, attraverso la pelle, arriva al sito dell'infiammazione.

Inflamac Lozione è indicata

- nel trattamento locale di dolori, infiammazioni e gonfiori, p. es. a seguito di distorsioni, contusioni e stiramenti;
- come misura di supporto per il trattamento locale di disturbi reumatici dell'apparato locomotorio.

Quando non si può usare Inflamac Lozione?

Inflamac Lozione non deve essere utilizzato in caso d'ipersensibilità nei confronti dell'ingrediente attivo Diclofenac o di altre sostanze analgesiche e antinfiammatorie, in particolare l'acido acetilsalicilico /Aspirina, e in caso d'ipersensibilità nei confronti di una delle sostanze ausiliarie.

Inflamac Lotio non deve essere utilizzato negli ultimi 3 mesi di gravidanza.

Quando è richiesta prudenza nell'uso d'Inflamac Lozione?

Inflamac Lozione non dev'essere applicato su lesioni cutanee aperte (p. es. escoriazioni, tagli) o sulla cute eczematosa.

Inflamac Lozione non dev'essere utilizzato per lunghi periodi di tempo su vaste aree cutanee, se non dietro prescrizione medica.

Inflamac Lozione non deve entrare in contatto con occhi e mucose.

Informi il medico, il farmacista o il droghiere, se ha già fatto uso di prodotti simili (pomate antireumatiche) e se questi prodotti hanno causato reazioni allergiche, se soffre di altre malattie, se soffre di allergie o se assume o applica altri medicamenti (anche se acquistati di sua iniziativa!).

Si può impiegare Inflamac Lozione durante la gravidanza o l'allattamento?

Se è in gravidanza o allatta al seno, se sospetta di essere in gravidanza o se desidera una gravidanza, chieda consiglio al suo medico o al suo farmacista prima di utilizzare questo medicamento.

Non usi Inflamac Lotio se si trova negli ultimi 3 mesi di gravidanza. Non deve utilizzare Inflamac Lotio nei primi 6 mesi di gravidanza, a meno che non sia chiaramente necessario e il suo medico glielo abbia consigliato. Se è necessario un trattamento durante questo periodo, si deve utilizzare la dose più bassa per il periodo più breve possibile. Le forme orali (ad esempio le compresse) di diclofenac possono avere effetti nocivi sul nascituro. Non è noto se lo stesso rischio esista per Inflamac Lotio quando viene utilizzato sulla pelle.

Come usare Inflamac Lozione?

Adulti

A seconda dell'estensione delle zone o superfici dolenti da trattare, applicare 3-4 volte al giorno 2-4 g di Inflamac Lozione (una quantità di prodotto grande come una nocciola o una noce, rispettivamente),



frizionando leggermente, o, in caso di dolori muscolari, con un massaggio.

Se, dopo due settimane di trattamento, i disturbi non sono migliorati, o sono addirittura peggiorati, informi il suo medico.

Bambini

Nei bambini l'impiego e la sicurezza d'Inflamac Lozione non sono stati finora studiati sistematicamente.

Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal medico. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico, al suo farmacista o al suo droghiere.

Quali effetti collaterali può avere Inflamac Lozione?

Con l'applicazione d' Inflamac Lozione possono manifestarsi i seguenti effetti collaterali: In rari o rarissimi casi l'applicazione d' Inflamac Lozione può dare luogo a gravi effetti collaterali.

Sospenda la terapia con Inflamac Lozione e informi subito il medico se si manifesta uno dei seguenti effetti collaterali:

- forte eruzione cutanea con vescicole, orticaria
- respirazione affannosa, fiato corto, asma
- gonfiore al viso, alle labbra, alla lingua e al collo.

I seguenti effetti collaterali sono, di norma, più lievi e di natura temporanea:

- Frequentemente: eruzioni cutanee, prurito, arrossamenti, irritazione cutanea
- In rarissimi casi può presentarsi una forte sensibilità alla luce solare i cui sintomi sono scottature solari con prurito, gonfiore e vescicole.
- Frequenza non nota: bruciore al sito di applicazione, pelle secca

Se osserva effetti collaterali, si rivolga al suo medico, farmacista o droghiere soprattutto se si tratta di effetti collaterali non descritti in questo foglietto illustrativo.

Di che altro occorre tener conto?

Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con «EXP» sulla confezione.

Istruzioni di conservazione

Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare a temperatura ambiente (15-25 °C).

Il medico, il farmacista o il droghiere, che sono in possesso di documentazione professionale dettagliata, possono darle ulteriori informazioni.

Che cosa contiene Inflamac Lozione?

Principi attivi

10 mg di diclofenac sodico

Sostanze ausiliarie

Aqua depurata, etanolo, trigliceridi, poliacrilamide, isoparaffina, laureth-7, dimeticone, tocoferolo.

Numero dell'omologazione

55375 (Swissmedic).

Dov'è ottenibile Inflamac Lozione? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia e in drogheria senza prescrizione medica.

Tubi da 50 g e 100 g.

Titolare dell'omologazione

Spiria HealthCare SA, 4622 Egerkingen



Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel dicembre 2024 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

