

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo, che contiene importanti informazioni. Questo medicamento le è stato prescritto dal suo medico o le è stato consegnato senza prescrizione medica in farmacia o in drogheria. Per ottenere il maggior beneficio, usi il medicamento conformemente al foglietto illustrativo o segua le indicazioni del suo medico o del suo farmacista o del suo droghiere. Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

Siccafluid® UD 0,25% gel oftalmico

Théa PHARMA SA

Che cos'è Siccafluid UD 0,25% e quando si usa?

Siccafluid UD 0,25% è un prodotto di supplemento lacrimale che serve a umidificare l'occhio. Può essere inoltre usato, su raccomandazione del farmacista o su prescrizione del medico, per trattare la sindrome dell'occhio secco dovuta a cause diverse.

Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?

Questo medicamento Le è stato prescritto dal Suo medico, o Le è stato dato dal Suo farmacista o droghiere per il trattamento dei disturbi agli occhi di cui Lei soffre attualmente. Non lo usi di propria iniziativa per il trattamento di altre malattie né lo dia ad altre persone.

Quando non si può usare Siccafluid UD 0,25%?

Questo medicamento non dev'essere usato in caso d'ipersensibilità (allergia) nota o presupposta verso una delle componenti di Siccafluid UD 0,25%.

Quando è richiesta prudenza nella somministrazione di Siccafluid UD 0,25%?

Se si usano altre gocce o pomate oftalmiche a titolo complementare, è necessario intercalare un intervallo di 15 minuti tra la somministrazione dei diversi medicamenti. Siccafluid UD 0,25% va applicato per ultimo.

Avvertenza per portatori di lenti a contatto:

Siccafluid UD 0,25% può essere utilizzato anche quando si portano lenti a contatto.

Poiché l'applicazione di gel oftalmici può creare momentaneamente dei disturbi visivi, si raccomanda di non mettersi alla guida di veicoli né di utilizzare macchine nei 20 minuti successivi all'applicazione.

Informi il suo medico, il suo farmacista o il suo droghiere, nel caso in cui soffre di altre malattie, soffre di allergie o assume altri medicamenti (anche se acquistati di propria iniziativa!) o li applica esternamente.

Si può usare Siccafluid UD 0,25% durante la gravidanza o l'allattamento?

In base alle esperienze fatte finora, non sono noti rischi per il bambino se il medicamento è usato correttamente. Tuttavia non sono state compiute indagini scientifiche sistematiche. Per prudenza dovrebbe rinunciare nella misura del possibile ad assumere medicamenti durante la gravidanza e il periodo d'allattamento o chiedere consiglio al Suo medico, farmacista o droghiere.

Come usare Siccafluid UD 0,25%?

Adulti: instillare Siccafluid UD 0,25% nella sacca congiuntivale e battere delicatamente le palpebre più volte di seguito in modo che il gel si distribuisca per bene sulla superficie dell'occhio.

A seconda della necessità, instillare una goccia da 1 a 4 volte al giorno nella sacca congiuntivale dell'occhio da trattare. Nel caso di occhi secchi di altra eziologia, sarà il medico curante a stabilire la durata d'utilizzazione e la frequenza di somministrazione. Il trattamento dell'occhio secco si estende spesso su un lungo periodo di tempo. Un simile trattamento a lungo termine esige dei controlli regolari.

L'uso e la sicurezza di Siccafluid UD 0,25% nei bambini e negli adolescenti non sono finora stati sottoposti a indagini sistematiche.



Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal medico. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al Suo medico, al Suo farmacista o droghiere.

Quali effetti collaterali può avere Siccafluid UD 0,25%?

L'utilizzazione di Siccafluid UD 0,25% può provocare i seguenti effetti collaterali:

Subito dopo l'applicazione la vista può essere nebulosa, le palpebre possono essere incollate o si ha una sensazione passeggera di bruciore.

Sono possibili delle reazioni d'ipersensibilità verso una delle componenti del prodotto.

Se osserva effetti collaterali, si rivolga al suo medico, farmacista o droghiere, soprattutto se si tratta di effetti collaterali non descritti in questo foglietto illustrativo.

Di che altro occorre tener conto?

Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con «EXP» sul contenitore.

Per evitare qualsiasi contaminazione microbica, si raccomanda di lavare le mani prima di procedere all'applicazione e di non toccare l'occhio con l'apertura del flacone. Gettar via il recipiente unidose dopo l'utilizzazione. Non riutilizzare un recipiente già cominciato.

Termine di consumo dopo l'apertura

Dopo l'apertura del blister, l'utilizzazione delle dosi non aperte non deve oltrepassare 6 mesi.

Indicazione di stoccaggio:

Conservare nella confezione originale chiusa, a temperatura ambiente (15-25°C).

Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Durante il periodo d'utilizzazione, tenere i recipienti unidose con la testa verso il basso nella confezione, in modo da favorire l'instillazione del gel.

Il medico, il farmacista o il droghiere, che sono in possesso di un'informazione professionale dettagliata, possono darle ulteriori informazioni.

Cosa contiene Siccafluid UD 0,25%?

1 g di gel oftalmico Siccafluid UD 0,25% contiene:

Principi attivi

2,5 mg di carbomero 974 (P)

Sostanze ausiliarie

Sorbitolo, lisina monoidrato, sodio acetato, alcool polivinilico e acqua per preparazioni iniettabili.

Numero dell'omologazione

57'146 (Swissmedic).

Dove è ottenibile Siccafluid UD 0,25%? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia e in drogheria, senza prescrizione medica.

Siccafluid UD 0,25%, gel oftalmico, è disponibile in confezioni di 30 unidosi da 0,5 g.

Titolare dell'omologazione

THEA Pharma S.A., 8200 Sciaffusa

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel giugno 2020 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

