

Information destinée aux patients

Amukina® Med

Lisez attentivement cette notice d'emballage. Vous y trouverez tous les renseignements importants concernant ce médicament.

Ce médicament vous a été prescrit par votre médecin ou vous a été remis sans ordonnance médicale par votre pharmacien ou votre droguiste. Pour en tirer le meilleur bénéfice, veuillez l'utiliser conformément à la notice d'emballage ou, le cas échéant, aux indications de votre médecin, de votre pharmacien ou de votre droguiste.

Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

Qu'est-ce que Amukina Med et quand doit-il être utilisé ?

Amukina Med est une solution pour application cutanée, prête à l'emploi, contenant du chlore actif comme principe actif. L'Amukina Med est utilisé pour la désinfection de la peau et des petites plaies, soit en lavages, en bains locaux (bains de doigt, de pied ou de siège) ou en irrigations, soit en compresses imbibées, tamponnées sur l'endroit à désinfecter ou en pansements humides.

De quoi faut-il tenir compte en dehors du traitement ?

Les blessures étendues, profondes et fortement souillées, ainsi que les morsures et piqûres d'insectes ou autres objets pointus nécessitent un traitement médical en raison du risque de tétanos. Si la blessure ne se résorbe pas après quelques jours et qu'elle ne guérit pas en 10 à 15 jours il convient de consulter un médecin. De même si les bords de la blessure restent fortement rougis, si la blessure enfle brusquement, devient douloureuse ou s'accompagne de fièvre, il y a risque d'empoisonnement du sang et il faut se rendre sans délai chez le médecin le plus proche.

Quand Amukina Med ne doit-il pas être utilisé ?

L'Amukina Med ne doit pas être utilisé si le patient est hypersensible au chlore.

Quelles sont les précautions à observer lors de l'utilisation de Amukina Med ?

L'Amukina Med doit être utilisé strictement selon le mode d'emploi

(voir : « Comment utiliser Amukina Med »).

L'Amukina Med doit seulement être utilisé en externe. En aucun cas avaler.

L'Amukina Med ne doit pas entrer en contact avec les yeux.

Les solutions de chlore actif perdent de leur efficacité en présence de substances organiques (sang, pus) ainsi que de certains métaux. Ne pas employer de récipients ni de pincettes métalliques pour les soins avec Amukina Med.

Veuillez informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste si :

- Vous souffrez d'une autre maladie
- Vous êtes allergique
- Vous utilisez d'autres médicaments en usage externe.

Amukina Med peut-il être pris/utilisé pendant la grossesse ou l'allaitement ?



Si vous êtes enceinte, si vous pensez l'être ou si vous allaitez, vous ne devez utiliser l'Amukina Med qu'après avoir consulté votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste.

Comment utiliser Amukina Med ?

L'Amukina Med est réservé aux adultes.

L'Amukina Med est prêt à l'emploi et peut être utilisé sans dilution.

Il est important de nettoyer les plaies souillées avec suffisamment de solution pour obtenir une bonne efficacité désinfectante.

La solution s'applique

- Soit en lavages, en bains locaux (bains de doigt, de pied ou de siège) ou en irrigations, d'une durée de 5 minutes.

Les applications sont à répéter aussi souvent et longtemps que nécessaire.

- Soit en compresses imbibées ou en pansements humides, appliqués en durée prolongée aussi longtemps que nécessaire.

A ce jour, ni l'administration, ni la sécurité d'emploi d'Amukina Med n'ont été étudiées chez l'enfant et l'adolescent.

Veuillez vous conformer au dosage figurant dans la notice d'emballage ou prescrit par votre médecin. Si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte, veuillez vous adresser à votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste.

Quels effets secondaires Amukina Med peut-il provoquer ?

Des réactions d'hypersensibilité sous forme d'irritations locales sont possibles. Au moment de l'application, des sensations de froid, de chaud, des démangeaisons ou des picotements d'intensité légère et passagère peuvent parfois être observés.

Si vous remarquez des effets secondaires veuillez en informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste. Ceci vaut en particulier pour les effets secondaires non mentionnés dans cette notice d'emballage.

À quoi faut-il encore faire attention ?

Comme tous les désinfectants à base de chlore, la solution d'Amukina Med peut exercer un effet de blanchiment ; on évitera donc tout contact avec des tissus colorés.

Le médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention « EXP ».

- Tenir Amukina Med hors de portée des enfants.
- Conserver à 15-30°C. Conserver dans l'emballage d'origine pour le protéger de la lumière.
- Veuillez bien refermer le flacon après chaque utilisation.
- La solution peut être employée pendant 3 mois après la première utilisation ; passé ce délai, le flacon doit être retourné à la pharmacie ou à la droguerie.
- Les emballages en votre possession dont la date de péremption est dépassée doivent être traités de la même manière.
- Ne pas avaler.

Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste qui disposent d'une information détaillée destinée aux professionnels.



Que contient Amukina Med ?

Principes actifs

1 ml d'Amukina Med contient 0,55 mg de chlore actif sous forme d'hypochlorite de sodium.

Excipients

chlorure de sodium, hydrogénocarbonate de sodium, hydroxyde de sodium et de l'eau purifiée.

Numéro d'autorisation

55'361 (Swissmedic)

Où obtenez-vous Amukina Med ? Quels sont les emballages à disposition sur le marché ?

En pharmacie et en droguerie sans ordonnance médicale en flacon de 250ml, 500ml.

Titulaire de l'autorisation

Regen Lab SA – 1052 Le Mont /VD

Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en Novembre 2020 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).

