

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo prima di fare uso del medicamento.

Questo medicamento le è stato prescritto personalmente e quindi non deve essere consegnato ad altre persone, anche se i sintomi sono gli stessi. Il medicamento potrebbe nuocere alla loro salute.

Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

Clopidrax®

Drossapharm SA

Che cos'è Clopidrax e quando si usa?

Su prescrizione medica.

Il clopidogrel, principio attivo delle compresse rivestite con film Clopidrax, appartiene a un gruppo di sostanze cosiddette antiaggreganti piastrinici. Le piastrine (trombociti) sono cellule molto piccole del sangue (più piccole dei globuli rossi e bianchi) che si raggruppano durante la formazione di un trombo (coagulo di sangue). Gli antiaggreganti piastrinici impediscono questo raggrumarsi e diminuiscono in tal modo il rischio di una trombosi (formazione di coaguli di sangue).

Dato che recentemente ha avuto un'infarto cardiaco o un ictus, oppure soffre di un restringimento delle arterie periferiche, corre un rischio più elevato che ciò possa ripetersi.

Per ridurre questo rischio il suo medico le ha prescritto Clopidrax.

Clopidrax le è stato prescritto, tra l'altro, se:

- soffre di arteriopatia degli arti inferiori, o
- ha avuto un grave dolore toracico conosciuto come «angina instabile» o «infarto miocardico» (infarto cardiaco). In questo caso il suo medico le può prescrivere anche dell'acido acetilsalicilico (una sostanza presente in numerosi medicinali utilizzati per alleviare il dolore e per abbassare la febbre) o
- soffre di frequenza cardiaca irregolare, una malattia altrimenti nota come fibrillazione atriale e non può essere curato con i medicinali chiamati "anticoagulanti orali". In tal caso il suo medico le prescriverà anche dell'acido acetilsalicilico.

Clopidrax è utilizzato anche per la prevenzione delle trombosi dopo l'impianto di endoprotesi vascolari (stent), in combinazione con l'acido acetilsalicilico.

Clopidrax si può prendere solamente su prescrizione del medico e non deve essere consegnato a un'altra persona.

Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?

Poiché le malattie delle arterie originano da fattori quali l'ipertensione arteriosa, un tasso aumentato di colesterolo, il tabagismo e il diabete, è importante modificare il suo modo di vivere, per ridurre questi fattori di rischio.

Chieda consiglio al suo medico.

Quando non si può assumere Clopidrax?

Non si può assumere Clopidrax se:



- ha un'ipersensibilità (allergia) a questo medicamento o ha avuto reazioni allergiche alla ticlopidina o alla sostanza prasugrel;
- soffre di un disturbo della coagulazione del sangue che aumenta il rischio di emorragie interne (ad esempio sanguinamenti all'interno dei tessuti, di un organo o di un'articolazione);
- soffre di una malattia con un alto rischio di emorragie interne (ad esempio un'ulcera allo stomaco o all'intestino);
- ha una predisposizione ai sanguinamenti;
- soffre di un'insufficienza epatica grave.

L'efficacia e la sicurezza di Clopidrax non sono state valutate nei bambini e negli adolescenti sotto i 18 anni.

Se crede di soffrire di una di queste malattie o se ha delle incertezze a tal riguardo, consulti il suo medico prima di cominciare ad assumere le compresse rivestite con film Clopidrax.

Quando è richiesta prudenza nella somministrazione di Clopidrax?

Prima di prendere Clopidrax deve informare il suo medico se:

- ha avuto recentemente una ferita grave;
- si è sottoposto recentemente a un intervento chirurgico (compresi gli interventi del dentista);
- presenta disturbi della coagulazione che favoriscono le emorragie interne (sanguinamenti all'interno dei tessuti, di un organo o di un'articolazione);
- soffre di una malattia che può provocare un sanguinamento (quale un'ulcera gastrica);
- nelle prossime 2 settimane si sottoporrà a un intervento chirurgico (compresi gli interventi del dentista);
- soffre di disturbi dei reni o del fegato;
- ha avuto recentemente un ictus;
- ha avuto recentemente un infarto miocardico (Clopidrax non deve essere utilizzato dopo il trattamento a base di streptochinasi);
- ha problemi d'ipertensione mal controllata o non trattata;
- soffre di emofilia acquisita (disturbi della coagulazione del sangue);
- ha precedenti di allergia o di reazioni allergiche a qualsiasi medicamento usato per trattare la sua malattia.

Clopidrax modifica la capacità di coagulazione del sangue. Se si taglia o si ferisce, il sanguinamento potrebbe durare un po' più del solito.

Generalmente, piccoli tagli e ferite che possono verificarsi (ad esempio durante la rasatura) non hanno generalmente importanza. Tuttavia, in caso di dubbio o di un sanguinamento anormale, prenda subito contatto col suo medico.

Dopo l'impianto di endoprotesi vascolari (stent) o nei malati che hanno avuto un grave dolore toracico (angina instabile o infarto cardiaco), Clopidrax può essere prescritto in combinazione con dell'acido acetilsalicilico (75-325 mg al giorno), una sostanza presente in numerosi medicinali utilizzati per alleviare il dolore e abbassare la febbre. In questi casi è raccomandata abitualmente una dose giornaliera fissa di 100 mg di acido acetilsalicilico per una terapia combinata a lungo termine con Clopidrax. In altre circostanze l'uso dell'acido acetilsalicilico per un periodo prolungato dev'essere discusso con il suo medico. L'uso occasionale di acido acetilsalicilico (non più di 1000 mg nell'arco di 24 ore) non dovrebbe porre alcun problema.

Certi medicinali, prescritti dal suo medico o in vendita libera, possono modificare l'efficacia di questo medicamento o viceversa e provocare effetti collaterali. Perciò, durante la terapia con Clopidrax consulti il suo medico o il suo farmacista prima di assumere qualsiasi altro medicamento.



L'assunzione dei seguenti medicinali in concomitanza con Clopidrax non è consigliabile:

- inibitori della pompa protonica (ad es. omeprazolo) per il trattamento di mal di stomaco;
- medicinali che possono aumentare il rischio di sanguinamento:
 - prodotti che inibiscono la coagulazione del sangue, come il fenprocumone (Marcoumar acenocumarolo (Sintrom), l'eparina o la warfarina;
 - prodotti antinfiammatori non steroidei come l'aspirina/acido acetilsalicilico (medicamenti per la terapia di stati dolorosi e/o infiammatori dei muscoli e delle articolazioni) che possono essere presi in concomitanza con Clopidrax solo su prescrizione e sotto controllo medico;
 - combinazione con altre terapie antiaggreganti piastrinici utilizzate nella prevenzione delle malattie trombotiche cerebrovascolari (triplice terapia clopidogrel/aspirina/dipiridamolo);
 - rifampicina, un antibiotico utilizzato per trattare le infezioni gravi (determinati batteri, la tubercolosi, la lebbra);
- antidepressivi (fluvoxamina, fluoxetina, moclobemide, SSRI);
- antimicotici (voriconazolo, fluconazolo);
- antibiotici (ciprofloxacina);
- antiepilettici (carbamazepina);
- antidiabetici (repaglinide);
- antitumorali (paclitaxel);
- trattamenti contro l'epatite C (dasabuvir)
- oppioidi: se assume clopidogrel, informi il suo medico prima che le venga prescritto un oppioide (usato per trattare il dolore intenso).
- statine (rosuvastatina).

Clopidrax contiene lattosio; i pazienti affetti da malattie ereditarie rare quali: intolleranza al galattosio, deficit di lattasi o malassorbimento del glucosio galattosio non devono quindi assumere questo medicinale. Se il suo medico le ha comunicato che lei ha un'intolleranza a determinati zuccheri, lo consulti prima di prendere questo medicinale.

Informi il suo medico o il suo farmacista, nel caso in cui

- soffre di altre malattie,
- soffre di allergie o
- assume altri medicinali (anche se acquistati di sua iniziativa.) o li applica esternamente.

Si può assumere Clopidrax durante la gravidanza o l'allattamento?

Se è gravida, oppure allatta deve comunicarlo al suo medico. Spetta a lui decidere se può assumere Clopidrax durante la gravidanza o l'allattamento.

Se durante la terapia con Clopidrax inizia una gravidanza, lo comunichi subito al suo medico.

Non allattare durante la terapia con Clopidrax.

Come usare Clopidrax?

Le compresse rivestite con film Clopidrax vanno inghiottite con un po' d'acqua durante o lontano dai pasti, senza masticarle né succhiarle. Si consiglia di prendere Clopidrax sempre alla stessa ora del giorno.

Adulti



- Prevenzione degli eventi ictus ischemici (attacco cerebrale, infarto cardiaco):

Salvo diversa prescrizione del medico, assuma 1 compressa di Clopidrax da 75 mg al giorno. Gravi dolori toracici (angina instabile o infarto cardiaco): il suo medico le può prescrivere un dosaggio di carico di 300 mg di Clopidrax all'inizio del trattamento, seguiti a lunga scadenza da una presa quotidiana di 1 compressa di Clopidrax da 75 mg (in combinazione con l'acido acetilsalicilico alla dose di 75 mg-325 mg al giorno).

- Prevenzione delle trombosi dopo l'impianto di endoprotesi vascolari (stent):

1 volta al giorno una compressa da 75 mg di Clopidrax in combinazione con l'acido acetilsalicilico (in studi clinici sono stati usati 325 mg al giorno). Nel caso d'impianto di stent si può eventualmente iniziare il trattamento il primo giorno con un dosaggio di carico di 300 mg di Clopidrax.

Nei pazienti affetti da fibrillazione atriale: 1 compressa da 75 mg di Clopidrax, 1 volta al giorno in combinazione con l'acido acetilsalicilico alla dose quotidiana di 100 mg.

Bambini e adolescenti

L'efficacia e la sicurezza di Clopidrax non sono state valutate nei bambini e negli adolescenti sotto i 18 anni.

Insufficienza renale ed epatica

Somministrare con prudenza in questa categoria di pazienti.

Pazienti anziani

Non occorre adeguare la dose nei soggetti anziani.

Durata del trattamento

La terapia con Clopidrax è un trattamento a lunga scadenza. Perciò deve prendere Clopidrax per tutta la durata prescritta dal medico.

In caso di sovradosaggio (dose eccessiva del medicamento), ne informi immediatamente il suo medico o si rechi al pronto soccorso dell'ospedale più vicino. L'assunzione di un numero eccessivo di compresse rivestite con film potrebbe causare gravi emorragie che richiedono una terapia d'urgenza.

Se ha dimenticato di assumere Clopidrax e se ne accorge entro 12 ore dall'ora di assunzione prevista, recuperi subito la dose tralasciata e assuma poi la compressa successiva alla solita ora.

Se sono trascorse più di 12 ore dall'ora di assunzione prevista, assuma semplicemente la compressa successiva nel momento previsto della prossima somministrazione. Non assuma una quantità doppia di compresse rivestite con film per recuperare la dose dimenticata.

Grazie al calendario sul retro del blister può controllare in quale giorno ha assunto l'ultima compressa Clopidrax.

Non modifichi di propria iniziativa la posologia prescritta. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte, ne parli al suo medico o al suo farmacista.

Quali effetti collaterali può avere Clopidrax?

Con l'assunzione di Clopidrax possono manifestarsi i seguenti effetti collaterali:

Comune (riguarda da 1 a 10 persone su 100)

Sanguinamento, dispepsia, mal di pancia, diarrea, ematomi cutanei poco estesi.



Non comune (riguarda da 1 a 10 persone su 1000)

Ulcere e sanguinamenti dello stomaco o dell'intestino, sanguinamenti dal naso, lividi (ecchimosi), sangue nelle urine, sanguinamenti oculari, polmonari, muscolari, articolari e cerebrali. Capogiri, vellicio alle mani e ai piedi, cefalee. Nausee, gastrite, flatulenza, stipsi, vomito. Disturbi del fegato e delle vie biliari. Pizzicore.

Raro (riguarda da 1 a 10 persone su 10 000)

Vertigini, aumento del volume dei seni negli uomini.

Molto raro (riguarda meno di 1 persona su 10 000)

Reazioni allergiche generalizzate (edema del viso, delle labbra e/o della lingua). Possono verificarsi gravi incidenti ematologici (neutropenia: diminuzione del numero di un tipo di globuli bianchi), che possono condurre a gravi infezioni, emofilia acquisita (disturbi della coagulazione del sangue). Disturbi o perdita del gusto. Confusione, allucinazioni. Infiammazione dei vasi sanguigni, ipotensione. Difficoltà respiratorie. Colite, infiammazione del pancreas, stomatite. Epatite. Eruzioni cutanee, eczemi, esfoliazione cutanea. Dolori articolari, dolori dei muscoli. Danni ai reni. Febbre.

Frequenza non nota (non può essere definita sulla base dei dati disponibili)

- Alcune persone possono presentare un'ipersensibilità al clopidogrel che può manifestarsi con la sindrome di Kounis (disturbi cardiaci).
- Sintomi persistenti di ipoglicemia (basso tasso di zucchero nel sangue).

Se si presentano i seguenti sintomi, deve interrompere la terapia con Clopidrax e consultare subito il suo medico: febbre, infiammazioni della gola, ulcerazioni in bocca o nella faringe, sanguinamenti importanti o prolungati, ematomi, porpora, feci nere.

Se assume il clopidogrel insieme all'acido acetilsalilico (aspirina) (sostanza presente in numerosi medicinali analgesici e antipiretici), a medicinali antinfiammatori non steroidei, all'eparina o ad altri medicinali che possono provocare o prolungare un sanguinamento a seguito di un trauma, di un intervento chirurgico o di altre cause, informi il suo medico o il suo farmacista su tutti gli episodi di sanguinamento.

Se osserva effetti collaterali, si rivolga al suo medico, farmacista soprattutto se si tratta di effetti collaterali non descritti in questo foglietto illustrativo.

Di che altro occorre tener conto?

Il medicinale non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con «EXP» sul contenitore. Riporti in farmacia le compresse scadute.

Istruzioni di conservazione

Conservare fuori dalla portata dei bambini, a temperatura ambiente (15°C-25°C) e nella confezione originale.

Ulteriori indicazioni

Il medico, il farmacista, che sono in possesso di un'informazione professionale dettagliata, possono darle ulteriori informazioni.

Cosa contiene Clopidrax?

1 compressa rivestita con film contiene:



Principio attivo: 75 mg di clopidogrel sotto forma di clopidogrel besilato

Sostanze ausiliarie: cellulosa microcristallina, mannitolo, idrossipropilcellulosa, acido stearico, lattosio monoidrato, acido citrico monoidrato, crospovidone, talco, ipromellosa, diossido di titanio, triacetina, macrogol, ferro ossido rosso

Numero dell'omologazione

61340 (Swissmedic)

Dov'è ottenibile Clopidrax? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia, dietro presentazione della prescrizione medica.

Clopidrax 75 mg: confezioni da 28 e 84 compresse rivestite con film

Titolare dell'omologazione

Drossapharm SA, Basilea

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel **settembre 2022** dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

