

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo che contiene importanti informazioni.

Questo medicamento le è stato prescritto dal suo medico o le è stato consegnato senza prescrizione medica in farmacia o in drogheria. Per ottenere il maggior beneficio, usi il medicamento conformemente al foglietto illustrativo o segua le indicazioni del medico o del farmacista o del droghiere. Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

Similasan Ustioni solari e piccole scottature, spray per uso sulla pelle

Medicamento omeopatico

Quando si usa Similasan Ustioni solare e piccole scottature?

Secondo la concezione che sta alla base dei medicinali omeopatici *Similasan Ustioni solare e piccole scottature* può essere usato in caso di ustioni solari (sole naturale, lampade abbronzanti, solarium) e piccole scottature di 1° grado.

L'uso di questo medicamento nel settore di applicazione citato si basa esclusivamente sui principi di un indirizzo terapeutico omeopatico.

Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?

Se il suo medico le ha prescritto altri medicinali, chieda al suo medico o al suo farmacista se simultaneamente può usare *Similasan Ustioni solare e piccole scottature*.

- Le ustioni estese devono essere trattate immediatamente da un medico.
- Rivolgersi al medico in caso di peggioramento locale o se la guarigione non avviene nel giro di 2-3 settimane.
- Consultare immediatamente un medico in caso di peggioramento delle condizioni generali (p.es. febbre).

Quando non si può usare Similasan Ustioni solare e piccole scottature e quando la sua somministrazione/il suo uso richiede prudenza?

Non deve essere usato:

- nei bambini piccoli sotto i 2 anni
- in caso di allergia nota alle composite (ad es. calendula, echinacea) o a uno dei componenti
- nei neonati e nei bambini piccoli
- in caso di scottature estese
- su vescicole
- su ferite aperte, mucose o in prossimità degli occhi

Questo medicamento contiene 25,34 mg di alcol (etanolo) in ogni unità di dosaggio (spruzzo) con 0,127 ml di volume di dosaggio, equivalenti a 200 mg/ml (20% w/v).

Può causare sensazione di bruciore sulla pelle danneggiata.

Informi il suo medico o il suo farmacista o il suo droghiere, nel caso in cui

- soffre di altre malattie
- soffre di allergie o
- assume altri medicinali (anche acquistati di sua iniziativa) o li applica esternamente



Si può usare Similasan Ustioni solare e piccole scottature durante la gravidanza o l'allattamento?

In base alle esperienze fatte finora, non sono noti rischi per il bambino se il medicamento è usato correttamente. Tuttavia, non sono ancora state eseguite indagini scientifiche sistematiche. Per prudenza dovrebbe rinunciare nella misura del possibile ad assumere medicinali durante la gravidanza e il periodo d'allattamento o chiedere consiglio al proprio medico o farmacista o droghiere.

Come usare Similasan Ustioni solare e piccole scottature?

Salvo diversamente prescritto dal medico:

Utilizzare non diluito e possibilmente subito. Evitare il contatto con gli occhi. Non spruzzare negli occhi o sulle mucose.

– **Ustione solare:**

Bambini a partire dai 2 anni: uno spruzzo più volte al giorno. Erogare al massimo 1 spruzzo per 6 volte al giorno sullo stesso punto

Adolescenti e adulti: 2 spruzzi più volte al giorno. Erogare al massimo 2 spruzzi per 6 volte al giorno sullo stesso punto

– **Piccole scottature: Bambini a partire dai 2 anni, adolescenti e adulti:** coprire la parte interessata con garza sterile o un tampone pulito. Fissare. Umettare con del liquido più volte al giorno.

Similasan Ustioni solari e piccole scottature non deve essere usato nei bambini piccoli sotto i 2 anni.

Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal suo medico. Se il trattamento di un bambino, non produce il miglioramento auspicato, consulti un medico. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico, al suo farmacista o al suo droghiere.

Quali effetti collaterali può avere Similasan Ustioni solare e piccole scottature?

In rari casi possono verificarsi reazioni di ipersensibilità (esantemi, gonfiore al viso). In questi casi sospendere l'uso un medico.

Se osserva effetti collaterali, si rivolga al suo medico, farmacista o droghiere, soprattutto se si tratta di effetti collaterali non descritti in questo foglietto illustrativo.

Con l'assunzione di medicinali omeopatici, i disturbi possono momentaneamente aggravarsi (aggravamento iniziale). Se l'aggravamento dovesse persistere, interrompa il trattamento con *Similasan Ustioni solare e piccole scottature* e informi il suo medico o il suo farmacista o il suo droghiere.

Di che altro occorre tener conto?

Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con «EXP» sul contenitore.

Indicazione di stoccaggio

Conservare a temperatura ambiente (15-25 °C).

Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Ulteriori indicazioni



Il medico o il farmacista o il droghiere possono darle ulteriori informazioni.

Cosa contiene Similasan Ustioni solare e piccole scottature?

1 ml (8 spruzzi) di liquido contiene:

Principi attivi

Calendula officinalis (HAB) D4 0.2 ml

Lytta vesicatoria (HAB) D6 0.2 ml

Echinacea (HAB) D4 0.3 ml

Urtica urens (HAB) D4 0.3 ml

Sostanze ausiliarie

acqua per preparazioni iniettabili, etanolo.

Contiene 25 % vol. di alcol.

Numero dell'omologazione

46779 (Swissmedic)

Dove è ottenibile Similasan Ustioni solare e piccole scottature? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia e in drogheria, senza prescrizione medica.

Confezioni: Flaconi da 90 ml e 30 ml

Titolare dell'omologazione

Similasan AG, CH-8916 Jonen

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel settembre 2021 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

