

Information für Patientinnen und Patienten

Lesen Sie diese Packungsbeilage sorgfältig, denn sie enthält wichtige Informationen.

Dieses Arzneimittel haben Sie entweder persönlich von Ihrem Arzt oder Ihrer Ärztin verschrieben erhalten oder Sie haben es ohne ärztliche Verschreibung in der Apotheke oder Drogerie bezogen. Wenden Sie das Arzneimittel gemäss Packungsbeilage beziehungsweise nach Anweisung des Arztes, Apothekers oder Drogisten bzw. der Ärztin, der Apothekerin oder der Drogistin an, um den grössten Nutzen zu haben. Bewahren Sie die Packungsbeilage auf, Sie wollen sie vielleicht später nochmals lesen.

Similasan Mund- und Halsentzündungen, Spray zur Anwendung in der Mundhöhle

Homöopathisches Arzneimittel

Wann wird Similasan Mund- und Halsentzündungen angewendet?

Gemäss homöopathischem Arzneimittelbild kann Similasan Mund- und Halsentzündungen bei akuten, schmerzhaften Entzündungen im Mund und Hals; Mundgeruch infolge Mund- und Halsentzündungen angewendet werden.

Die Anwendung dieses Arzneimittels im genannten Anwendungsgebiet beruht ausschliesslich auf den Prinzipien einer homöopathischen Therapierichtung.

Was sollte dazu beachtet werden?

Wenn Ihnen Ihr Arzt oder Ihre Ärztin andere Arzneimittel verordnet hat, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker bzw. Ihre Ärztin oder Apothekerin, ob Similasan Mund- und Halsentzündungen gleichzeitig eingenommen werden darf.

Nicht in die Augen sprühen

Wann darf Similasan Mund- und Halsentzündungen nicht oder nur mit Vorsicht eingenommen / angewendet werden?

Bei hohem Fieber ist ein Arzt oder eine Ärztin aufzusuchen.

- Nicht anwenden bei bekannter Überempfindlichkeit gegenüber Asteraceen/Korbblütler (Arnika, Calendula etc).

Bei Kindern unter 6 Jahren soll Similasan Mund- und Halsentzündungen nicht angewendet werden.

Dieses Arzneimittel enthält 23.22 mg Alkohol (Ethanol) pro Sprühstoss mit 0,125 ml entsprechend 185.75 mg/ml (18,58 % w/V). Die Menge in 3 Sprühstössen dieses Arzneimittels entspricht weniger als 2 ml Bier oder 1 ml Wein.

Die geringe Alkoholmenge in diesem Arzneimittel hat keine wahrnehmbaren Auswirkungen.

Informieren Sie Ihren Arzt, Apotheker oder Drogisten bzw. Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin, wenn Sie

- an anderen Krankheiten leiden,



- Allergien haben oder
- andere Arzneimittel (auch selbst gekaufte!) einnehmen

Darf Similasan Mund- und Halsentzündungen während einer Schwangerschaft oder in der Stillzeit eingenommen / angewendet werden?

Aufgrund der bisherigen Erfahrungen ist bei bestimmungsgemässer Anwendung kein Risiko für das Kind bekannt. Systematische wissenschaftliche Untersuchungen wurden aber nie durchgeführt. Vorsichtshalber sollten Sie während der Schwangerschaft und Stillzeit möglichst auf Arzneimittel verzichten oder den Arzt, Apotheker oder Drogisten bzw. die Ärztin, Apothekerin oder Drogistin um Rat fragen.

Wie verwenden Sie Similasan Mund- und Halsentzündungen?

Falls vom Arzt bzw. von der Ärztin nicht anders verschrieben:

Kinder ab 6 Jahren, Jugendliche und Erwachsene:

pro Anwendung 2 - 3 Pump-Stösse (entsprechend 0.25-0.375 ml).

Akute Beschwerden:

Häufig (bis viertelstündlich). Bei deutlicher Besserung die Gabenhäufigkeit nach eigenem Ermessen reduzieren.

Zum Ausheilen: 2 - 3 mal täglich bis zur vollständigen Beschwerdefreiheit.

- Düse auf den gut geöffneten Mund richten.
- Sprühkopf durch einen kräftigen Druck wiederholt mit dem Daumen oder Zeigefinger nach unten drücken.

Nicht für Kinder unter 6 Jahren

Halten Sie sich an die in der Packungsbeilage angegebene oder vom Arzt oder der Ärztin verschriebene Dosierung. Wenn Sie glauben, das Arzneimittel wirke zu schwach oder zu stark, so sprechen Sie mit Ihrem Arzt, Apotheker oder Drogisten bzw. mit Ihrer Ärztin, Apothekerin oder Drogistin.

Welche Nebenwirkungen kann Similasan Mund- und Halsentzündungen haben?

Häufigkeit nicht bekannt (kann aus den verfügbaren Daten nicht abgeschätzt werden)

Bei Auftreten von allergischen Reaktionen (Rötungen, Schwellung der Schleimhäute) ist auf die weitere Anwendung zu verzichten.

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt, Apotheker oder Drogisten oder Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin. Dies gilt insbesondere auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind.

Bei Einnahme von homöopathischen Arzneimitteln können sich die Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). Bei andauernder Verschlechterung setzen Sie Similasan Mund- und Halsentzündungen ab und informieren Sie Ihren Arzt, Apotheker oder Drogisten oder Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin.

Was ist ferner zu beachten?

Das Arzneimittel darf nur bis zu dem auf dem Behälter mit "EXP" bezeichneten Datum verwendet werden.

Lagerungshinweis



Bei Raumtemperatur (15-25°C) lagern.
Ausser Reichweite von Kindern aufbewahren.

Weitere Hinweise

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen Ihr Arzt, Apotheker oder Drogist bzw. Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin.

Was ist in Similasan Mund- und Halsentzündungen enthalten?

Pump-Spray zur Anwendung in der Mundhöhle, Glasflasche mit Pumpaufsatz mit 15ml Inhalt.
1 ml Flüssigkeit (8 Sprühstösse) enthält:

Wirkstoffe

Arnica montana (HAB) D6 0,2 ml; Calendula officinalis (HAB) D4 0,2 ml; Guaiacum (HAB) D4 0,2 ml;
Hydrargyrum bichloratum (HAB) D12 (HAB5a) 0,2 ml; Thuja occidentalis (HAB) D6 0,2 ml

Hilfsstoffe

Ethanol, Wasser für Injektionszwecke. Enthält 24 Vol-% Alkohol.

Zulassungsnummer

54923 (Swissmedic)

Wo erhalten Sie Similasan Mund- und Halsentzündungen? Welche Packungen sind erhältlich?

In Apotheken und Drogerien, ohne ärztliche Verschreibung.
Packungsgrösse: Flasche mit 15 ml (=120 Sprühstösse)

ZulassungsinhaberIn

Similasan AG, CH-8916 Jönen

Diese Packungsbeilage wurde im September 2022 letztmals durch die Arzneimittelbehörde (Swissmedic) geprüft.

