

Information destinée aux patients

Lisez attentivement cette notice d'emballage. Vous y trouverez tous les renseignements importants concernant ce médicament.

Ce médicament vous a été prescrit par votre médecin ou vous a été remis sans ordonnance médicale par votre pharmacien ou votre droguiste. Pour en tirer le meilleur bénéfice, veuillez l'utiliser conformément à la notice d'emballage ou, le cas échéant, aux indications de votre médecin ou de votre pharmacien ou de votre droguiste. Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

Similasan Inflammation de la bouche et de la gorge, solution pour pulvérisation buccale

Médicament homéopathique

Quand Similasan Inflammation de la bouche et de la gorge est-il utilisé ?

Selon la conception homéopathique, Similasan Inflammation de la bouche et de la gorge peut être utilisé en cas de Inflammations aiguës et douloureuses de la bouche et de la gorge; Mauvaise haleine consécutive à une inflammation de la bouche et de la gorge.

L'utilisation de ce médicament dans le champ d'applications indiqué est basée exclusivement sur les principes de l'homéopathie.

De quoi faut-il tenir compte en dehors du traitement ?

Si votre médecin vous a prescrit d'autres médicaments, demandez à votre médecin ou à votre pharmacien si Similasan Inflammation de la bouche et de la gorge peut être pris/utilisé simultanément.

Ne pas vaporiser dans les yeux.

Quand Similasan Inflammation de la bouche et de la gorge ne doit-il pas être pris/utilisé ou seulement avec précaution ?

En cas de forte fièvre, il y a lieu de consulter un médecin.

– Ne pas utiliser en cas d'hypersensibilité connue aux astéracées/ composées (arnica, calendula etc.).

Ne pas utiliser Similasan Inflammations de la bouche et de la gorge chez les enfants de moins de 6 ans.

Ce médicament contient 23,22 mg d'alcool (éthanol) par vaporisation d'un volume de 0,125 ml, correspondant à 185,75 mg/ml (18,58% w/v). La quantité contenue dans 3 vaporisations de ce médicament correspond à moins de 2 ml de bière ou 1 ml de vin.

La faible quantité d'alcool contenue dans ce médicament n'a aucun effet perceptible.

Veuillez informer votre médecin ou votre pharmacien ou votre droguiste si

- vous souffrez d'une autre maladie
- vous êtes allergique
- vous prenez déjà d'autres médicaments (même en automédication !).

Similasan Inflammation de la bouche et de la gorge peut-il être pris/utilisé pendant la grossesse ou l'allaitement ?



Sur la base des expériences faites à ce jour, aucun risque pour l'enfant n'est connu si ce médicament est utilisé conformément à l'usage auquel il est destiné. Toutefois, aucune étude scientifique systématique n'a été effectuée. Par mesure de précaution, vous devriez renoncer si possible à prendre des médicaments durant la grossesse et l'allaitement, ou demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien ou de votre droguiste.

Comment utiliser Similasan Inflammation de la bouche et de la gorge ?

Sauf prescription contraire du médecin:

Enfants à partir de 6 ans, adolescents et adultes:

pulvériser 2 à 3 fois par utilisation (correspond à 0,25–0,375 ml).

Troubles aigus: fréquemment (jusqu'à toutes les 15 minutes). En cas de nette amélioration, diminuer la fréquence selon votre propre appréciation.

Pour parachever la guérison: 2 à 3 fois par jour jusqu'à ce que les troubles disparaissent totalement.

- Diriger la buse en direction de la bouche bien ouverte.
- Appuyer plusieurs fois vigoureusement sur la pompe doseuse avec le pouce ou l'index.

Ne convient pas aux enfants de moins de 6 ans

Veuillez vous conformer au dosage figurant sur la notice d'emballage ou prescrit par votre médecin. Si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte, veuillez vous adresser à votre médecin, à votre pharmacien ou à votre droguiste.

Quels effets secondaires Similasan Inflammation de la bouche et de la gorge peut-il provoquer ?

Fréquence inconnue (ne peut être estimée à partir des données disponibles)

En cas de réactions allergiques (rougeurs, gonflement des muqueuses), renoncer à l'utilisation.

Si vous remarquez des effets secondaires, veuillez en informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste. Ceci vaut en particulier pour les effets secondaires non mentionnés dans cette notice d'emballage.

La prise de médicaments homéopathiques peut aggraver passagèrement les troubles (aggravation initiale). Si cette aggravation persiste, cessez le traitement avec Similasan Inflammation de la bouche et de la gorge et informez-en votre médecin ou votre pharmacien ou votre droguiste.

À quoi faut-il encore faire attention ?

Ce médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention <EXP> sur le récipient.

Remarques concernant le stockage

Conserver à température ambiante (15-25°C).

Conserver hors de portée des enfants.

Remarques complémentaires

Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin ou votre pharmacien ou votre droguiste.

Que contient Similasan Inflammation de la bouche et de la gorge ?

Spray à pompe pour utilisation dans la cavité buccale, flacon en verre avec embout vaporisateur d'une contenance de 15 ml.

1 ml de liquide (8 vaporisations) contient:

Principes actifs



Arnica montana (HAB) D6 0,2 ml; Calendula officinalis (HAB) D4 0,2 ml; Guaiacum (HAB) D4 0,2 ml; Hydrargyrum bichloratum (HAB) D12 (HAB5a) 0,2 ml; Thuja occidentalis (HAB) D6 0,2 ml

Excipients

Éthanol, eau pour injection. Contient 24% vol. d'alcool.

Numéro d'autorisation

54923 (Swissmedic)

Où obtenez-vous Similasan Inflammation de la bouche et de la gorge ? Quels sont les emballages à disposition sur le marché ?

En pharmacie et en droguerie, sans ordonnance médicale.

Conditionnement: flacon à 15 ml (= 120 applications)

Titulaire de l'autorisation

Similasan AG, CH-8916 Jonen

Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en septembre 2022 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).

