

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo che contiene importanti informazioni.

Questo medicamento le è stato prescritto dal suo medico o le è stato consegnato senza prescrizione medica in farmacia o in drogheria. Per ottenere il maggior beneficio, usi il medicamento conformemente al foglietto illustrativo o segua le indicazioni del medico o del farmacista o del droghiere. Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

Similasan Infiammazioni del cavo orale e della gola, spray per uso nella cavità orale

Medicamento omeopatico

Quando si usa Similasan Infiammazioni del cavo orale e della gola?

Secondo la concezione che sta alla base dei medicinali omeopatici Similasan Infiammazioni del cavo orale e della gola può essere usato in caso di Infiammazioni acute e doloranti della bocca e della gola; Alitosi conseguenti a infiammazioni del cavo orale e della gola.

L'uso di questo medicamento nel settore di applicazione citato si basa esclusivamente sui principi di un indirizzo terapeutico omeopatico.

Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?

Se il suo medico le ha prescritto altri medicinali, chieda al suo medico o al suo farmacista se simultaneamente può assumere Similasan Infiammazioni del cavo orale e della gola.

Non spruzzare negli occhi.

Quando non si può assumere/usare Similasan Infiammazioni del cavo orale e della gola e quando la sua somministrazione/il suo uso richiede prudenza?

Consultare il medico in caso di febbre alta.

- Non usare il preparato in caso di sensibilità accertata alle asteracee, Asteracee (arnica, calendula ecc.).

Similasan Infiammazioni del cavo orale e della gola non deve essere usato nei bambini sotto i 6 anni. Questo medicamento contiene 23,22 mg di alcol (etanolo) per spruzzo con 0,125 ml corrispondenti a 185,75 mg/ml (18,58% w/V). La quantità in 3 spruzzi di questo medicamento corrisponde a meno di 2 ml di birra o a 1 ml di vino.

La minima quantità di alcol in questo medicamento non ha alcun effetto percepibile.

Informi il suo medico o il suo farmacista o il suo droghiere, nel caso in cui

- soffre di altre malattie
- soffre di allergie o
- assume altri medicinali (anche acquistati di sua iniziativa)

Si può assumere / usare Similasan Infiammazioni del cavo orale e della gola durante la gravidanza o l'allattamento?

In base alle esperienze fatte finora, non sono noti rischi per il bambino se il medicamento è usato correttamente. Tuttavia, non sono ancora state eseguite indagini scientifiche sistematiche. Per prudenza



dovrebbe rinunciare nella misura del possibile ad assumere medicinali durante la gravidanza e il periodo d'allattamento o chiedere consiglio al proprio medico o farmacista o droghiere.

Come usare Similasan Infiammazioni del cavo orale e della gola?

Salvo diversa prescrizione medica, attenersi alla seguente posologia:

ragazzi di età superiore a 6 anni, adolescenti e adulti:

2 - 3 spruzzi per applicazione. (corrispondono a 0,25-0,375 ml).

Sintomi acuti: applicare ripetutamente (fino 1 volta ogni quarto d'ora). In presenza di chiari segnali di miglioramento, ridurre la frequenza di applicazione a propria discrezione.

Per la completa guarigione: 2 - 3 somministrazioni al giorno fino alla scomparsa dei sintomi.

- Orientare l'erogatore verso l'interno della bocca, tenendola ben aperta.
- Premere la testina energicamente e più volte con il pollice o l'indice.

Non indicato per bambini sotto i 6 anni.

Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal suo medico. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico, al suo farmacista o al suo droghiere.

Quali effetti collaterali può avere Similasan Infiammazioni del cavo orale e della gola?

Frequenza non nota (non può essere definita sulla base dei dati disponibili).

Sospendere la somministrazione in caso di comparsa di reazioni allergiche (arrossamenti, gonfiore delle mucose).

Se osserva effetti collaterali, si rivolga al suo medico, farmacista o droghiere, soprattutto se si tratta di effetti collaterali non descritti in questo foglietto illustrativo.

Con l'assunzione di medicinali omeopatici, i disturbi possono momentaneamente aggravarsi (aggravamento iniziale). Se l'aggravamento dovesse persistere, interrompa il trattamento con Similasan Infiammazioni del cavo orale e della gola e informi il suo medico o il suo farmacista o il suo droghiere.

Di che altro occorre tener conto?

Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con «EXP» sul contenitore.

Indicazione di stoccaggio

Conservare a temperatura ambiente (15-25 °C).

Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Ulteriori indicazioni

Il medico o il farmacista o il droghiere possono darle ulteriori informazioni.

Cosa contiene Similasan Infiammazioni del cavo orale e della gola?

Pompa-spray per l'uso nel cavo orale, flacone in vetro con inserto a pompa con 15 ml di contenuto.

1 ml di liquido (8 spruzzi) contiene:

Principi attivi

Arnica montana (HAB) D6 0,2 ml; Calendula officinalis (HAB) D4 0,2 ml; Guaiacum (HAB) D4 0,2 ml; Hydrargyrum bichloratum (HAB) D12 (HAB5a) 0,2 ml; Thuja occidentalis (HAB) D6 0,2 ml



Sostanze ausiliarie

Etanolo, acqua per preparazioni iniettabili. Contiene 24% di vol. di alcol.

Numero dell'omologazione

54923 (Swissmedic)

Dove è ottenibile Similasan Infiammazioni del cavo orale e della gola? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia e in drogheria, senza prescrizione medica.

Confezione: flacone da 15 ml (= 120 applicazioni)

Titolare dell'omologazione

Similasan AG, CH-8916 Jonen

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel settembre 2022 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

