

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo prima di fare uso del medicamento. Questo medicamento le è stato prescritto personalmente e quindi non deve essere consegnato ad altre persone, anche se i sintomi sono gli stessi. Il medicamento potrebbe nuocere alla loro salute.

Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

Diflucan[®], capsule rigide

Pfizer AG

Che cos'è Diflucan e quando si usa?

Diflucan è un antimicotico (medicamento contro le micosi) e contiene come principio attivo il fluconazolo, un composto triazolico.

Diflucan deve essere usato solo su prescrizione medica per il trattamento e la prevenzione di determinate infezioni micotiche.

Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?

Questo medicamento le è stato prescritto dal suo medico per il trattamento della malattia di cui soffre attualmente. Non deve essere usato per il trattamento di altre malattie o altre persone.

Diflucan non può essere usato contro tutti i funghi che provocano micosi. Per evitare lunghe complicazioni che possono essere causate dall'uso di un medicamento contro i funghi scelto in modo sbagliato o non correttamente dosato, deve utilizzare Diflucan (anche in caso di micosi future) esclusivamente come da prescrizione medica.

Quando non si può usare Diflucan?

Diflucan non deve essere usato

- se in occasione di precedenti trattamenti si sono verificate reazioni da ipersensibilità al fluconazolo, ad altri componenti di Diflucan o a preparati antimicotici azolici o triazolici affini (medicamenti contro i funghi);
- se assume amiodarone o chinidina (medicamenti per il trattamento dei disturbi del ritmo cardiaco);
- se assume eritromicina (antibiotico per il trattamento delle infezioni);
- se assume sertindolo (medicamento per il trattamento della schizofrenia).

Quando è richiesta prudenza nella somministrazione di Diflucan?

Informi il suo medico se sta facendo uso di medicinali con uno dei seguenti principi attivi, poiché potrebbero essere necessari particolari misure precauzionali e/o aggiustamenti della dose per garantire che questi medicinali o Diflucan abbiano l'effetto desiderato:

- Medicamenti contro il dolore e le infiammazioni, come ad es. celecoxib, flurbiprofene, ibuprofene, naproxene, lornoxicam, diclofenac, corticosteroidi (come ad es. prednisone), fentanil, ossicodone.
- Medicamenti contro l'emicrania (cosiddetti alcaloidi della segale cornuta), come ad es. diidroergotamina.
- Medicamenti per il trattamento dell'artrite reumatoide, come ad es. tofacitinib.
- Medicamenti per il trattamento della dermatite atopica, come ad es. abrocitinib.
- Medicamenti contro le infiammazioni della mucosa gastrica e l'iperacidità di stomaco (inibitori della pompa protonica), come ad es. omeprazolo, lansoprazolo, pantoprazolo.
- Medicamenti contro la pressione sanguigna elevata e le malattie cardiache, come ad es. i calcio-antagonisti (nifedipina, isradipina, amlodipina, felodipina), losartan, idroclorotiazide, ivabradina, ranolazina.
-



Medicamenti contro valori di colesterolo nel sangue elevati (ipocolesterolemizzanti) come ad es. simvastatina, atorvastatina, fluvastatina.

- Medicamenti per fluidificare il sangue (anticoagulanti, antiaggreganti piastrinici), come ad es. acenocumarolo, clopidogrel.
- Medicamenti contro il diabete (antidiabetici), come ad es. le sulfoniluree (glibenclamide, gliclazide, glimepiride).
- Medicamenti contro la depressione, come ad es. amitriptilina, nortriptilina, citalopram.
- Medicamenti contro i disturbi del sonno, come ad es. le benzodiazepine (midazolam, triazolam), zopiclone.
- Medicamenti per il trattamento delle crisi convulsive, dell'epilessia, come ad es. carbamazepina, fenitoina, difenilidantoina, fenobarbital, valproato.
- Medicamenti contro l'asma, come ad es. teofillina.
- Medicamenti per il trattamento della fibrosi cistica, come ad es. ivacaftor.
- Medicamenti per il trattamento dell'ipertensione polmonare (cosiddetta ipertensione arteriosa polmonare), una specifica malattia dei vasi sanguigni polmonari, come ad es. bosentan.
- Medicamenti per il trattamento delle disfunzioni erettili, come ad es. sildenafil, tadalafil, vardenafil, avanafil.
- Medicamenti contro le infezioni micotiche, come ad es. amfotericina B, voriconazolo, isavuconazolo.
- Medicamenti usati nella terapia dell'HIV, come ad es. atazanavir, darunavir, tipranavir, zidovudina, nevirapina.
- Medicamenti contro la tubercolosi, come ad es. rifabutina, rifampicina.
- Medicamenti usati nella terapia antitumorale (medicamenti oncologici), come ad es. aprepitant, ciclofosfamide, bortezomib, enzalutamide, gefitinib, ibrutinib, mitotano, olaparib, venetoclax, vincristina, vinblastina.
- Medicamenti per il trattamento dei pazienti che hanno subito un trapianto, come ad es. ciclosporina, sirolimus, tacrolimus, everolimus.
- Medicamenti contro la dipendenza da eroina, come ad es. metadone.

Se nel corso del trattamento con Diflucan si manifestano sintomi come inappetenza, nausea, vomito, stanchezza, dolori alla pancia o urina di colore scuro, deve comunicarlo subito al suo medico. Poiché potrebbero manifestarsi problemi al fegato con decorso grave, è molto importante informare immediatamente il medico di questi sintomi.

Durante il trattamento, il suo medico controllerà periodicamente i valori epatici nel sangue.

Informi immediatamente il suo medico se dovessero comparire eruzioni cutanee. Potrebbe trattarsi di una reazione allergica al principio attivo di Diflucan. In casi rari si possono manifestare anche gravi infiammazioni della pelle e delle mucose, arrossamenti, formazione di ulcere/vescicole e desquamazione estesa della pelle, spesso accompagnata da febbre alta e sintomi simil-influenzali (sindrome di Stevens-Johnson, necrolisi epidermica tossica, sindrome DRESS).

Informi il suo medico se soffre di disturbi della funzionalità epatica o renale. Anche una glicemia non adeguatamente controllata, la pressione sanguigna elevata o l'assunzione di determinati medicinali possono influenzare la funzionalità dei suoi reni. Informi il suo medico così che possa eventualmente effettuare un aggiustamento della dose dei suoi medicinali.

Informi il medico se assume contraccettivi («la pillola»). Se assume contemporaneamente Diflucan e contraccettivi, la perdita da sospensione può comparire in ritardo.

Prima di iniziare la terapia è necessario escludere una gravidanza. Pertanto, se è in età fertile, durante la terapia e fino a 8 giorni dopo l'ultima assunzione deve utilizzare un metodo contraccettivo affidabile.

Se rimane incinta dopo l'assunzione di questo medicinale, contatti il suo medico.



Durante la terapia con Diflucan si sconsiglia di assumere estratti di erba di San Giovanni (*Hypericum perforatum*), prodotti fitoterapici che si impiegano in caso di umore depresso e sintomi depressivi, perché l'assunzione concomitante di estratti di erba di San Giovanni potrebbe causare la perdita dell'efficacia antimicotica di Diflucan.

Diflucan capsule rigide contiene lattosio. Se il medico le ha diagnosticato una intolleranza ad alcuni zuccheri, lo contatti prima di prendere Diflucan capsule rigide.

Diflucan capsule rigide contiene meno di 1 mmol (23 mg) di sodio per capsula rigida, cioè è essenzialmente «senza sodio».

Quando si guidano veicoli o si utilizzano macchine o attrezzi occorre tenere presente che occasionalmente possono manifestarsi vertigini o crisi convulsive.

Informi il suo medico o il suo farmacista, nel caso in cui:

- soffre di altre malattie,
- soffre di allergie o
- assume altri medicinali (anche acquistati di sua iniziativa).

Si può assumere Diflucan durante la gravidanza o l'allattamento?

L'uso di Diflucan durante la gravidanza deve essere evitato. Prima di iniziare la terapia è necessario escludere una gravidanza (per l'uso in donne in età fertile, cfr. «Quando è richiesta prudenza nella somministrazione di Diflucan?»).

Se è incinta o desidera una gravidanza può assumere Diflucan soltanto su esplicita prescrizione del medico.

Le madri che allattano non devono assumere Diflucan o devono assumerlo soltanto su esplicita prescrizione del medico.

Come usare Diflucan?

Poiché funghi diversi causano infezioni micotiche differenti che reagiscono in maniera diversa al trattamento, i piani terapeutici differiscono notevolmente l'uno dall'altro. Pertanto, segua sempre esattamente il piano terapeutico che le ha prescritto il suo medico.

La seguente tabella indica le dosi raccomandate del medicamento in diversi tipi di infezioni:

Adulti

Malattia	Dose
Trattamento delle infezioni micotiche della mucosa della bocca e della gola e delle infezioni gengivali	Il 1° giorno: 200-400 mg Giorni successivi: 100-200 mg una volta al giorno fino a quando il suo medico non interrompe il trattamento.
Trattamento delle infezioni micotiche dell'esofago	Il 1° giorno: 200-400 mg Giorni successivi: 100-200 mg una volta al giorno fino a quando il suo medico non interrompe il trattamento.
Trattamento delle infezioni micotiche interne provocate da <i>Candida</i>	Il 1° giorno: 800 mg Giorni successivi: 400 mg una volta al giorno fino a quando il suo medico non interrompe il trattamento.
Prevenzione di infezioni provocate da <i>Candida</i> in pazienti con immunodeficienza persistente	200-400 mg una volta al giorno finché persiste il rischio di infezione.



Prevenzione delle recidive di candidosi della mucosa	100-200 mg una volta al giorno o 200 mg tre volte a settimana.
Candidosi della cavità orale in portatori di dentiera	50 mg una volta al giorno per 14 giorni con disinfezione concomitante della dentiera.
Trattamento della micosi vaginale	150 mg una volta sola.
Riduzione delle recidive di micosi vaginale	150 mg ogni 3 giorni per un totale di 3 dosi (il giorno 1, 4 e 7), quindi 150 mg una volta a settimana per 6 mesi.
Trattamento della cosiddetta meningite da criptococco	Il 1° giorno: 400 mg Giorni successivi: 200-400 mg una volta al giorno fino a quando il suo medico non interrompe il trattamento.
Prevenzione delle recidive di meningite da criptococco	200 mg una volta al giorno fino a quando il suo medico non interrompe il trattamento.
Trattamento delle infezioni micotiche della pelle e delle unghie	50 mg una volta al giorno o 150 mg una volta a settimana per 2-4 settimane (in caso di micosi del piede, il trattamento può durare fino a 6 settimane).
Trattamento della <i>Tinea versicolor</i> (termine medico: pitiriasi versicolor)	300-400 mg una volta a settimana per 1-3 settimane o 50 mg una volta al giorno per 2-4 settimane.

Adolescenti a partire dai 12 anni di età

Utilizzi la dose prescritta dal suo medico (questa può essere la dose per gli adulti o la dose per i bambini).

Bambini

Le capsule rigide di Diflucan non sono adatte all'utilizzo nei bambini. Per i bambini devono essere impiegati altri preparati a base di fluconazolo nella forma appropriata (sospensione orale o soluzione per infusione).

La dose massima di mantenimento nei bambini è di 400 mg al giorno.

La posologia viene calcolata sulla base del peso corporeo del bambino (in chilogrammi) e la somministrazione avviene una volta al giorno:

Malattia	Dose
Infezioni micotiche interne da <i>Candida</i>	Il 1° giorno: 25 mg per kg di peso corporeo (ma non più di 800 mg) Giorni successivi: 12 mg per kg di peso corporeo (ma non più di 400 mg)
Candidosi della mucosa e infezioni della gola con <i>Candida</i>	Il 1° giorno: 6 mg per kg di peso corporeo Giorni successivi: 3 mg per kg di peso corporeo
Prevenzione delle infezioni da <i>Candida</i> in pazienti immunodepressi	3-12 mg per kg di peso corporeo.
Meningite da criptococco	6-12 mg per kg di peso corporeo.



Prevenzione delle recidive di meningite da criptococco	6 mg per kg di peso corporeo.
--	-------------------------------

Le capsule rigide devono essere ingerite intere. Può assumere le capsule rigide in occasione dei pasti o indipendentemente dai pasti.

Non modifichi di propria iniziativa la posologia prescritta. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico o al suo farmacista.

Quali effetti collaterali può avere Diflucan?

Con l'assunzione di Diflucan possono manifestarsi i seguenti effetti collaterali:

Comune (riguarda da 1 a 10 persone su 100)

Nausea, vomito, diarrea, dolori alla pancia, mal di testa, eruzione cutanea acuta (esantema).

Non comune (riguarda da 1 a 10 persone su 1'000)

Insonnia, sonnolenza, stanchezza, vertigini, disturbi sensoriali, disturbi del gusto, crisi convulsive, disturbi digestivi, meteorismo, bocca secca, ittero, prurito, orticaria, sudorazione aumentata, dolori muscolari, sensazione di malattia, mancanza di forze, febbre.

Raro (riguarda da 1 a 10 persone su 10'000)

Reazioni da ipersensibilità come arrossamenti della pelle, eruzione cutanea, prurito, formazione di vescicole, fiato corto e/o faccia gonfia, tremito (tremore), perdita di capelli.

Diverse infiammazioni gravi della pelle e delle mucose con arrossamento, formazione di vescicole ed esfoliazione o desquamazione della pelle, eventualmente accompagnate da febbre e sintomi simil-influenzali (come la cosiddetta necrolisi epidermica tossica, la dermatite esfoliativa e la sindrome di Stevens-Johnson) o rigonfiamenti arrossati con numerose piccole pustole (pustolosi esantematica acuta generalizzata).

Grave eruzione cutanea che può essere accompagnata da febbre, spossatezza, ingrossamento dei linfonodi e da effetti, tra gli altri, su fegato, reni o polmoni (sindrome DRESS).

Se si manifestano questi sintomi occorre informare immediatamente il medico.

Alterazioni della frequenza cardiaca o del ritmo cardiaco.

Sintomi di un disturbo della funzionalità epatica (stanchezza estrema inspiegabile, ingiallimento della pelle e degli occhi (ittero), urine scure, feci di colore chiaro, febbre, appetito ridotto, dolori alla pancia, nausea, vomito o perdita di peso).

Poiché un disturbo della funzionalità epatica potrebbe avere un decorso grave, se si manifestano sintomi di questo tipo, il suo medico deve essere immediatamente informato.

Se osserva effetti collaterali, si rivolga al suo medico o farmacista, soprattutto se si tratta di effetti collaterali non descritti in questo foglietto illustrativo.

Di che altro occorre tener conto?

Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con «EXP» sul contenitore.

Indicazioni per lo smaltimento

Non gettare i medicinali nell'acqua di scarico o nei rifiuti domestici. I medicinali scaduti o non più necessari, in uso nelle economie domestiche, possono essere consegnati nelle farmacie o nei punti di raccolta. Queste misure aiutano a proteggere l'ambiente.

Istruzioni di conservazione

Conservare a temperatura ambiente (15-25 °C), nella confezione originale e fuori dalla portata dei bambini.



Ulteriori indicazioni

Al termine del trattamento, riportare il medicamento con il contenuto residuo al medico o al farmacista affinché sia smaltito correttamente.

Il medico o il farmacista, che sono in possesso di un'informazione professionale dettagliata, possono darle ulteriori informazioni.

Cosa contiene Diflucan?

Principi attivi

1 capsula rigida da 50 mg contiene 50 mg di fluconazolo.

1 capsula rigida da 150 mg contiene 150 mg di fluconazolo.

1 capsula rigida da 200 mg contiene 200 mg di fluconazolo.

Sostanze ausiliarie

Capsula rigida da 50 mg: lattosio, amido di mais, silice colloidale anidra, sodio laurilsolfato, magnesio stearato, gelatina, titanio diossido (E 171), blu patentato V (E 131), gomma lacca, ossido di ferro nero (E 172).

Capsula rigida da 150 mg: lattosio, amido di mais, silice colloidale anidra, sodio laurilsolfato, magnesio stearato, gelatina, titanio diossido (E 171), blu patentato V (E 131), gomma lacca, ossido di ferro nero (E 172).

Capsula rigida da 200 mg: lattosio, amido di mais, silice colloidale anidra, sodio laurilsolfato, magnesio stearato, gelatina, titanio diossido (E 171), eritrosina (E 127), indigotina (E 132), gomma lacca, ossido di ferro nero (E 172).

Numero dell'omologazione

49503 (Swissmedic).

Dove è ottenibile Diflucan? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia, dietro presentazione della prescrizione medica.

Diflucan 50 mg: confezioni da 7 e 28 capsule rigide.

Diflucan 150 mg: confezioni da 1 e 4 capsule rigide.

Diflucan 200 mg: confezioni da 2 e 7 capsule rigide.

Titolare dell'omologazione

Pfizer AG, Zürich.

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel luglio 2026 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

PIL V021

