

Information destinée aux patients

Lisez attentivement cette notice d'emballage avant d'utiliser ce médicament. Ce médicament vous a été remis personnellement sur ordonnance médicale. Ne le remettez donc pas à d'autres personnes, même si elles semblent présenter les mêmes symptômes que vous. En effet, ce médicament pourrait nuire à leur santé.

Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

Akne-mycin® Solution pour application cutanée

Almirall AG

Qu'est-ce que l'Akne-mycin et quand doit-il être utilisé?

Akne-mycin Solution pour application cutanée contient comme principe actif l'antibiotique érythromycine.

Akne-mycin est utilisée sur prescription médicale pour le traitement externe des formes inflammatoires d'acné s'accompagnant de papules et de pustules (acné papulo-pustuleuse).

Le principe actif érythromycine pénètre dans les canaux sécréteurs des glandes sébacées et y déploie son action spécifique contre les bactéries responsables de l'apparition de l'acné. La base alcoolique renforce l'effet antibactérien de l'érythromycine et dissout par ailleurs le sébum qui est produit en excès lors d'acné.

Quand Akne-mycin ne doit-il pas être utilisé?

La préparation ne doit pas être utilisée en cas d'hypersensibilité à l'érythromycine ou à un autre constituant de la préparation.

Quelles sont les précautions à observer lors de l'utilisation d'Akne-mycin?

Akne-mycin Solution pour application cutanée ne doit pas pénétrer dans les yeux, ni entrer en contact avec les muqueuses (bouche, nez).

En outre, la prudence est de rigueur si vous prenez simultanément des antibiotiques. L'effet de ces antibiotiques et celui d'Akne-mycin peuvent s'entraver mutuellement.

L'utilisation simultanée de préparations exfoliantes (c'est-à-dire à effet desquamant) et d'Akne-mycin Solution pour application cutanée peut entraîner une apparition plus fréquente d'irritations de la peau.

Il faut éviter l'utilisation simultanée de produits cosmétiques car ils peuvent entraver l'effet d'Akne-mycin.

Ce médicament contient 925 mg d'alcool (éthanol) par gramme de solution (92,5% p/p). Cela peut provoquer une sensation de brûlure sur une peau endommagée.

Veuillez informer votre médecin ou votre pharmacien si vous souffrez d'une autre maladie, vous êtes allergique ou vous prenez ou utilisez déjà d'autres médicaments en usage interne ou externe (même en automédication!).

Akne-mycin peut-il être utilisé pendant la grossesse ou l'allaitement?

Si vous êtes enceinte, souhaitez l'être, ou si vous allaitez, vous devriez si possible renoncer à tout médicament et n'utiliser Akne-mycin que si cela est absolument nécessaire.

C'est le médecin qui décide d'une utilisation de ce produit pendant la grossesse ou l'allaitement. Veuillez informer votre médecin si vous êtes enceinte ou si vous souhaitez l'être.

Si votre médecin vous a prescrit l'utilisation d'Akne-mycin pendant l'allaitement, veillez à ce que la bouche du nourrisson n'entre pas en contact avec les zones de peau traitées.

Comment utiliser Akne-mycin?


Adultes et adolescents

Sauf prescription contraire, appliquer parcimonieusement Akne-mycin Solution pour application cutanée deux fois par jour sur les zones de peau atteintes après les avoir soigneusement nettoyées et séchées.



Avant de l'utiliser, il faut préparer le flacon d' Akne-mycin Solution pour application cutanée:

Avant chaque application, appuyez fermement une fois sur l'applicateur au moyen du capuchon de fermeture retourné. Cette manipulation débloque le mécanisme de sécurité et permet l'application de la solution Akne-mycin.



La durée du traitement par Akne-mycin ne doit pas dépasser 4 à 6 semaines.

Enfants

Akne-mycin ne doit pas être utilisée chez les enfants âgés de moins de 12 ans, car il n'existe pas de données sur la sécurité et l'efficacité dans ce groupe d'âge.

Ne changez pas de votre propre chef le dosage prescrit. Adressez-vous à votre médecin ou à votre pharmacien si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte.

Quels effets secondaires Akne-mycin peut-il provoquer?

L'utilisation d'Akne-mycin Solution pour application cutanée peut provoquer les effets secondaires suivants:

Occasionnel (concerne 1 à 10 utilisateurs sur 1000)

Desquamation, rougeur, sensation de brûlure et démangeaisons. La teneur en alcool du produit peut provoquer un dessèchement de la peau.

Très rare (concerne moins d'un utilisateur sur 10 000)

Dans de très rares cas, les symptômes mentionnés ci-dessus peuvent aussi être l'expression d'une réaction d'hypersensibilité (eczéma allergique de contact).

Si vous observez des altérations de la peau (telles qu'éruption cutanée, formation de cloques ou décollement de la peau), il pourrait s'agir de signes d'une réaction d'hypersensibilité. Dans ce cas, veuillez immédiatement contacter votre médecin.

En cas d'apparition de réactions d'hypersensibilité à l'un des composants de la préparation, le médicament ne doit plus être utilisé.

Si vous remarquez des effets secondaires, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien. Ceci vaut en particulier pour les effets secondaires non mentionnés dans cette notice d'emballage.

À quoi faut-il encore faire attention?

Stabilité

Ce médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention «EXP» sur le récipient.

Stabilité après ouverture

Une fois entamé, le produit doit être utilisé dans un délai de 6 mois.



Mention concernant l'élimination des médicaments

Ne jetez aucun médicament avec les eaux usées ou les ordures ménagères. Rapportez les médicaments périmés ou qui ne sont plus utilisés dans les ménages dans un point de remise (pharmacies, cabinets médicaux) ou un centre de collecte. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

Remarques concernant le stockage

Conserver à température ambiante (15-25°C).

Conserver hors de la portée des enfants.

Remarques complémentaires

Akne-mycin Solution pour application cutanée contient de l'alcool et est donc facilement inflammable. Tenir à l'écart de la chaleur et des flammes nues.

Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin ou votre pharmacien, qui disposent d'une information détaillée destinée aux professionnels.

Que contient Akne-mycin?

1 g de solution contient:

Principes actifs

érythromycine 20 mg.

Excipients

éthanol anhydre, phosphate de trilaureth-4, glycérol (E422), povidone K30.

Numéro d'autorisation

46084 (Swissmedic).

Où obtenez-vous Akne-mycin? Quels sont les emballages à disposition sur le marché?

En pharmacie, sur ordonnance médicale.

Solution pour application cutanée: flacons de 25 ml.

Titulaire de l'autorisation

Almirall AG, 8304 Wallisellen.

Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en janvier 2026 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).

ALM_PI_FR_20181030

