

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo prima di fare uso del medicamento. Questo medicamento le è stato prescritto personalmente e quindi non deve essere consegnato ad altre persone, anche se i sintomi sono gli stessi. Il medicamento potrebbe nuocere alla loro salute.

Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

Akne-mycin® Soluzione cutanea

Almirall AG

Che cos'è Akne-mycin e quando si usa?

Akne-mycin Soluzione cutanea contiene come principio attivo l'antibiotico eritromicina.

Akne-mycin viene impiegato su prescrizione medica per il trattamento esterno di forme infiammatorie dell'acne con papule (noduli) e pustole (vescicole purulente).

Il principio attivo eritromicina penetra nei condotti escretori delle ghiandole sebacee e vi svolge la sua azione specificamente contro i batteri importanti nella formazione dell'acne. La base alcolica contribuisce all'azione antibatterica dell'eritromicina e inoltre scioglie il sebo cutaneo che nell'acne è presente in eccesso.

Quando non si può usare Akne-mycin?

Il preparato non deve essere usato in caso di ipersensibilità all'eritromicina o a un altro componente del preparato.

Quando è richiesta prudenza nell'uso dell'Akne-mycin?

Akne-mycin Soluzione cutanea non deve venire in contatto con gli occhi né con le mucose (bocca, naso).

Occorre inoltre prudenza in caso di assunzione concomitante di antibiotici. Le azioni di questi medicinali e quelle di Akne-mycin possono ostacolarsi reciprocamente.

In caso di applicazione concomitante di preparati con azione desquamante e Akne-mycin Soluzione cutanea possono verificarsi più casi di irritazione cutanea.

L'applicazione concomitante di cosmetici va evitata, infatti l'azione di Akne-mycin ne può essere compromessa.

Questo medicinale contiene 925 mg di alcol (etanolo) per 1 g di soluzione (92,5% w/w). Può causare sensazione di bruciore sulla pelle danneggiata.

Informi il suo medico o il suo farmacista nel caso in cui soffre di altre malattie, soffre di allergie o assume o applica esternamente altri medicinali (anche se acquistati di sua iniziativa).

Si può usare Akne-mycin durante la gravidanza o l'allattamento?

Se è incinta, se sta programmando una gravidanza o se sta allattando per prudenza dovrebbe rinunciare nella misura del possibile ad assumere medicinali e usare Akne-mycin soltanto quando è assolutamente necessario.

Sull'uso di questo preparato in gravidanza o durante l'allattamento sarà il medico a decidere. Informi il medico se è incinta o se sta programmando una gravidanza.

Nel caso in cui l'uso di Akne-mycin le sia stato prescritto dal suo medico durante l'allattamento, si accerti che la bocca del lattante non venga a contatto con le parti cutanee trattate.

Come usare Akne-mycin?


Adulti ed adolescenti

Salvo diversa prescrizione medica, Akne-mycin Soluzione cutanea va applicato due volte al giorno con parsimonia sulle parti cutanee colpite, dopo averle lavate e asciugate a fondo.



Come preparare Akne-mycin Soluzione cutanea all'uso:

prima di ogni applicazione preme una sola volta energicamente con il cappuccio di chiusura rovesciato sull'applicatore. In questo modo, il dispositivo di sicurezza viene sbloccato e Akne-mycin Soluzione può essere applicato.



È consigliabile non protrarre la terapia con Akne-mycin oltre le 4-6 settimane.

Bambini

Poiché non sono disponibili dati sulla sicurezza e sull'efficacia in questa fascia di età, Akne-mycin non deve essere usato nei bambini di età inferiore ai 12 anni.

Non modifichi di propria iniziativa la posologia prescritta. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico o al suo farmacista.

Quali effetti collaterali può avere Akne-mycin?

Durante l'uso di Akne-mycin Soluzione cutanea possono comparire i seguenti effetti collaterali:

Non comune (riguarda da 1 a 10 persone su 1000)

Desquamazione, arrossamento, bruciore, e prurito alla cute.

A causa dell'alcool contenuto nel preparato si può verificare anche la disidratazione della cute.

Molto raro (riguarda meno di 1 persona su 10 000)

In casi molto rari le manifestazioni su menzionate possono essere anche l'espressione di una reazione di ipersensibilità (eczema da contatto allergico).

Se si dovessero presentare alterazioni della sua cute (come p.es. eruzione cutanea, formazione di bolle o distacco della cute), ciò potrebbe rappresentare un segno di una reazione di ipersensibilità. In questo caso, contatti immediatamente il suo medico.

Quando compaiono reazioni di ipersensibilità a un componente del preparato, questo medicamento non deve più essere usato.

Se osserva effetti collaterali si rivolga al suo medico o al suo farmacista, soprattutto se si tratta di effetti collaterali non descritti in questo foglietto illustrativo.

Di che altro occorre tener conto?

Stabilità

Il medicamento non deve essere utilizzato oltre la data indicata con «EXP» sul contenitore.

Stabilità dopo apertura



Dopo la prima apertura, il preparato deve essere consumato entro 6 mesi.

Indicazioni per lo smaltimento

Non gettare i medicinali nell'acqua di scarico o nei rifiuti domestici. Restituite i medicinali scaduti o non più necessari, in uso nelle economie domestiche, presso un punto di dispensazione (farmacie, studio medico) o nei punti di raccolta. Queste misure aiutano a proteggere l'ambiente.

Indicazioni particolari concernenti l'immagazzinamento

Conservare a temperatura ambiente (15-25°C).

Tener fuori dalla portata dei bambini.

Ulteriori informazioni

Akne-mycin soluzione cutanea contiene alcol ed è quindi facilmente infiammabile. Tenere lontano dal calore e dalle fiamme libere.

Il medico o il farmacista, che sono in possesso di un'informazione professionale dettagliata, possono darne ulteriori informazioni.

Cosa contiene Akne-mycin?

1 g di soluzione contiene:

Principi attivi

eritromicina 20 mg.

Sostanze ausiliarie:

etanolo anidro, trilaureth-4 fosfato, glicerolo (E422), povidone K30 (E1201).

Numero dell'omologazione

46084 (Swissmedic).

Dove è ottenibile Akne-mycin? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia, dietro presentazione della prescrizione medica.

Soluzione cutanea: flaconi da 25 ml.

Titolare dell'omologazione

Almirall AG, 8304 Wallisellen.

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel gennaio 2026 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

