

Information für Patientinnen und Patienten

Lesen Sie diese Packungsbeilage sorgfältig, bevor Sie das Arzneimittel einnehmen bzw. anwenden. Dieses Arzneimittel ist Ihnen persönlich verschrieben worden und Sie dürfen es nicht an andere Personen weitergeben. Auch wenn diese die gleichen Krankheitssymptome haben wie Sie, könnte ihnen das Arzneimittel schaden.

Bewahren Sie die Packungsbeilage auf, Sie wollen sie vielleicht später nochmals lesen.

Sanukehl Klebs D6, Injektionslösung (s.c.)

Homöopathisches Arzneimittel

Wann wird Sanukehl Klebs D6 angewendet?

Gemäss homöopathischem Arzneimittelbild kann Sanukehl Klebs D6 auf Verschreibung Ihres Arztes oder Ihrer Ärztin bei Sinusitis, Tracheitis und Bronchitis angewendet werden.

Die Anwendung dieses Arzneimittels im genannten Anwendungsgebiet beruht auf den Prinzipien einer homöopathischen Therapierichtung.

Was sollte dazu beachtet werden?

Wenn Ihnen Ihr Arzt oder Ihre Ärztin andere Arzneimittel verordnet hat, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker bzw. Ihre Ärztin oder Apothekerin, ob Sanukehl Klebs D6 gleichzeitig angewendet werden darf.

Wann darf Sanukehl Klebs D6 nicht oder nur mit Vorsicht angewendet werden?

Nicht anwenden bei:

- bekannter Überempfindlichkeit gegenüber Klebsiella-Arten oder *Klebsiella pneumoniae*
- Autoimmunerkrankungen
- Kindern unter 12 Jahren
- Schwangeren und Stillenden

Zur Anwendung von Sanukehl Klebs D6 bei Jugendlichen unter 18 Jahren liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Die Anwendung bei Jugendlichen unter 18 Jahren wird daher nicht empfohlen. Dieses Arzneimittel enthält weniger als 1 mmol Natrium (23 mg) pro Ampulle, d.h. es ist nahezu „natriumfrei“.

Immunsuppressiv wirkende Arzneimittel oder Therapien können die Wirksamkeit von Sanukehl Klebs D6 beeinträchtigen. Vor und nach der Behandlung mit oral verabreichten Lebendimpfstoffen ist ein Abstand von 4 Wochen einzuhalten.

Informieren Sie Ihren Arzt, Apotheker bzw. Ihre Ärztin, Apothekerin, wenn Sie

- an anderen Krankheiten leiden,
- Allergien haben oder
- andere Arzneimittel (auch selbst gekaufte!) einnehmen oder äusserlich anwenden!

Darf Sanukehl Klebs D6 während einer Schwangerschaft oder in der Stillzeit angewendet werden?

Sanukehl Klebs D6 darf während der Schwangerschaft und Stillzeit nicht angewendet werden.

Wie verwenden Sie Sanukehl Klebs D6?

Ändern Sie nicht von sich aus die verschriebene Dosierung. Wenn Sie glauben, das Arzneimittel wirke zu schwach oder zu stark, so sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker bzw. mit Ihrer Ärztin oder



Apothekerin.

Dosierung / Anwendung für Erwachsene: 1-3 mal wöchentlich 1 ml subkutan injizieren.

Die Anwendung und Sicherheit von Sanukehl Klebs D6 bei Jugendlichen unter 18 Jahren wurde bisher nicht geprüft. Die Anwendung bei Jugendlichen unter 18 Jahren wird daher nicht empfohlen. Nicht anwenden bei Kindern unter 12 Jahren.

Welche Nebenwirkungen kann Sanukehl Klebs D6 haben?

Bei Einnahme / Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich die Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). Bei andauernder Verschlechterung setzen Sie Sanukehl Klebs D6 ab und informieren Sie Ihren Arzt, Apotheker oder Ihre Ärztin, Apothekerin. Aufgrund des Gehaltes von Sanukehl Klebs D6 an spezifischen organischen Bestandteilen können in seltenen Fällen Überempfindlichkeitsreaktionen, hauptsächlich in Form von Hauteaktionen, auftreten. Das Auftreten einer Allergie gegen den Bestandteil *Klebsiella pneumoniae* kann nicht ausgeschlossen werden. Wenn Sie dennoch Nebenwirkungen beobachten, informieren Sie Ihren Arzt, Apotheker bzw. Ihre Ärztin, Apothekerin. Dies gilt insbesondere auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind.

Was ist ferner zu beachten?

Haltbarkeit

Das Arzneimittel darf nur bis zu dem auf dem Behälter mit "Verwendbar bis" bezeichneten Datum verwendet werden.

Entsorgungshinweis

Geben Sie abgelaufene oder nicht mehr benötigte Arzneimittel aus Haushalten an einer Abgabestelle (z.B. Apotheke, Drogerie, Arztpraxis) oder an einer Sammelstelle zurück.

Lagerungshinweis

Bei Raumtemperatur (15-25°C) lagern.
Ausser Reichweite von Kindern aufbewahren.

Weitere Hinweise

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen Ihr Arzt, Apotheker bzw. Ihre Ärztin, Apothekerin.

Was ist in Sanukehl Klebs D6 enthalten?

1 Ampulle zu 1 ml Flüssigkeit enthält:

Wirkstoffe

Klebsiella pneumoniae extractum cellulae (lyophil., steril.) D6 aquos (HAB 5b) 1 ml

Hilfsstoffe

Natriumchlorid (entsprechend 3.54 mg Natrium), Wasser für Injektionszwecke

Zulassungsnummer

53063 (Swissmedic)

Wo erhalten Sie Sanukehl Klebs D6? Welche Packungen sind erhältlich?



In Apotheken nur gegen ärztliche Verschreibung.

Packungen zu 1, 10 und 50 Ampullen.

Zulassungsinhaberin

ebi-pharm ag, Lindachstr. 8c, 3038 Kirchlindach

Herstellerin

SANUM-Kehlbeck GmbH & Co. KG, Postfach 1355, D-27316 Hoya

Diese Packungsbeilage wurde im Januar 2026 letztmals durch die Arzneimittelbehörde (Swissmedic) geprüft.

