

Information destinée aux patients

Lisez attentivement cette notice d'emballage avant d'utiliser ce médicament.

Ce médicament vous a été remis personnellement sur ordonnance médicale. Ne le remettez donc pas à d'autres personnes, même si elles semblent présenter les mêmes symptômes que vous. En effet, ce médicament pourrait nuire à leur santé.

Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

Cutivate

GlaxoSmithKline AG

Qu'est-ce que Cutivate et quand doit-il être utilisé?

Cutivate, pommade contient comme principe actif un corticostéroïde très puissant à usage local.

Il est utilisé chez l'adulte et l'enfant à partir de 3 mois dans le traitement du psoriasis et des eczémas. L'application de Cutivate procure un soulagement rapide des symptômes associés à ces affections cutanées, tels que démangeaisons, sensations de brûlure ou rougeurs. Cutivate, pommade peut être utilisé chez l'enfant à partir de 3 ans dans la prévention des rechutes de l'eczéma dit atopique (dermatite atopique), après un traitement efficace de la phase aiguë.

Cutivate ne doit être utilisé que sur prescription du médecin.

Quand Cutivate ne doit-il pas être utilisé?

Cutivate ne doit pas être utilisé en cas d'hypersensibilité au principe actif, le propionate de fluticasone, ou à l'un des excipients de la pommade ainsi qu'en cas d'affections cutanées dues à une infection virale (p.ex. boutons de fièvre, zona ou varicelle), d'infection bactérienne (y compris la tuberculose cutanée), de démangeaisons sans inflammation, de rosacée, d'inflammations dans la région de la bouche, de l'anus ou des organes génitaux ainsi qu'en présence d'infections dues à des champignons (mycoses) et de réactions vaccinales.

Cutivate ne doit pas non plus être appliqué sur des plaies ouvertes ou des inflammations purulentes telles que furoncles, abcès ou acné.

Quelles sont les précautions à observer lors de l'utilisation de Cutivate?

Cutivate est un médicament très puissant. Ne dépassez pas la durée de traitement prescrite par votre médecin (normalement de 2-4 semaines); car sinon des lésions cutanées peuvent s'installer.

Si, au bout de quelques jours, l'affection de la peau ne répond pas au traitement voire s'aggrave, consultez votre médecin. Informez-le également en cas d'apparition de démangeaisons et de rougeurs, de vésicules, d'un amincissement important de la peau ou de blessures.

Si vos troubles réapparaissent peu après l'arrêt du traitement dans les 2 semaines, ne réutilisez pas la pommade sans avoir consulté votre médecin au préalable, sauf si votre médecin vous a donné des instructions en ce sens. Si vos troubles réapparaissent après avoir disparu, demandez un avis médical avant de renouveler le traitement si les rougeurs s'étendent au-delà de la zone initialement traitée et si la peau brûle.

Ce médicament ne doit pas être utilisé quotidiennement plus de 4 semaines en continu.

Si vous êtes hypersensible au principe actif fluticasone ou à un autre composant du médicament, vous devez en informer votre médecin.

Cutivate, pommade contient 50 mg de propylène glycol par gramme de pommade. Le propylène glycol peut causer une irritation cutanée.

Les corticostéroïdes peuvent masquer les symptômes d'une réaction cutanée allergique à l'un des composants du produit.

Des applications sur une grande surface (plus de 10% de la surface corporelle) de même qu'une application sur des régions cutanées où le principe actif est absorbé en plus grande quantité (plaies



ouvertes, lésions cutanées, plis cutanés ou articulaires, espaces entre les doigts et les orteils, zones limites entre la peau et les muqueuses et pourtour des yeux) doivent être évitées.

Ne couvrez pas ce médicament d'un pansement occlusif, sauf si votre médecin vous a dit de le faire. Si vous utilisez Cutivate sous un pansement occlusif, vous devez veiller à nettoyer la peau avant l'application d'un nouveau pansement afin d'éviter une infection.

Informez votre médecin si vous présentez une vision floue ou des troubles visuels. Il décidera s'il doit vous adresser à un ophtalmologue afin de déterminer les causes possibles (y compris cataracte, glaucome ou autres affections rares) de vos troubles visuels.

Dans le cas d'un eczéma situé près d'un ulcère de la jambe, l'utilisation d'un corticostéroïde topique peut accroître le risque de réaction allergique ou d'infection dans la zone de l'ulcère.

Contactez votre médecin si vous développez une infection.

Comme pour tous les corticostéroïdes, il faut éviter une application prolongée sur la peau particulièrement sensible du visage et dans la région génitale.

Cutivate ne doit pas entrer en contact avec les yeux. Si, à titre exceptionnel, une application sur les paupières a été prescrite par le médecin, il faut particulièrement veiller à ce que le produit n'entre pas en contact avec les yeux.

Chez l'enfant, l'enfant en bas âge et le nourrisson, Cutivate doit être utilisé avec précaution et ne doit pas être appliqué sur de grandes surfaces ou en traitement prolongé.

N'utilisez Cutivate que pour l'affection de la peau dont vous souffrez actuellement et pour laquelle votre médecin vous l'a prescrit, et non pour des affections cutanées ultérieures. Ne remettez pas Cutivate à d'autres personnes.

Cutivate, pommade contient de la paraffine. Les tissus (vêtements, literie, pansements et bandages, etc.) qui sont entrés en contact avec des médicaments contenant de la paraffine sont plus facilement inflammables et présentent donc un risque d'incendie et de brûlures sévères. Pendant l'utilisation de Cutivate, pommade, vous ne devez donc pas fumer ni vous approcher de flammes nues. Le lavage des vêtements et de la literie ne permet pas d'éliminer complètement la paraffine.

Veuillez informer votre médecin ou votre pharmacien si

- vous souffrez d'une autre maladie,
- vous êtes allergique ou
- vous prenez déjà d'autres médicaments ou utilisez déjà d'autres médicaments en usage externe (même en automédication!).

Cutivate peut-il être utilisé pendant la grossesse ou l'allaitement?

Bien que l'on n'ait encore jamais observé d'effets nocifs sur le fœtus lors de l'utilisation de Cutivate pendant la grossesse, l'expérimentation animale a révélé un risque de malformations fœtales lorsque le produit est utilisé à très fortes doses.

Si vous êtes enceinte ou envisagez une grossesse, vous devez utiliser Cutivate exclusivement après avoir consulté votre médecin. Il en va de même si vous allaitez.

Si vous utilisez toutefois Cutivate pendant l'allaitement, vous ne devez pas l'appliquer dans la zone des seins, afin d'éviter une ingestion accidentelle du médicament par l'enfant.

Comment utiliser Cutivate?

Traitement des affections de la peau (eczémas et psoriasis):

Sauf prescription contraire du médecin, Cutivate, pommade est appliqué en couche mince sur les régions cutanées atteintes, 2× par jour en cas de psoriasis et 1-2× par jour lors d'eczémas.

Lavez-vous les mains après l'application, sauf si vous traitez vos mains.

Si vous utilisez également un produit de soins (crème hydratante), laissez bien pénétrer Cutivate après chaque application avant d'utiliser le produit de soins. Par rapport à un adulte, le rapport entre la surface



corporelle et le poids corporel est plus élevé chez l'enfant, l'enfant en bas âge et le nourrisson. Il s'ensuit que chez l'enfant, l'enfant en bas âge et le nourrisson, une quantité plus importante de principe actif risque d'être absorbée par l'organisme et d'atteindre la circulation sanguine; ce qui peut augmenter les effets secondaires. Il convient donc d'appliquer la quantité la plus faible possible de Cutivate. La durée de traitement est en général de 2 à 4 semaines. Cutivate ne doit pas être utilisé chez le nourrisson de moins de 3 mois.

Prévention des rechutes d'eczéma atopique:

Appliquez Cutivate, pommade 2× par semaine en couche mince sur les zones de peau guéries ou les endroits sur lesquels l'affection de la peau risque de réapparaître. Utilisez en outre un produit de soins en application quotidienne. Il convient de procéder à un contrôle médical périodique.

Pour la prévention des rechutes d'eczéma atopique, la pommade ne doit pas être utilisée chez l'enfant de moins de trois ans.

Si vous avez oublié une application de Cutivate, rattrapez votre oubli dès que vous vous en apercevez, puis poursuivez le traitement comme d'habitude. N'appliquez pas une quantité supplémentaire si vous avez oublié l'application précédente.

Ne changez pas de votre propre chef le dosage et la durée du traitement prescrits par votre médecin. Adressez-vous à votre médecin ou à votre pharmacien si vous pensez que l'efficacité de votre médicament est trop faible ou au contraire trop forte.

Quels effets secondaires Cutivate peut-il provoquer?

L'utilisation de Cutivate peut provoquer les effets secondaires suivants:

Fréquent (concerne 1 à 10 utilisateurs sur 100):

- Démangeaisons.

Occasionnel (concerne 1 à 10 utilisateurs sur 1000):

- Vision floue,
- sensations de brûlures cutanées locales.

Très rare (concerne moins d'un utilisateur sur 10 000):

- Réactions allergiques à l'endroit de l'utilisation, aggravation ou réapparition de l'affection de la peau traitée, irritation cutanée, rougeur, sécheresse cutanée, saignements cutanés, infections, acné, éruption cutanée rouge avec inflammation (aussi sur le visage), urticaire,
- maladies oculaires, p.ex. glaucome ou cataracte,
- hypertension artérielle,
- ostéoporose,
- taux élevés de sucre dans le sang et les urines.

En cas de signes d'hypersensibilité (rougeur, gonflement, démangeaisons), interrompez immédiatement le traitement par Cutivate et prévenez votre médecin.

L'utilisation de Cutivate, pommade sur une longue période ou son utilisation sous un pansement occlusif ou dans les plis cutanés, peut provoquer les symptômes suivants:

Un amincissement de la peau, la formation de vergetures bleu-rougeâtre, une prise de poids/un excès de poids, un «faciès lunaire», une modification locale de la pigmentation cutanée, une augmentation de la pilosité et une dilatation de petits vaisseaux sanguins superficiels.

Les corticostéroïdes peuvent exercer une influence sur la production normale d'hormones dans l'organisme. La probabilité augmente en cas d'utilisation de doses élevées pendant des périodes prolongées.



Si vous souffrez de psoriasis, il est possible dans de très rares cas que des nodules saillants contenant du pus se forment sous la peau pendant ou après le traitement.

Fréquence inconnue (ne peut être estimée sur la base des données disponibles):

Réaction de sevrage après la fin du traitement par la pommade: après une utilisation continue sur une période prolongée, une réaction de sevrage peut se produire après la fin du traitement. Un ou plusieurs des symptômes suivants peuvent alors se manifester: rougeur de la peau pouvant s'étendre au-delà de la zone traitée, sensation de brûlure ou de picotements, fortes démangeaisons, peau qui pèle, petites vésicules ouvertes et suintantes.

Chez l'enfant, l'enfant en bas âge et le nourrisson, on tiendra compte du fait que le principe actif passe en plus grande quantité dans la circulation sanguine et peut donc provoquer, entre autres, des troubles de la croissance en cas d'application prolongée. Les couches peuvent de surcroît avoir l'effet d'un pansement occlusif.

Si vous remarquez des effets secondaires, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien. Ceci vaut en particulier pour les effets secondaires non mentionnés dans cette notice d'emballage.

À quoi faut-il encore faire attention?

Ce médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention «EXP» sur le récipient.

Mention concernant l'élimination des médicaments

Ne jetez aucun médicament avec les eaux usées ou les ordures ménagères. Les médicaments périmés ou qui ne sont plus utilisés dans les ménages peuvent être rapportés dans les pharmacies ou dans les centres de collecte. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

Remarques concernant le stockage

Ne pas conserver au-dessus de 30 °C. Conserver hors de la portée des enfants.

Remarques complémentaires

Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin ou votre pharmacien, qui disposent d'une information détaillée destinée aux professionnels.

Que contient Cutivate?

Principes actifs

Propionate de fluticasone 50 µg/g.

Excipients

Propylène glycol, sesquioléate de sorbitan, cire microcristalline, paraffine liquide.

Numéro d'autorisation

52381 (Swissmedic).

Où obtenez-vous Cutivate? Quels sont les emballages à disposition sur le marché?

En pharmacie, sur ordonnance médicale.

Cutivate pommade: 30 g.

Titulaire de l'autorisation

GlaxoSmithKline AG, 6340 Baar.

Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en mai 2025 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).

