

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo che contiene informazioni importanti.

Questo medicamento le è stato prescritto dal suo medico o le è stato consegnato senza prescrizione medica in farmacia o in drogheria. Faccia uso corretto del medicamento conformemente al foglietto illustrativo o segua le indicazioni del medico, del farmacista o del droghiere, al fine di ottenere il maggior beneficio.

Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

Paracétamol Sandoz® eco 500 mg, compresse

Sandoz Pharmaceuticals AG

Che cos'è Paracétamol Sandoz eco 500 mg e quando si usa?

Paracétamol Sandoz eco 500 mg contiene il principio attivo paracetamolo, che ha effetto analgesico e antipiretico.

Lo si usa per il trattamento di breve durata di mal di testa, mal di denti, dolori a livello delle articolazioni e dei legamenti, mal di schiena, dolori mestruali, dolori causati da traumi (p. es. di tipo sportivo), dolori in caso di malattie da raffreddamento e febbre e dolori artrosici.

Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?

Come tutti gli antipiretici e analgesici, anche il Paracétamol Sandoz eco non va assunto senza prescrizione medica per più di 5 giorni dagli adulti e bambini dai 12 anni o per più di 3 giorni dai bambini fino ai 12 anni. In caso di febbre Paracétamol Sandoz eco non va assunto per più di 3 giorni senza prescrizione medica.

Gli analgesici non vanno assunti regolarmente per un lungo periodo senza il controllo del medico. I dolori persistenti necessitano di un accertamento medico.

In caso di febbre alta, sintomi di infezione secondaria o sintomi persistenti per più di tre giorni si raccomanda di consultare il medico.

Non si deve superare la posologia indicata o prescritta dal medico.

Per prevenire il rischio di sovradosaggio è necessario assicurarsi che i medicinali assunti contemporaneamente (p. es. altri analgesici, antipiretici o medicinali contro il raffreddore) non contengano paracetamolo. Un sovradosaggio di paracetamolo può causare un grave danno epatico.

Occorre inoltre considerare che l'assunzione protratta nel tempo di antidolorifici può contribuire alla persistenza del mal di testa.

L'uso prolungato di analgesici, specialmente in caso di associazione di diversi principi attivi antidolorifici, può provocare delle lesioni permanenti ai reni con rischio di insufficienza renale.

Quando non si può assumere Paracétamol Sandoz eco 500 mg?

Paracétamol Sandoz eco 500 mg non va assunto nei seguenti casi:

- ipersensibilità al principio attivo paracetamolo e ad altre sostanze analoghe (p. es. proparacetamolo) o a una delle sostanze ausiliarie (vedi «Cosa contiene Paracétamol Sandoz eco 500 mg?»). Un'ipersensibilità di questo genere si manifesta per esempio sotto forma di asma, difficoltà di respirazione, disturbi circolatori, gonfiori a livello della pelle e delle mucose o eruzioni sulla pelle (orticaria).
- gravi malattie epatiche (p. es. epatite acuta, cirrosi epatica, ascite ovvero accumulo di liquido nella cavità peritoneale).
- abuso di alcol.
- disfunzione ereditaria del fegato (cosiddetta malattia di Meulengracht).

Quando è richiesta prudenza nella somministrazione di Paracétamol Sandoz eco 500 mg?



È necessario consultare il medico prima dell'assunzione:

- in presenza di lesioni ai reni o al fegato;
- in presenza di una rara malattia ereditaria dei globuli rossi, la cosiddetta «carezza di glucosio-6-fosfatodeidrogenasi»;
- in caso di uso concomitante di medicinali che influiscono sul fegato, in particolare certi farmaci contro la tubercolosi e l'epilessia o medicinali col principio attivo zidovudina utilizzati in caso di immunodeficienza (AIDS);
- in caso di assunzione dei seguenti medicinali:
 - medicinali anticoagulanti (p. es. Marcoumar);
 - Cholestyramin (medicamento che riduce i grassi nel sangue);
 - Chloramphenicol (medicamento contro le infezioni);
 - Metoclopramid (medicamento contro nausea e vomito);
 - Phenytoin, Phenobarbital, Carbamazepin (medicamento contro epilessia (convulsioni));
 - Rifampicin, Isoniazid (medicamento contro la tubercolosi);
 - Probenecid (medicamento contro la gotta);
 - Zidovudin (medicamento contro l'infezione HIV (AIDS)).
- in caso di infezione grave (p. es. sepsi);
- In caso di sottopeso o denutrizione;
- in caso di consumo regolare di alcol.

Si sconsiglia l'uso concomitante di paracetamolo e bevande alcoliche. Il rischio di danni epatici aumenta soprattutto se non si assumono degli alimenti insieme al medicamento.

Le persone ipersensibili agli analgesici o agli antireumatici possono avere una reazione di ipersensibilità anche al paracetamolo (vedi «Quali effetti collaterali può avere Paracétamol Sandoz eco 500 mg?»).

Questo medicamento contiene meno di 1 mmol (23 mg) di sodio per compressa, cioè essenzialmente «senza sodio».

In casi molto rari il paracetamolo può causare reazioni cutanee gravi (ad esempio Pustolosi Esantematica Generalizzata Acuta (AGEP), necrolisi epidermica tossica (TEN, sindrome di Lyell), sindrome di Stevens-Johnson (SSJ)). In caso di insorgenza di reazioni cutanee, interrompere l'assunzione di Paracétamol Sandoz eco 500 mg compresse e consultare il medico (vedi «Quali effetti collaterali può avere Paracétamol Sandoz eco 500 mg?»).

Paracétamol Sandoz eco 500 mg non agisce sulla capacità di guidare o di utilizzare macchinari.

Tuttavia, l'assunzione di un analgesico richiede sempre attenzione.

Informi il medico, il farmacista o il droghiere nel caso in cui

- soffre di altre malattie,
- soffre di allergie o
- assume altri medicinali (anche se acquistati di sua iniziativa!) o li applica esternamente.

Si può assumere Paracétamol Sandoz eco 500 mg durante la gravidanza o l'allattamento?

Per precauzione, durante la gravidanza o l'allattamento bisogna evitare il più possibile di utilizzare medicinali o chiedere consiglio al medico, al farmacista o al droghiere.

Se necessario, Paracétamol Sandoz eco 500 mg compresse può essere assunto in gravidanza. In base alle esperienze fatte finora, se si usa il principio attivo paracetamolo per brevi periodi di tempo e conformemente alla posologia indicate il rischio per il bambino viene attualmente considerato minimo.



Assuma la minima dose efficace per alleviare il dolore e/o la febbre e per il minor tempo possibile. Contatti il suo medico o farmacista se il dolore e/o la febbre non si riducono o se ha bisogno di prendere il medicamento più frequentemente.

Benché la somministrazione di paracetamolo è considerata compatibile con l'allattamento al seno, Paracétamol Sandoz eco 500 mg compresse nelle donne che allattano deve essere comunque usato con cautela poiché il paracetamolo passa nel latte materno.

Come usare Paracétamol Sandoz eco 500 mg?

Non deve essere superata la dose massima giornaliera. Le singole dosi non devono essere assunte a intervalli più frequenti di 4–8 ore. Non somministrare ai bambini sotto i 9 anni.

Adulti e bambini oltre i 40 kg (oltre i 12 anni): 1–2 compresse fino a 4 volte al giorno (massimo 8 compresse al giorno).

Bambini da 30–40 kg (9–12 anni): 1 compressa fino a 4 volte al giorno (massimo 4 compresse al giorno).

Assumere le compresse con ½ bicchiere di liquido.

Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal medico. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico, al suo farmacista o al suo droghiere.

In caso di assunzione incontrollata (sovradosaggio) consultare immediatamente il medico, anche in assenza di disturbi. A causa del rischio di un grave danno epatico, vanno intraprese immediate misure mediche. Nausea, vomito, mal di pancia, inappetenza o un quadro patologico generale possono essere indicativi di un sovradosaggio, ma si manifestano solo diverse ore (fino a un giorno) dopo l'assunzione.

Quali effetti collaterali può avere Paracétamol Sandoz eco 500 mg?

L'assunzione di Paracétamol Sandoz eco 500 mg compresse può determinare i seguenti effetti collaterali:

Raro (riguarda da 1 a 10 persone su 10'000)

Raramente reazioni di ipersensibilità come prurito, gonfiori della pelle e delle mucose o eruzioni cutanee anche gravi con arrossamento della pelle, vesciche, desquamazione e/o sintomi influenzali (molto rare), nausea, difficoltà di respirazione o asma. Se si manifestano dei sintomi di ipersensibilità o emorragie/ematomi è necessario interrompere l'assunzione del medicamento e consultare il medico. Sono state inoltre osservate alterazioni del quadro ematologico, come una forte riduzione di determinati globuli bianchi (agranulocitosi) o un numero ridotto di piastrine (trombocitopenia).

Se osserva effetti collaterali, si rivolga al suo medico, farmacista o droghiere soprattutto se si tratta di effetti collaterali non descritti in questo foglietto illustrativo

Di che altro occorre tener conto?

Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con «EXP» sul contenitore.

Conservare nella confezione originale, non al di sopra di 30°C e fuori dalla portata dei bambini.

Il paracetamolo può alterare la misurazione della glicemia mediante il metodo del glucosio ossidasi.

I medicinali con il principio attivo paracetamolo non devono essere somministrati ai bambini che abbiano assunto inavvertitamente alcol.

Il medico, il farmacista o il droghiere, che sono in possesso di documentazione specializzata e dettagliata, possono fornire ulteriori informazioni.

Cosa contiene Paracétamol Sandoz eco 500 mg?

Principi attivi

Paracetamolo.

Sostanze ausiliarie

Carbossimetilamido sodico (tipo A), amido pregelatinizzato, povidone K30, acido stearico, crospovidone, acqua depurata.



Numero dell'omologazione

68722 (Swissmedic)

Dove è ottenibile Paracétamol Sandoz eco 500 mg? Quali confezioni sono disponibili?

Nelle farmacie e nelle drogherie, senza prescrizione medica:

scatole da 20 compresse.

Nelle farmacie, dietro presentazione della prescrizione medica:

scatole da 100 compresse.

Titolare dell'omologazione

Sandoz Pharmaceuticals S.A., Risch; domicilio: Rotkreuz

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel febbraio 2025 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

