

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo prima di fare uso del medicamento.

Questo medicamento le è stato prescritto personalmente e quindi non deve essere consegnato ad altre persone, anche se i sintomi sono gli stessi. Il medicamento potrebbe nuocere alla loro salute.

Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

Felodipina Spirig HC retard[®], compresse a rilascio prolungato

Spirig HealthCare AG

Che cos'è Felodipina Spirig HC retard e quando si usa?

Su prescrizione e sotto il controllo permanente del medico

Il Felodipina Spirig HC retard contiene come principio attivo felodipina e serve per la terapia di tutte le forme d'ipertensione arteriosa e dell'angina pectoris (costrizione dolorosa al petto). La felodipina appartiene al gruppo degli antagonisti del calcio, medicinali che influiscono sui processi metabolici nelle cellule muscolari del cuore e dei vasi sanguigni. Rilassando la muscolatura vascolare e dilatando le arterie la pressione arteriosa troppo alta viene abbassata a un livello normale.

Quando non si può assumere Felodipina Spirig HC retard?

Il Felodipina Spirig HC retard non si deve prendere in caso di ipersensibilità conosciuta al principio attivo felodipina o ad una delle sostanze ausiliarie.

Felodipina Spirig HC retard non deve essere assunto:

- se ha avuto un ictus nel corso degli ultimi sei mesi,
- se ha uno shock cardiocircolatorio,
- se il flusso di sangue è ostacolato da un restringimento delle valvole cardiache,
- se soffre di una malattia del muscolo cardiaco che causa il restringimento della cavità del cuore,
- se accusa dolori al torace sia a riposo che in caso di lieve sforzo (angina pectoris instabile),
- se ha avuto un infarto cardiaco nelle ultime otto settimane,
- se nel cuore è presente un disturbo nella conduzione dell'eccitazione dagli atri ai ventricoli,
- se la funzionalità epatica è gravemente compromessa,
- se soffre di insufficienza cardiaca non stabilizzata da misure mediche,
- se usa determinati medicinali contro le infezioni da funghi (p.es. itraconazolo).

Quando è richiesta prudenza nell'uso di Felodipina Spirig HC retard?

L'effetto ipotensivo del Felodipina Spirig HC retard può essere potenziato da altri medicinali antiipertensivi.

In caso di assunzione concomitante, una serie di altri farmaci possono influire sull'effetto ipotensivo del Felodipina Spirig HC retard. Ne fanno parte per esempio certi medicinali destinati a curare un'eccessiva secrezione di acido nello stomaco, infezioni batteriche o virali, micosi, depressioni (ad es. anche l'iperico) e epilessia.

Come altri medicinali vasodilatatori, Felodipina Spirig HC retard può causare ipotensione con tachicardia (battito cardiaco accelerato). Poiché in alcuni pazienti ciò può condurre a una riduzione del flusso di sangue al muscolo cardiaco, si rivolga al medico per verificare se vi è un rischio elevato.

L'assunzione di Felodipina Spirig HC retard richiede prudenza se vi è predisposizione a una frequenza cardiaca accelerata.

L'uso di Felodipina Spirig HC retard richiede particolare prudenza nel caso in cui la funzionalità renale sia gravemente compromessa. Poiché la felodipina è metabolizzata nel fegato, si raccomanda prudenza anche



in caso d'insufficienza epatica.

Felodipina Spirig HC retard non deve essere assunto insieme a succo di pompelmo, poiché questo può potenziarne l'efficacia.

Questo medicamento può ridurre la capacità di reazione, la capacità di condurre un veicolo e la capacità di utilizzare attrezzi o macchine, specialmente all'inizio del trattamento e in caso d'interazione coll'alcool.

Questo medicamento contiene lattosio. Se il medico le ha diagnosticato una intolleranza ad alcuni zuccheri, lo contatti prima di prendere questo medicamento.

Informi il suo medico o il suo farmacista nel caso in cui

- soffra di altre malattie,
- soffra di allergie o
- assuma altri medicinali (anche acquistati di sua iniziativa).

Si può assumere Felodipina Spirig HC retard durante la gravidanza o l'allattamento?

Se è incinta o prevede una gravidanza ne parli col suo medico. Il Felodipina Spirig HC retard non si può prendere durante la gravidanza.

Il principio attivo passa nel latte materno. Spetta al medico decidere in merito all'uso del farmaco durante l'allattamento.

Come usare Felodipina Spirig HC retard?

Il medico stabilirà la posologia adatta al suo caso in base a controlli regolari della sua pressione arteriosa.

L'ipertensione arteriosa e l'angina pectoris devono essere curate a lunga scadenza e richiedono perciò dei controlli medici regolari.

Abitualmente si prende 1 compressa retard di Felodipina Spirig HC retard 5 mg risp. 10 mg al mattino a colazione.

Dato che i compresse retard Felodipina Spirig HC retard non si possono dividere, per un adeguamento ottimale della dose il medico può anche prescrivere i compresse retard Felodipina Spirig HC retard 2,5 mg.

I compresse si prendono senza masticarli, con una quantità sufficiente di liquido. Non si possono dividere e si devono deglutire interi. I compresse si possono prendere a digiuno o dopo una leggera colazione a contenuto ridotto di grassie di carboidrati.

L'uso e la sicurezza di Felodipina Spirig HC retard non sono ancora stati testati nei bambini e negli adolescenti.

Non modifichi di propria iniziativa la posologia prescritta. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico o al suo farmacista.

Quali effetti collaterali può avere Felodipina Spirig HC retard?

Con l'assunzione di Felodipina Spirig HC retard possono manifestarsi i seguenti effetti collaterali, (soprattutto all'inizio del trattamento oppure dopo un aumento della dose). Si tratta per lo più di disturbi passeggeri che si affievoliscono con il procedere della terapia.

Comune (riguarda da 1 a 10 utilizzatori su 100)

Mal di testa, ritenzione di liquidi nei tessuti, gonfiore alle caviglie

Non comune (riguarda da 1 a 10 utilizzatori su 1'000)

Vertigini, stanchezza, aumento della frequenza cardiaca, forte rallentamento della frequenza cardiaca, forte ipotensione, palpitazioni, nausea, dolore addominale, rossore al viso, prurito

Raro (riguarda da 1 a 10 utilizzatori su 10'000)

Battito cardiaco irregolare, vomito, orticaria, dolori muscolari e articolari, tremori muscolari, impotenza e disfunzione sessuale



Molto raro (riguarda meno di 1 utilizzatore su 10'000)

Reazioni di ipersensibilità, improvviso gonfiore della pelle/delle mucose, spesso al viso, aumentata sensibilità cutanea alla luce, irrequietezza, infarto cardiaco, problemi respiratori, diarrea, stitichezza, frequente emissione di piccole quantità di urina, desquamazione cutanea su ampie zone, ingrossamento della ghiandola mammaria nell'uomo, mestruazioni prolungate/intense, aumento di peso, sudorazione

In pazienti con marcate infiammazioni alle gengive si potrebbero verificare modificazioni alle gengive che però possono essere evitate o fatte regredire con una accurata igiene dentaria.

Se osserva effetti collaterali, si rivolga al suo medico o al suo farmacista, soprattutto se si tratta di effetti collaterali non descritti in questo foglietto illustrativo.

Di che altro occorre tener conto?

Stabilità

Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con «EXP» sul contenitore.

Istruzioni di conservazione

Conservare a temperatura ambiente (15–25 °C) nella confezione originale, e fuori della portata dei bambini.

Indicazioni per lo smaltimento

Non gettare i medicinali nell'acqua di scarico o nei rifiuti domestici. Restituite i medicinali scaduti o non più necessari, in uso nelle economie domestiche, presso un punto di dispensazione (farmacie, drogherie, studio medico) o nei punti di raccolta. Queste misure aiutano a proteggere l'ambiente.

Ulteriori indicazioni

Se è in possesso di medicinali scaduti li riporti in farmacia per l'eliminazione.

Il medico o il farmacista, che sono in possesso di documentazione professionale dettagliata, possono darne ulteriori informazioni.

Che cosa contiene il Felodipina Spirig HC retard?

Principi attivi

1 compresse a rilascio prolungato di Felodipina Spirig HC retard contiene come principio attivo 2,5 mg, risp. 5 mg, risp. 10 mg di felodipina.

Sostanze ausiliarie

Nucleo della compressa

Lattosio monoidrato, cellulosa microcristallina, ipromellosa, povidone K25, propilo gallato (E 310), silice colloidale anidra, magnesio stearato

Rivestimento

Ipromellosa, ossido di ferro giallo (E172), titanio diossido (E171), talco, glicole propilenico (E 1520), solo 5 mg e 10 mg: ossido di ferro rosso (E172)

Numero dell'omologazione

57902 (Swissmedic).

Dov'è ottenibile il Felodipina Spirig HC retard? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia dietro presentazione della prescrizione medica.

Le seguenti confezioni sono disponibili:

Felodipina Spirig HC retard 2,5 mg: confezioni da 30 compresse a rilascio prolungato.

Felodipina Spirig HC retard 5 mg risp. 10 mg: confezioni da 20 e 100 compresse a rilascio prolungato.



Titolare dell'omologazione

Spirig HealthCare SA, 4622 Egerkingen

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel febbraio 2024 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

