

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo prima di fare uso del medicamento. Questo medicamento le è stato prescritto personalmente e quindi non deve essere consegnato ad altre persone, anche se i sintomi sono gli stessi. Il medicamento potrebbe nuocere alla loro salute. Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

Evrysdi® Polvere per soluzione orale

Roche Pharma (Schweiz) AG

Che cos'è Evrysdi e quando si usa?

Evrysdi contiene il principio attivo risdiplam, un modificatore selettivo dello splicing del gene SMN2 (Survival of Motoneuron 2).

Evrysdi è un medicamento usato per il trattamento dell'atrofia muscolare spinale (SMA) nei bambini e nei pazienti adulti.

L'atrofia muscolare spinale è una malattia genetica che può essere presente sin dalla nascita, causata dalla carenza di una proteina chiamata SMN (survival of motor neuron, «fattore di sopravvivenza del motoneurone») nel corpo. La carenza della proteina SMN può causare una perdita di motoneuroni, con conseguente debolezza e deterioramento muscolari che possono compromettere attività fondamentali come il controllo della testa e del collo, lo stare seduti, il gattonare o il camminare. Anche i muscoli utilizzati per la respirazione e la deglutizione possono essere colpiti.

Evrysdi agisce aiutando il corpo a produrre una quantità maggiore di proteina SMN. In questo modo si ha una minore perdita di cellule nervose, che può portare ad un aumento della forza muscolare e a un miglioramento della funzionalità muscolare in pazienti di età diversa e con diverse forme di SMA.

Nei lattanti con SMA, Evrysdi può migliorare le probabilità di sopravvivenza, preservare la capacità di alimentarsi per bocca, aumentare la probabilità di raggiungere importanti fasi dello sviluppo motorio, le cosiddette tappe motorie, e ridurre la necessità di ventilazione artificiale. Nei bambini (dall'infanzia all'adolescenza) e negli adulti, Evrysdi può mantenere o migliorare nel tempo la funzionalità motoria.

Su prescrizione medica.

Quando non si può assumere Evrysdi?

Non prenda Evrysdi se è allergico a risdiplam o a una delle sostanze ausiliarie di Evrysdi.

Quando è richiesta prudenza nella somministrazione/nell'uso di Evrysdi?

Prima di assumere Evrysdi, informi il medico, il farmacista o l'operatore sanitario di tutte le patologie di cui soffre.

Se lei è una donna, informi il medico se

- è incinta o pianifica una gravidanza.
- sta allattando al seno o prevede di farlo.

Se lei è un uomo, informi il medico se intende donare sperma o concepire.

Il trattamento con Evrysdi può danneggiare il feto o compromettere la fertilità maschile. Troverà informazioni dettagliate in proposito nella rubrica «Si può assumere/usare Evrysdi durante la gravidanza o l'allattamento?»

Eviti il contatto della pelle con la soluzione orale. Se il medicamento dovesse finire sulla pelle, pulisca la zona con acqua e sapone.

Gli effetti di Evrysdi sulla capacità di guidare veicoli o utilizzare macchinari non sono stati specificamente studiati.

Questo medicamento contiene isomaltitolo. I pazienti affetti da rari problemi ereditari di intolleranza al fruttosio non devono assumere questo medicamento.



Questo medicamento contiene meno di 1 mmol (23 mg) di sodio per dose, cioè essenzialmente «senza sodio».

Questo medicamento contiene 0,38 mg di sodio benzoato per 1 ml. Il benzoato può aumentare l'ittero (ingiallimento della pelle e degli occhi) nei neonati fino a 4 settimane di età.

Informi il suo medico o il suo farmacista nel caso in cui

- soffre di altre malattie,
- soffre di allergie o
- assume altri medicinali (anche acquistati di sua iniziativa!) o li applica esternamente.

Si può assumere/usare Evrysdi durante la gravidanza o l'allattamento?

Le donne che assumono Evrysdi devono evitare una gravidanza nei seguenti periodi:

- durante il trattamento con Evrysdi e
- per un mese dopo la fine del trattamento con Evrysdi.

Parli con il suo medico dei metodi contraccettivi affidabili che lei e il suo partner dovrete adottare durante il trattamento e nel mese successivo all'interruzione del trattamento.

Se la loro partner è in età fertile, gli uomini che assumono Evrysdi devono evitare una gravidanza nei seguenti periodi:

- durante il trattamento con Evrysdi e
- al meno nei 4 mesi successivi alla fine del trattamento con Evrysdi.

Parli con il suo medico dei metodi contraccettivi affidabili che lei e la sua partner dovrete adottare durante il trattamento e almeno nei 4 mesi successivi.

Evrysdi può compromettere la fertilità maschile.

Durante il trattamento e per i 4 mesi successivi all'ultima dose di Evrysdi gli uomini devono astenersi dalla donazione di sperma.

Gravidanza

- Evrysdi potrebbe danneggiare il feto. Se è incinta o sospetta di essere incinta o se ha intenzione di rimanere incinta, chiedi consiglio al suo medico prima di assumere questo medicamento. Il medico valuterà il beneficio che lei può trarre dall'assunzione di Evrysdi contro il rischio per il suo bambino.
- Se lei è in età fertile, prima di iniziare il trattamento con Evrysdi, il medico le effettuerà di sottoporsi a un test di gravidanza.
- Se rimane incinta durante il trattamento con Evrysdi, informi immediatamente il medico. Deciderà insieme al suo medico cosa è meglio per lei e per il feto.

Allattamento

Lei non deve allattare al seno durante il trattamento con questo medicamento. Questo perché Evrysdi può passare nel latte materno e avere quindi effetti dannosi sul bambino.

Discuta con il medico della possibilità di interrompere l'allattamento al seno o l'assunzione di Evrysdi.

Per domande sulla pianificazione familiare si rivolga al suo medico.

Come usare Evrysdi?

Prima della dispensazione, la soluzione orale di Evrysdi deve essere ricostituita da un operatore sanitario, ad es. un medico o farmacista, a partire dalla polvere. Lei deve ricevere Evrysdi sotto forma di soluzione orale. Se il medicamento contenuto nel flacone è in polvere, non lo usi, ma contatti il medico o il farmacista chiedendo che venga sostituito.

Come si assume Evrysdi?



Assuma questo medicamento seguendo sempre esattamente le indicazioni del medico o del farmacista. Se ha dubbi, consulti il medico o il farmacista.

La soluzione orale di Evrysdi può essere somministrata per bocca o attraverso un sondino per alimentazione.

Prima dell'assunzione/della somministrazione della prima dose, uno specialista deve illustrarle le precise modalità di preparazione e assunzione/somministrazione della dose giornaliera.

Le «Istruzioni per l'uso» sono contenute in un libricino separato all'interno della scatola. Le legga con attenzione e segua le indicazioni fornite per la preparazione della dose giornaliera e per l'assunzione o la somministrazione di Evrysdi.

Per la somministrazione orale utilizzi le siringhe riutilizzabili incluse

È importante che lei utilizzi le siringhe riutilizzabili contenute nella confezione per misurare e assumere/somministrare rispettivamente la sua dose di Evrysdi o quella del suo bambino.

Quando si assume Evrysdi?

Prenda/somministri Evrysdi una volta al giorno con o senza un pasto.

Evrysdi deve essere assunto/somministrato ogni giorno all'incirca alla stessa ora. Questo la aiuterà a ricordare quando assumere/somministrare il medicamento.

Posologia:

- *Adolescenti e adulti:*
La dose giornaliera di Evrysdi è di 5 mg (6,6 ml della soluzione orale da 0,75 mg/ml o una compressa rivestita con film).
- *Lattanti e bambini:*
Il medico determinerà la dose giornaliera di Evrysdi in base all'età e al peso del bambino. Per i lattanti di età inferiore ai 16 giorni sono disponibili solo dati limitati ottenuti dopo l'introduzione sul mercato.

La compressa rivestita con film di Evrysdi è disponibile a partire da una dose giornaliera prescritta di 5 mg (descrizione dell'assunzione in un'informazione destinata ai pazienti separata). Per una dose giornaliera calcolata inferiore a 5 mg è disponibile solo la polvere per soluzione orale.

La dose giornaliera deve essere assunta o somministrata secondo le istruzioni del medico. Non modifichi la dose senza prima aver consultato il medico.

Durata del trattamento?

Il medico le dirà per quanto tempo assumere o somministrare Evrysdi. Non interrompa il trattamento con Evrysdi a meno che non glielo abbia indicato il medico.

Se non ha ingerito l'intera dose di Evrysdi o se vomita dopo aver preso una dose

Se non ha ingerito l'intera dose di Evrysdi o se vomita dopo aver preso una dose, non prenda una dose extra. Assuma la dose successiva il giorno successivo alla solita ora.

Se prende più Evrysdi di quanto deve

Se prende più Evrysdi di quanto deve, si rivolga immediatamente al medico o si rechi in ospedale. Porti con sé la confezione del medicamento e questo foglietto illustrativo.

Se dimentica di prendere una dose di Evrysdi

- Se il tempo trascorso dall'assunzione abituale è entro le 6 ore, prenda la dose dimenticata non appena se ne ricorda.
- Se il tempo trascorso dall'assunzione abituale supera le 6 ore, salti la dose dimenticata e assuma la dose successiva alla solita ora il giorno seguente.



Non prenda una dose doppia per compensare la dose dimenticata.

Non modifichi di propria iniziativa la posologia prescritta. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico o al suo farmacista.

Quali effetti collaterali può avere Evrysdi?

Sono stati osservati i seguenti effetti collaterali:

Molto comune (riguarda più di una persona su 10)

- Diarrea
- Eruzione cutanea
- Febbre
- Mal di testa

Comune (riguarda da 1 a 10 persone su 100)

- Piaghe e afte in bocca
- Infezioni delle vie urinarie
- Dolori articolari
- Nausea

Non comune (riguarda da 1 a 10 persone su 1000)

- Battito cardiaco accelerato (tachicardia)

Frequenza non nota (non può essere definita sulla base dei dati disponibili)

- Infiammazione dei piccoli vasi sanguigni, che colpisce principalmente la pelle (vasculite cutanea)

Se osserva effetti collaterali, si rivolga al suo medico o farmacista, soprattutto se si tratta di effetti collaterali non descritti in questo foglietto illustrativo.

Di che altro occorre tener conto?

Stabilità

Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con «EXP» sul contenitore.

Termine di consumo dopo l'apertura

Dopo la ricostituzione da parte del medico o del farmacista, la soluzione orale può essere utilizzata per 64 giorni. Una volta trascorsa la data riportata sull'etichetta del flacone e sulla scatola nel campo «Soluzione orale pronta all'uso. **Non usare dopo**», dovrà riportare il flacone del medicamento (inclusa l'eventuale soluzione scaduta rimanente) al punto di consegna (medico o farmacista), affinché venga smaltito conformemente alle disposizioni.

Istruzioni di conservazione

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Polvere:

Conservare il contenitore nella scatola originale per proteggere il contenuto dalla luce e dall'umidità.

Non conservare al di sopra di 25 °C.

Soluzione orale pronta all'uso:

Conservare in frigorifero (2-8 °C).

Conservare il contenitore nella scatola originale per proteggere il contenuto dalla luce.



Istruzioni speciali per la conservazione:

Se necessario, la soluzione orale può essere conservata a temperatura ambiente (inferiore a 40 °C) per un periodo complessivo non superiore a 5 giorni.

Non conservare la soluzione orale a una temperatura superiore a 40 °C.

Tenga il flacone con la soluzione orale sempre in posizione verticale con il tappo ben chiuso.

Ulteriori indicazioni

Una volta prelevato dal flacone con la siringa orale riutilizzabile, il medicamento deve essere assunto/somministrato subito. Non conservare la soluzione di Evrysdi nella siringa.

Sciacqui la siringa dopo l'uso. Non getti via la siringa orale (cfr. anche le «Istruzioni per l'uso» fornite come libricino separato all'interno della scatola).

Il medico o il farmacista, che sono in possesso di un'informazione professionale dettagliata, possono darne ulteriori informazioni.

Cosa contiene Evrysdi?

Principi attivi

1 flacone contiene 2 g di polvere con 60 mg di risdiplam per la ricostituzione di 80 ml di soluzione orale.

1 ml di soluzione ricostituita pronta all'uso contiene 0,75 mg di risdiplam.

Sostanze ausiliarie

Mannitolo, isomalto (E953), acido tartarico, sodio benzoato (E211), macrogol 6000, sucralosio, acido ascorbico, disodio edetato, aroma di fragola con maltodestrina e ottenilsuccinato di amido e sodio (E1450).

Il volume della soluzione orale di colore da giallo a giallo verdastro, al gusto di fragola, ricostituita a partire dalla polvere dall'operatore sanitario, è di 80 ml.

Numero dell'omologazione

67251 (Swissmedic).

Dove è ottenibile Evrysdi? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia, dietro presentazione della prescrizione medica non rinnovabile.

1 flacone con polvere per la preparazione di 80 ml di soluzione orale (0,75 mg/ml di risdiplam).

Titolare dell'omologazione

Roche Pharma (Svizzera) SA, Basilea.

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel marzo 2026 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

Istruzioni per l'uso di Evrysdi Polvere per soluzione orale

Prima di iniziare

Prima di iniziare a usare Evrysdi, assicurarsi di leggere completamente e comprendere le seguenti istruzioni per l'uso, che contengono informazioni su come preparare e somministrare un volume della dose di Evrysdi con una siringa orale riutilizzabile per via orale o attraverso un sondino per gastrostomia (sondino PEG) o un sondino nasogastrico (sonda gastrica).

In caso di domande su come usare Evrysdi, consultare il medico o il farmacista.

Prima della dispensazione, la soluzione orale di Evrysdi deve essere ricostituita da un operatore sanitario, come un medico o un farmacista.

Evrysdi deve essere fornito sotto forma di liquido contenuto in un flacone. **Non** utilizzare il medicamento se il contenuto del flacone è in polvere; in tal caso consultare il medico o il farmacista.



Informazioni importanti su Evrysdi

Prima dell'assunzione/della somministrazione della prima dose, uno specialista deve illustrarle le precise modalità di preparazione e assunzione/somministrazione della dose giornaliera.

- Chiedere al medico o al farmacista di indicare quale misura di siringa usare per la somministrazione tra quelle contenute nella confezione e come misurare la dose giornaliera prescritta.
- Se le siringhe orali adatte per la somministrazione della sua dose sono state smarrite o danneggiate, informi il suo medico o il suo farmacista, che le diranno come continuare a prendere il medicamento.
- Utilizzare sempre solo la siringa riutilizzabile della misura corretta presente nella confezione per misurare la dose giornaliera prescritta.
- La misura corretta della siringa riutilizzabile è indicata anche nella sezione «Come selezionare la siringa orale riutilizzabile corretta per il volume della dose di Evrysdi prescritta». Consultare il medico o il farmacista in caso di dubbi su come scegliere la siringa corretta.
- Se l'adattatore per il flacone non è inserito nel flacone, **non** utilizzare Evrysdi e contattare il medico o il farmacista.
- **Non** usare Evrysdi dopo la data «Soluzione orale pronta all'uso. **Non usare dopo**» indicata sull'etichetta del flacone e sulla scatola. Se sull'etichetta del flacone e sulla scatola non è presente la data «Soluzione orale pronta all'uso. **Non usare dopo**», chiederla al medico o al farmacista.
- **Non** mescolare Evrysdi con alimenti o liquidi (ad es. latte o latte artificiale).
- **Non** usare Evrysdi se il flacone o la siringa orale sono danneggiati.
- **Evitare** il contatto di Evrysdi con la pelle. In caso di contatto, pulire la zona con acqua e sapone.
- In caso di rovesciamento di Evrysdi, asciugare la zona con un tovagliolo di carta asciutto e pulirla successivamente con acqua e sapone. Gettare il tovagliolo di carta nei rifiuti e lavare bene le mani con acqua e sapone.
- Se la quantità di Evrysdi rimasta nel flacone non è più sufficiente per ottenere la dose prescritta, restituire il flacone con il medicamento e le siringhe orali usate al punto di consegna (medico o farmacista), affinché vengano smaltiti conformemente alle disposizioni. Utilizzare un nuovo flacone di Evrysdi per prelevare la dose giornaliera prescritta. **Non mescolare** la soluzione di Evrysdi del nuovo flacone con quella del flacone in uso.

Non gettare i medicinali nell'acqua di scarico o nei rifiuti domestici. I medicinali scaduti o non più necessari, in uso nelle economie domestiche, possono essere consegnati nelle farmacie o nei punti di raccolta. Queste misure aiutano a proteggere l'ambiente.

Ogni confezione di Evrysdi contiene (v. figura A):

1. 1 flacone con adattatore per flacone e tappo
2. 1 siringa orale riutilizzabile da 12 ml (in sacchetto)
3. 2 siringhe orali riutilizzabili da 6 ml (in sacchetti)
4. 2 siringhe orali riutilizzabili da 1 ml (in sacchetti)
5. 1 istruzioni per la ricostituzione della soluzione per operatori sanitari (non mostrate)
- 6.




Figura A




1 informazione destinata ai pazienti (non mostrata)


7. 1 istruzioni per l'uso (non mostrate)

A) Preparazione e prelievo del volume corretto della dose


Come selezionare la siringa orale riutilizzabile corretta per il volume della dose di Evrysdi prescritta



- Se le è stata prescritta una dose giornaliera di Evrysdi compresa tra 0,3 e 1 ml, utilizzi una siringa da 1 ml (etichetta gialla).



- Se le è stata prescritta una dose giornaliera di Evrysdi compresa tra 1 e 6 ml, utilizzi una siringa da 6 ml (etichetta grigia).



- Se le è stata prescritta una dose giornaliera di Evrysdi pari o superiore a 6,2 ml, utilizzi una siringa da 12 ml (etichetta marrone).

Come preparare la dose giornaliera di Evrysdi




Figura B

Fase A1

Rimuovere il tappo spingendolo verso il basso e svitandolo verso sinistra (in senso antiorario) (v. figura B). Non gettare il tappo.






Figura C

Fase A2

Spingere lo stantuffo della siringa orale fino in fondo per eliminare l'aria dalla siringa (v. figura C).




Figura D

Fase A3

Tenendo il flacone in posizione verticale, inserire la punta della siringa nell'adattatore del flacone (v. figura D).




Figura E

Fase A4

Capovolgere con attenzione il flacone assicurandosi che la punta della siringa rimanga ben inserita nell'adattatore del flacone (v. figura E).




Figura F

Fase A5

Tirare lentamente lo stantuffo della siringa verso l'esterno per prelevare dal flacone il volume della dose giornaliera di Evrysdi prescritta. La parte superiore del tappo nero dello stantuffo deve essere allineata con il segno dei millilitri sulla siringa corrispondente al volume della dose giornaliera prescritta (v. figura F).

Dopo aver prelevato la dose corretta, **tenere lo stantuffo in posizione nella siringa per evitare che si muova.**






Figura G

Fase A6

Continuare a tenere fermo lo stantuffo per evitare che si muova nella siringa. Lasciare la siringa nell'adattatore del flacone e riportare il flacone in posizione verticale. Posizionare il flacone su una superficie piana. Rimuovere la siringa dall'adattatore tirandola delicatamente verso l'alto: durante l'estrazione, tenere la siringa dritta e non tirare direttamente dallo stantuffo (v. figura G).




Figura H

Fase A7

Tenere la siringa con la punta rivolta verso l'alto. Controllare visivamente il medicamento nella siringa. **Se** nella siringa sono presenti grosse bolle d'aria (v. figura H) **o se** è stato prelevato un volume della dose giornaliera di Evrysdi errato, reinserire saldamente la punta della siringa nell'adattatore del flacone. Spingere lo stantuffo completamente verso il basso in modo che tutto il medicamento fluisca nuovamente nel flacone e ripetere i passaggi da A4 a A7.

Assumere o somministrare la soluzione di Evrysdi immediatamente dopo averla prelevata nella siringa.

Se la soluzione non viene assunta o somministrata **entro 5 minuti**, svuotare la siringa e preparare una nuova dose.



Figura I

Fase A8

Lasciare l'adattatore sul flacone. Riposizionare il tappo sul flacone. Girare il tappo verso destra (in senso orario) per chiudere bene il flacone (v. figura I).

Se si sta assumendo la dose giornaliera di Evrysdi per via orale, seguire le istruzioni contenute nel paragrafo **«B) Come prendere un volume della dose giornaliera di Evrysdi per via orale»**.

Se si sta somministrando la dose giornaliera di Evrysdi attraverso un sondino per gastrostomia, seguire le istruzioni contenute nel paragrafo **«C) Come somministrare un volume della dose di Evrysdi attraverso un sondino per gastrostomia»**.

Se si sta somministrando la dose giornaliera di Evrysdi attraverso un sondino nasogastrico, seguire le istruzioni contenute nel paragrafo **«D) Come somministrare un volume della dose di Evrysdi**



attraverso un sondino nasogastrico».

Le siringhe per la somministrazione orale di Evrysdi sono state concepite appositamente per essere compatibili con il sistema ENFit®. Se il suo sondino per l'alimentazione non è compatibile con ENFit®, potrebbe essere necessario un connettore ENFit per collegare la siringa Evrysdi al sondino gastrostomico o nasogastrico.

B) Come prendere un volume della dose giornaliera di Evrysdi per via orale

Quando si assume la dose giornaliera di Evrysdi per via orale, si dovrebbe stare con il busto eretto (preferibilmente seduti).



Figura J

Fase B1

Posizionare la siringa orale in bocca **con la punta lungo la guancia**.

Spingere **lentamente** lo stantuffo fino in fondo per assumere o somministrare la dose completa di Evrysdi (v. figura J).

Somministrare Evrysdi direttamente in gola o troppo velocemente può causare conati di vomito.




Figura K

Fase B2

Verificare che nella siringa orale non siano rimasti residui di medicamento (v. figura K).



Figura L

Fase B3

Bere un po' d'acqua subito dopo aver assunto la dose prescritta di Evrysdi (v. figura L).

Vedere il punto E per le istruzioni su come pulire la siringa.

C) Come somministrare un volume della dose giornaliera di Evrysdi attraverso un sondino per gastrostomia



Se somministra Evrysdi attraverso un sondino per gastrostomia, chiedi al medico di mostrarti come controllare il sondino prima della somministrazione di Evrysdi.



Figura M

Fase C1

Inserire la punta della siringa orale nel sondino per gastrostomia. Spingere lentamente lo stantuffo fino in fondo per somministrare la dose completa di Evrysdi (v. figura M).




Figura N

Fase C2

Verificare che nella siringa orale non siano rimasti residui di medicamento (v. figura N).




Figura O

Fase C3


Sciacquare il sondino per gastrostomia con 10-20 ml di acqua subito dopo aver somministrato la dose prescritta di Evrysdi (v. figura O).

Vedere il punto E per le istruzioni su come pulire la siringa.


D) Come somministrare un volume della dose giornaliera di Evrysdi attraverso un sondino nasogastrico

Se somministra Evrysdi attraverso un sondino nasogastrico, chiedi al medico di mostrarti come controllare il sondino prima della somministrazione di Evrysdi.



 Figura P	Fase D1 Inserire la punta della siringa orale nel sondino nasogastrico. Premere lentamente lo stantuffo fino in fondo per somministrare la dose completa di Evrysdi (v. figura P).
 Figura Q	Fase D2 Verificare che nella siringa orale non siano rimasti residui di medicamento (v. figura Q).
 Figura R	Fase D3 Sciacquare il sondino nasogastrico con 10-20 ml di acqua subito dopo aver somministrato la dose prescritta di Evrysdi (v. figura R). Vedere il punto E per le istruzioni su come pulire la siringa.

E) Come pulire la siringa orale dopo l'uso

 Figura S	Fase E1 Estrarre completamente lo stantuffo (opponendosi alla resistenza) dalla siringa. Sciacquare bene il serbatoio della siringa sotto acqua corrente pulita (v. figura S).
---	--






Figura T

Fase E2

Sciacquare bene lo stantuffo sotto acqua corrente pulita (v. figura T).




Figura U

Fase E3

Verificare che il serbatoio e lo stantuffo della siringa siano puliti.

Posizionare il serbatoio e lo stantuffo della siringa su una superficie pulita in un luogo sicuro per l'asciugatura (v. figura U).

Lavarsi le mani.

Una volta asciutti, rimontare lo stantuffo nel serbatoio della siringa orale e conservare la siringa fino all'uso successivo.

