

Information destinée aux patients

Lisez attentivement cette notice d'emballage avant de prendre ou d'utiliser ce médicament. Ce médicament vous a été prescrit personnellement sur ordonnance médicale. Ne le remettez donc pas à d'autres personnes, même si elles semblent présenter les mêmes symptômes que vous. En effet, ce médicament pourrait nuire à leur santé.

Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

Ipocol® Divistyramine

Qu'est-ce que le Ipocol Divistyramine et quand doit-il être utilisé?

Ipocol Divistyramine (dénommé "Ipocol" dans le texte) est une poudre qui n'est pas absorbée par l'intestin. Administrée oralement elle permet de faire baisser le taux de cholestérol LDL (mauvais cholestérol) en trop forte concentration dans le sang. En suspension dans un liquide, le médicament est capable de fixer les acides biliaries. Ceux-ci sont éliminés dans les fèces.

Par voie de conséquence Ipocol peut prévenir les risques de certaines maladies coronariennes, ceci en association avec un régime diététique adéquat fidèlement respecté.

Ipocol est également utilisé dans d'autres indications telles les démangeaisons liées à des formes obstructives des voies biliaires; à des diarrhées dues à l'accumulation de sels biliaries (après certaines opérations, par ex.)

La préparation est disponible sous forme de sachets de poudre.

Selon prescription du médecin.

De quoi faut-il tenir compte en dehors du traitement?

Votre médecin peut vous prescrire un régime alimentaire pour soutenir le traitement avec Ipocol et pour prévenir une carence en vitamines (A, D, E et K) due au traitement. Dans ce cas observez le régime alimentaire prescrit!

Quand Ipocol ne doit-il pas être utilisé?

Ipocol ne doit pas être utilisé lors d'allergie à la substance active ou à l'un de ses composants.

Ipocol ne doit pas être utilisé si vous souffrez d'une insuffisance hépatique, en particulier lors d'une obstruction complète des voies biliaires.

Quelles sont les précautions à observer lors de la utilisation d'Ipocol?

Ce médicament peut affecter les réflexes, l'aptitude à la conduite et l'aptitude à utiliser des outils ou des machines. Il est primordial de respecter le régime qui vous a été prescrit à savoir un régime pauvre en corps gras et dérivés sucrés, riche en vitamines et fibres (fruits et légumes).

Le taux de cholestérol dans le sang est surveillé régulièrement par votre médecin.

Ipocol interagit avec pratiquement tous les médicaments. Il est donc important de maintenir un intervalle entre la prise d'Ipocol et les médicaments administrés en concomitance soit 1 h avant la prise d'Ipocol ou 4 h après. Si il est possible, une seule prise d'Ipocol par jour est donc vivement conseillée dans ces cas.

Ipocol peut provoquer de la constipation, dans ce cas adressez-vous à votre médecin.

Il est recommandé de prendre Ipocol avant les repas avec une quantité suffisante de liquide (au moins 2 dl).

Il faut toujours aviser votre médecin et/ou pharmacien consultant si vous êtes sous traitement avec Ipocol.

Ipocol contient 15 mg d'aspartame par sachet. L'aspartame contient une source de phénylalanine qui peut être dangereuse pour les personnes atteintes de phénylcétonurie (PCU), une maladie génétique rare caractérisée par l'accumulation de phénylalanine dans le sang.



phénylalanine ne pouvant être éliminée correctement.

Ipocol contient moins de 1 mmol (23 mg) de sodium par sachet, c.-à-d. qu'il est essentiellement «sans sodium».

Si votre médecin vous a informé(e) que vous avez une intolérance à certains sucres, contactez votre médecin avant de prendre ce médicament.

Veuillez informer votre médecin ou votre pharmacien

- si vous souffrez d'une autre maladie,
- vous êtes allergique,
- vous prenez déjà d'autres médicaments en usage interne ou externe (même en automédication!).

Ipocol peut-il être utilisé pendant la grossesse ou l'allaitement?

Informez votre médecin si vous êtes enceinte ou souhaitez le devenir et si vous allaitez car Ipocol ne sera prescrit à une femme enceinte ou durant l'allaitement uniquement que si le médecin le juge nécessaire.

Comment utiliser Ipocol?

Il appartient à votre médecin de fixer les doses à prendre dans votre cas particulier. La posologie usuelle est la suivante.

Adultes

Ipocol s'administre une à deux fois par jour, juste avant le repas. Le dosage moyen est de 6 g par jour soit 1 sachet double par jour.

Dans certains cas un dosage de 12 g par jour en deux prises (2× 1 sachet double), peut être nécessaire.

Enfants

Le dosage pour enfant au-dessus de 6 ans est de un demi à un sachet simple (3 g) en une ou deux prises journalières.

Remarques

En présence d'une hypercholestérolémie la thérapie minimale avec Ipocol se fait sur une durée de 3 mois au moins pour permettre à votre médecin d'apprécier d'une manière optimale les résultats obtenus et/ou à obtenir.

Dans le traitement des diarrhées, la thérapie sera de courte durée; au cas où, après 3 à 4 jours, la diarrhée devait persister, il y a lieu de consulter votre médecin sans attendre.

Préparation de la suspension

Verser le contenu du ou des sachets dans un verre contenant au moins 2 dl (grand verre) de liquide (jus de fruits par exemple). Le liquide froid ou tiède est préférable. Laisser gonfler quelque instant la poudre puis bien mélanger le contenu afin d'obtenir une suspension homogène. Avaler immédiatement sans laisser reposer.

Ne changez pas de votre propre chef le dosage prescrit. Adressez-vous à votre médecin ou à votre pharmacien si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte.

Quels effets secondaires Ipocol peut-il provoquer?

La prise d'Ipocol peut provoquer les effets secondaires suivants:

Ils sont essentiellement d'origine intestinale et occasionnels. Ce sont: les nausées, les vomissements, la constipation, la stéatorrhée (selles grasses), les météorismes (ballonnement) .

Si vous notez l'apparition de l'un ou l'autre de ces troubles, veuillez en informer votre médecin. Vous étant impossible de différencier certains de ces effets secondaires, il importe de respecter les dates fixées pour les examens de contrôle régulièrement effectués par votre médecin.

La constipation chronique peut s'accroître avec Ipocol . Dans ce cas c'est au médecin de décider si le traitement avec Ipocol est justifié ou non.



Si vous remarquez d'autres effets secondaires, veuillez en informer votre médecin, votre pharmacien. Ceci vaut en particulier pour les effets secondaires non mentionnés dans cette notice d'emballage.

A quoi faut-il encore faire attention?

Ce médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention «Exp.» sur le récipient.

Remarques concernant le stockage

Conserver le médicament dans l'emballage original à température ambiante (15–25°C) et hors de portée des enfants.

Que contient Ipocol ?

Poudre pour suspension buvable en sachet.

L'Ipocol se présente sous forme de 2 sachets simples soudés entre eux. Une perforation permet de les séparer.

Chaque sachet simple contient:

Principes actifs

3 g de résine polystyrolique anionique fortis (Divistyramine)

Excipients

Gomme arabique, acide citrique, arômes (citron) avec saccharose, aspartam (E 951), saccharine sodique (E 954).

Numéro d'autorisation

49632 (Swissmedic).

Où obtenez-vous Ipocol ? Quels sont les emballages à disposition sur le marché?

En pharmacie, sur ordonnance médicale.

Emballage de 30 sachets doubles soit 60 sachets simples.

Titulaire de l'autorisation

Lagap SA, 6943 VeZIA.

Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en **avril 2023** par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).

