

▼ Dieses Arzneimittel unterliegt einer zusätzlichen Überwachung. Dies ermöglicht eine schnelle Identifizierung neuer Erkenntnisse über die Sicherheit. Sie können dabei helfen, indem Sie Nebenwirkungen melden. Hinweise zur Meldung von Nebenwirkungen, siehe Ende Kapitel «Welche Nebenwirkungen kann Wegovy Multi FixDose haben?».

Information für Patientinnen und Patienten

Lesen Sie diese Packungsbeilage sorgfältig, bevor Sie das Arzneimittel anwenden. Dieses Arzneimittel ist Ihnen persönlich verschrieben worden und Sie dürfen es nicht an andere Personen weitergeben. Auch wenn diese die gleichen Krankheitssymptome haben wie Sie, könnte ihnen das Arzneimittel schaden.

Bewahren Sie die Packungsbeilage auf, Sie wollen sie vielleicht später nochmals lesen.

Wegovy® Multi FixDose

Novo Nordisk Pharma AG

Was ist Wegovy Multi FixDose und wann wird es angewendet?

Wegovy Multi FixDose ist ein Arzneimittel zur Gewichtsabnahme und Beibehaltung des Gewichts sowie zur Behandlung der metabolischen Dysfunktion-assoziierten Steatohepatitis (MASH) mit dem Wirkstoff Semaglutide. Es ähnelt einem natürlichen Hormon namens Glucagon-like peptide-1 (GLP-1), das nach einer Mahlzeit aus dem Darm freigesetzt wird. Wegovy Multi FixDose wirkt auf Rezeptoren im Gehirn, die Ihren Appetit zügeln. Dadurch fühlen Sie sich gesättigter und verspüren weniger Heisshunger. Dies trägt dazu bei, dass Sie weniger essen und an Gewicht abnehmen können. In der Leber wirkt es, indem es Leberschäden wie Fettansammlungen, Entzündungen und Narbenbildung reduziert.

Gewichtsregulierung

Wegovy Multi FixDose wird auf ärztliche Verschreibung zur Gewichtsabnahme und Beibehaltung des Gewichts zusätzlich zu Diät und körperlicher Aktivität bei Erwachsenen angewendet, bei einem:

- BMI von 30 kg/m² oder mehr (Fettleibigkeit) oder
- BMI von 27 kg/m² und unter 30 kg/m² (Übergewicht) und gewichtsbedingte Erkrankungen.

Der BMI (Body-Mass-Index oder Körpermassenindex) ist ein Messwert für das Verhältnis von Gewicht zur Körpergrösse.

Wegovy Multi FixDose wird zusammen mit einer Diät und körperlicher Aktivität zur Gewichtsregulierung bei Jugendlichen im Alter von 12 Jahren oder älter angewendet mit Fettleibigkeit (gemäss den dafür international akzeptierten Grenzwerten) und einem Körpergewicht über 60 kg.

Risikoreduktion schwerwiegender Herz-Kreislaufprobleme bei Erwachsenen

Wegovy wird eingesetzt, um das Risiko schwerwiegender Herz-Kreislaufprobleme (herzbedingter Tod, Herzinfarkt, Schlaganfall) bei Erwachsenen mit einer Vorgeschichte von Herz-Kreislaufkrankheiten (wie Herzinfarkt, Schlaganfall oder schlechter Durchblutung der Gliedmassen) und einem BMI ≥ 27 kg/m² zu reduzieren. Die Behandlung mit Wegovy erfolgt zusätzlich zu der bisherigen Behandlung Ihrer bestehenden Herz-Kreislauf-Erkrankung.

Behandlung der metabolischen Dysfunktion-assoziierten Steatohepatitis (MASH)

Wegovy Multi FixDose wird zur Behandlung von MASH bei Erwachsenen mit mittelschwerer bis fortgeschrittener Vernarbung (Fibrose) der Leber ohne Zirrhose eingesetzt.

Wann darf Wegovy Multi FixDose nicht angewendet werden?

Wenn Sie allergisch gegen Semaglutide oder einen der in Abschnitt «Was ist in Wegovy Multi FixDose enthalten?» genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind.

Wann ist bei der Anwendung von Wegovy Multi FixDose Vorsicht geboten?



Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker bzw. mit Ihrer Ärztin oder Apothekerin, bevor Sie Wegovy Multi FixDose anwenden.

Es gibt begrenzte Erfahrungen mit Wegovy Multi FixDose bei Patienten mit:

- MASH und BMI < 25 kg/m² (bzw. BMI < 23 kg/m² für die asiatische Bevölkerung).

Bitte fragen Sie Ihren Arzt bzw. Ihre Ärztin um Rat, wenn das Obige auf Sie zutrifft.

Patienten mit verzögerter Magenentleerung (Gastroparese)

Wenn Sie eine langsame (verzögerte) Magenentleerung (sog. Gastroparese) haben, kann die Anwendung von Wegovy Multi FixDose zu schwerwiegenden oder schweren gastrointestinalen Nebenwirkungen führen. Sprechen Sie vor der Anwendung von Wegovy Multi FixDose mit Ihrem Arzt oder Ihrer Ärztin.

Versehentliches Einatmen von Nahrung unter Narkose

Einige Patienten, die Medikamente wie Wegovy Multi FixDose angewendet hatten, hatten unter Vollnarkose oder tiefer Sedierung (tiefer Schlaf, der durch Medikamente verursacht wird) Probleme mit Nahrung oder Flüssigkeit, die aus ihrem Magen in ihre Lunge gelangte. Informieren Sie Ihr medizinisches Fachpersonal, dass Sie Wegovy Multi FixDose anwenden, bevor Sie sich einem Eingriff unterziehen, der eine Vollnarkose oder tiefe Sedierung erfordert.

Wirkungen auf das Verdauungssystem

Während der Behandlung mit Wegovy Multi FixDose kann es vorkommen, dass Ihnen schlecht wird, Sie sich erbrechen oder Durchfall bekommen. Diese Nebenwirkungen können zu Flüssigkeitsverlust (Dehydrierung) führen. Es ist wichtig, dass Sie viel trinken, um einer Dehydrierung vorzubeugen. Dies ist besonders wichtig, wenn Sie Nierenprobleme haben. Sprechen Sie mit Ihrem Arzt bzw. mit Ihrer Ärztin, wenn Sie diesbezüglich irgendwelche Fragen oder Bedenken haben.

Entzündung der Bauchspeicheldrüse

Es wurden Fälle von Bauchspeicheldrüsenentzündungen (Pankreatitis) bei Patienten, die Wegovy Multi FixDose anwenden, beobachtet. Eine Pankreatitis ist eine schwerwiegende, potenziell lebensbedrohende Krankheit. Informieren Sie Ihren Arzt bzw. Ihre Ärztin, falls Sie jemals unter einer Pankreatitis, Gallensteinen oder Alkoholismus litten oder sehr hohe Blutfett-Werte hatten. All dies kann Ihr Risiko, eine Pankreatitis zu bekommen oder wieder zu bekommen, erhöhen. Beenden Sie die Anwendung von Wegovy Multi FixDose und suchen Sie Ihren Arzt bzw. Ihre Ärztin auf, falls Sie starke und anhaltende Bauchschmerzen, mit oder ohne Erbrechen, bekommen, da dies ein Anzeichen für eine Bauchspeicheldrüsenentzündung (akute Pankreatitis) sein kann.

Schilddrüsenerkrankung

Sprechen Sie mit Ihrem Arzt bzw. Ihrer Ärztin bevor Sie Wegovy Multi FixDose anwenden, falls Sie eine Schilddrüsenerkrankung einschliesslich Knötchen und Vergrösserung der Schilddrüse haben.

Patienten mit Diabetes

Informieren Sie Ihren Arzt bzw. Ihre Ärztin, wenn Sie Diabetes haben. Ihr Arzt bzw. Ihre Ärztin passt eventuell die Dosis Ihrer Arzneimittel gegen Diabetes an, um Unterzuckerungen zu vermeiden.

Wenden Sie Wegovy Multi FixDose nicht als Ersatz für Insulin an.

Unterzuckerung (Hypoglykämie)

Die Einnahme eines Arzneimittels mit einem sogenannten Sulfonylharnstoff oder Anwendung eines Insulins zusammen mit Wegovy Multi FixDose könnte das Risiko einer Unterzuckerung (Hypoglykämie) erhöhen. Weitere Informationen über die Warnzeichen einer Unterzuckerung finden Sie in Abschnitt «Welche Nebenwirkungen kann Wegovy Multi FixDose haben?». Ihr Arzt bzw. Ihre Ärztin fordert Sie möglicherweise auf, Ihren Blutzuckerspiegel zu messen. Dies hilft Ihrem Arzt bzw. Ihrer Ärztin bei der Entscheidung, ob die Dosis des Sulfonylharnstoffs oder Insulins geändert werden muss, um das Risiko einer Unterzuckerung zu senken.



Diabetische Augenerkrankung (Retinopathie)

Schnelle Verbesserungen der Blutzuckereinstellung können zu einer vorübergehenden Verschlechterung einer diabetischen Augenerkrankung führen. Wenn Sie eine diabetische Augenerkrankung haben und während der Anwendung von Wegovy Multi FixDose Augenprobleme bekommen, sprechen Sie mit Ihrem Arzt bzw. mit Ihrer Ärztin.

Plötzliche Veränderungen Ihres Sehvermögens

Wenn Sie während der Behandlung mit diesem Arzneimittel einen plötzlichen Sehverlust oder eine rasche Verschlechterung des Sehvermögens bemerken, wenden Sie sich sofort an Ihren Arzt oder Ihre Ärztin. Dies kann durch eine sehr seltene Nebenwirkung verursacht werden, die als nichtarterielle anteriore ischämische Optikusneuropathie (NAION) bezeichnet wird (siehe unter «Welche Nebenwirkungen kann Wegovy Multi FixDose haben?»). Ihr Arzt oder Ihre Ärztin wird Sie zu einer Augenuntersuchung überweisen und Sie müssen möglicherweise die Behandlung mit diesem Arzneimittel abbrechen.

Nierenprobleme

Bei Menschen mit Nierenproblemen können Durchfall, Übelkeit und Erbrechen zu einem Flüssigkeitsverlust (Dehydratation) führen, wodurch sich die Nierenprobleme verschlimmern können. Es ist wichtig, dass Sie Flüssigkeit trinken, um das Risiko einer Dehydratation zu verringern.

Kinder und Jugendliche

Die Sicherheit und Wirksamkeit von Wegovy Multi FixDose bei Kindern unter 12 Jahren mit Übergewicht oder Fettleibigkeit wurde nicht untersucht. Wegovy Multi FixDose soll in dieser Altersgruppe nicht angewendet werden.

Die Sicherheit und Wirksamkeit von Wegovy Multi FixDose bei Kindern und Jugendlichen mit MASH wurde nicht untersucht und Wegovy Multi FixDose sollte in dieser Gruppe nicht angewendet werden.

Anwendung von Wegovy Multi FixDose zusammen mit anderen Arzneimitteln

Wenden Sie Wegovy Multi FixDose nicht in Kombination mit anderen Arzneimitteln an, die sogenannte GLP-1-Rezeptor-Agonisten (wie Liraglutide, Dulaglutid, Exenatid oder Lixisenatid) enthalten.

Wie andere GLP-1-Arzneimittel kann Wegovy Multi FixDose verzögern, wie schnell Nahrung Ihren Magen verlässt. Dies kann auch beeinflussen, wie gut oral eingenommene Arzneimittel aufgenommen werden und wirken.

Es wurde gezeigt, dass Wegovy Multi FixDose 2.4 mg die Magenentleerung nicht merklich verlangsamt; es ist jedoch noch nicht bekannt, ob dies auch für Wegovy Multi FixDose 7.2 mg (3 Injektionen à 2.4 mg) gilt.

Sprechen Sie deshalb mit Ihrem Arzt bzw. Ihrer Ärztin, wie Sie orale Arzneimittel in Kombination mit Wegovy Multi FixDose 7.2 mg (3 Injektionen à 2.4 mg) einnehmen sollen.

Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen

Wegovy Multi FixDose beeinflusst Ihre Verkehrstüchtigkeit und Ihre Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen wahrscheinlich nicht. Manche Patienten können sich in den ersten 3 Monaten der Behandlung mit Wegovy Multi FixDose schwindlig fühlen (siehe Abschnitt «Welche Nebenwirkungen kann Wegovy Multi FixDose haben?»). Wenn Sie sich schwindlig fühlen, vermeiden Sie es, ein Fahrzeug zu lenken oder Maschinen zu bedienen. Wenn Sie weitere Informationen brauchen, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker bzw. an Ihre Ärztin oder Apothekerin.

Patienten mit Diabetes

Wenn Sie dieses Arzneimittel in Kombination mit einem Sulfonylharnstoff oder Insulin anwenden, kann es zu einer Unterzuckerung (Hypoglykämie) kommen, die Ihre Konzentrationsfähigkeit beeinträchtigen kann. Nehmen Sie nicht am Strassenverkehr teil und bedienen Sie keine Maschinen, wenn Sie Anzeichen einer Unterzuckerung bemerken. Siehe Abschnitt «Wann ist bei der Anwendung von Wegovy Multi FixDose Vorsicht geboten?» für Informationen zum erhöhten Unterzuckerungsrisiko und Abschnitt «Welche Nebenwirkungen kann Wegovy Multi FixDose haben?» zu den Warnzeichen einer Unterzuckerung. Weitere



Informationen erhalten Sie von Ihrem Arzt bzw. Ihrer Ärztin.

Dieses Arzneimittel enthält weniger als 1 mmol (23 mg) Natrium pro Dosis, d.h. es ist nahezu «natriumfrei».

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker bzw. Ihre Ärztin oder Apothekerin, wenn Sie

- an anderen Krankheiten leiden,
- Allergien haben oder
- andere Arzneimittel (auch selbst gekaufte!) einnehmen oder äusserlich anwenden.

Darf Wegovy Multi FixDose während einer Schwangerschaft oder in der Stillzeit angewendet werden?

Dieses Arzneimittel darf während der Schwangerschaft nicht angewendet werden, da nicht bekannt ist, ob es Ihrem ungeborenen Kind schaden kann. Aus diesem Grund wird während der Anwendung dieses Arzneimittels empfohlen, ein Verhütungsmittel anzuwenden. Wenn Sie schwanger werden möchten, sollten Sie dieses Arzneimittel mindestens zwei Monate vorher absetzen. Wenn Sie schwanger sind oder während der Anwendung dieses Arzneimittels schwanger werden, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein, oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie sofort Ihren Arzt bzw. Ihre Ärztin um Rat, weil dann Ihre Behandlung abgesetzt werden muss.

Wenden Sie dieses Arzneimittel nicht in der Stillzeit an, da nicht bekannt ist, ob es in die Muttermilch übergeht.

Wie verwenden Sie Wegovy Multi FixDose?

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau nach Absprache mit Ihrem Arzt bzw. Ihrer Ärztin an. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker bzw. bei Ihrer Ärztin oder Apothekerin nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Erwachsene

Ihre Behandlung beginnt mit einer niedrigen Dosis, die im Verlauf von 16 Behandlungswochen nach und nach erhöht wird.

- Bei Ihrer ersten Anwendung von Wegovy Multi FixDose beträgt die Anfangsdosis 0.25 mg Semaglutide einmal wöchentlich.
- Ihr Arzt bzw. Ihre Ärztin wird Sie anweisen, Ihre Dosis alle 4 Wochen nach und nach zu steigern, bis Sie die Dosis von 2.4 mg einmal wöchentlich erreicht haben.
- Bei einem BMI von 30 kg/m² oder mehr zu Beginn der Behandlung mit Wegovy Multi FixDose kann Ihr Arzt bzw. Ihre Ärztin Sie anweisen, Ihre Dosis nach mindestens 4 Wochen mit 2.4 mg auf die nächste Erhaltungsdosis von 7.2 mg einmal wöchentlich (3 Injektionen à 2.4 mg) zu erhöhen. Führt die Dosis von 7.2 mg zu keiner weiteren, klinisch relevanten Reduktion des Körpergewichts, wird Ihr Arzt bzw. Ihre Ärztin die Dosis wieder auf 2.4 mg einmal wöchentlich reduzieren.
- Die Maximaldosis beträgt 7.2 mg einmal wöchentlich.
- Falls Sie sich durch Übelkeit (Nausea) oder Erbrechen sehr beeinträchtigt fühlen, sprechen Sie mit Ihrem Arzt bzw. Ihrer Ärztin darüber, die Dosis langsamer zu steigern oder Ihre Dosis auf die vorherige Dosis zu senken, bis sich die Symptome gebessert haben. Generell sollte keine Dosissteigerung erfolgen, wenn bereits erhebliche gastrointestinale Symptome vorliegen.

Sie werden angewiesen, nach der folgenden Tabelle vorzugehen.

Dosissteigerung	Wöchentliche Dosis
Woche 1–4	0.25 mg
Woche 5–8	0.5 mg
Woche 9–12	1 mg



Woche 13–16	1.7 mg
Woche 17–20	2.4 mg
Ab Woche 21	2.4 oder maximal 7.2 mg

Ihr Arzt bzw. Ihre Ärztin wird Ihre Behandlung regelmässig überprüfen. Falls Sie Wegovy Multi FixDose zur Gewichtsregulierung verwenden und Sie nach 28 Wochen nicht mindestens 5 % Ihres ursprünglichen Körpergewichts verloren haben, wird Ihr Arzt bzw. Ihre Ärztin entscheiden, ob die Behandlung weitergeführt werden kann.

Jugendliche (im Alter von über 12 Jahren)

Sie sollten die gleiche Dosissteigerung wie für Erwachsene verwenden, bis zu maximal 2.4 mg einmal wöchentlich (siehe oben). Die Dosis sollte bis auf 2.4 mg (Erhaltungsdosis) oder bis zum Erreichen der maximal vertragenen Dosis gesteigert werden. Höhere wöchentliche Dosen als 2.4 mg werden nicht empfohlen.

Ihr Arzt bzw. Ihre Ärztin wird Ihre Behandlung regelmässig überprüfen. Falls Sie nach 28 Wochen Behandlung nicht mindestens 5 % Ihres anfänglichen BMI verloren haben, wird Ihr Arzt bzw. Ihre Ärztin entscheiden, ob die Behandlung weitergeführt werden kann.

Wegovy Multi FixDose wird unter die Haut gespritzt (subkutan injiziert). Spritzen Sie das Arzneimittel nicht in eine Vene oder einen Muskel.

- Die am besten geeigneten Stellen für die Injektion sind die Vorderseite des Oberarms, des Oberschenkels oder der Bauch.
- Fragen Sie vor der ersten Anwendung des Pens Ihren Arzt oder Apotheker bzw. Ihre Ärztin oder Apothekerin, wie Sie ihn richtig anwenden.

Für Wegovy Multi FixDose 7.2 mg injizieren Sie drei Dosen von 2.4 mg nacheinander. Die Injektionen können im gleichen Körperbereich vorgenommen werden, sollten aber mindestens 5 cm auseinander liegen.

Eine genaue Anleitung finden Sie auf der Rückseite dieser Patienteninformation.

- Mischen Sie Wegovy Multi FixDose nicht mit anderen Arzneimitteln, die Sie ebenfalls spritzen (z.B. Insuline).
- Wenden Sie dieses Arzneimittel einmal wöchentlich, wenn möglich immer am selben Wochentag, an.
- Sie können sich die Injektion zu jeder beliebigen Tageszeit und unabhängig von den Mahlzeiten geben.

Falls nötig, können Sie den Wochentag Ihrer wöchentlichen Injektion dieses Arzneimittels ändern, solange seit Ihrer letzten Injektion mindestens 3 Tage vergangen sind. Nachdem Sie einen neuen Anwendungstag gewählt haben, fahren Sie im wöchentlichen Turnus fort.

Wenn Sie eine grössere Menge von Wegovy Multi FixDose angewendet haben, als Sie sollten:

Sprechen Sie umgehend mit Ihrem Arzt bzw. Ihre Ärztin. Es könnten Nebenwirkungen wie z.B. Übelkeit auftreten.

Wenn Sie die Anwendung von Wegovy Multi FixDose vergessen haben

Wenn Sie eine Injektion vergessen haben und:

- der ausgelassene Zeitpunkt höchstens 5 Tage her ist, wenden Sie Wegovy Multi FixDose an, sobald es Ihnen einfällt. Spritzen Sie dann die nächste Dosis wie üblich am geplanten Wochentag.
-



der ausgelassene Zeitpunkt länger als 5 Tage zurückliegt, überspringen Sie die ausgelassene Dosis. Spritzen Sie dann die nächste Dosis wie üblich am nächsten geplanten Wochentag. Wenden Sie nicht die doppelte Menge an, wenn Sie die vorherige Anwendung vergessen haben.

Brechen Sie die Anwendung dieses Arzneimittels nicht ohne Rücksprache mit Ihrem Arzt bzw. Ihre Ärztin ab.

Die Anwendung und Sicherheit von Wegovy Multi FixDose bei Kindern unter 12 Jahren ist bisher nicht geprüft worden.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker bzw. Ihre Ärztin oder Apothekerin.

Ändern Sie nicht von sich aus die verschriebene Dosierung. Wenn Sie glauben, das Arzneimittel wirke zu schwach oder zu stark, so sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker bzw. mit Ihrer Ärztin oder Apothekerin.

Welche Nebenwirkungen kann Wegovy Multi FixDose haben?

Schwerwiegende Nebenwirkungen

Häufig (betrifft 1 bis 10 von 100 Behandelten)

- Komplikationen bei diabetischer Augenerkrankung (Retinopathie). Wenn Sie Diabetes haben, müssen Sie Ihren Arzt bzw. Ihre Ärztin informieren, wenn Sie während der Behandlung mit diesem Arzneimittel Augenprobleme wie z.B. Sehstörungen bekommen.

Gelegentlich (betrifft 1 bis 10 von 1000 Behandelten)

- Bauchspeicheldrüsenentzündung (akute Pankreatitis). Eine Pankreatitis ist eine schwerwiegende, potenziell lebensbedrohende Erkrankung. Rufen Sie Ihren Arzt resp. Ihre Ärztin umgehend an, falls Sie starke und anhaltende Bauchschmerzen, mit oder ohne Erbrechen, bekommen, da dies ein Anzeichen für eine Bauchspeicheldrüsenentzündung (akute Pankreatitis) sein kann.

Selten (betrifft 1 bis 10 von 10'000 Behandelten)

- Schwere allergische Reaktionen (anaphylaktische Reaktionen, Angioödem). Sie sollten unverzüglich medizinische Hilfe in Anspruch nehmen und umgehend Ihren Arzt bzw. Ihre Ärztin informieren, wenn Symptome wie z.B. Atembeschwerden, Schwellung, Benommenheit, schneller Herzschlag, Schwitzen und Bewusstlosigkeit oder eine rasche Schwellung unter der Haut in Bereichen wie Gesicht, Rachen, Armen und Beinen auftreten, die lebensbedrohlich sein können, wenn die Schwellung im Hals die Atemwege blockiert.

Sehr selten (betrifft weniger als 1 von 10'000 Behandelten)

- Eine Erkrankung des Auges, die als nichtarterielle anteriore ischämische Optikusneuropathie (NAION) bezeichnet wird und zum nicht schmerzhaften Verlust des Sehvermögens auf einem Ihrer Augen führen kann. Sie sollten sich sofort an Ihren Arzt oder Ihre Ärztin wenden, wenn Sie eine plötzliche oder allmähliche Verschlechterung Ihres Sehvermögens bemerken (siehe unter «Wann ist bei der Anwendung von Wegovy Multi FixDose Vorsicht geboten?»: «Plötzliche Veränderungen Ihres Sehvermögens»).

Häufigkeit nicht bekannt (kann aus den verfügbaren Daten nicht abgeschätzt werden)

- Darmverschluss. Eine schwere Form der Verstopfung mit zusätzlichen Symptomen wie Bauchschmerzen, Blähungen, Erbrechen usw.

Weitere Nebenwirkungen

Sehr häufig (betrifft mehr als einen von 10 Behandelten)

- Kopfschmerzen
- Übelkeit
- Erbrechen



- Durchfall
- Verstopfung
- Magenschmerzen
- Schwächegefühl oder Müdigkeit

Häufig (betrifft 1 bis 10 von 100 Behandelten)

- Schwindelgefühl
- Magenbeschwerden oder -verstimmung
- Aufstossen
- Blähungen
- aufgeblähter Bauch
- Magenschleimhautentzündung (Gastritis) – Anzeichen sind Magenschmerzen, Übelkeit oder Erbrechen
- Sodbrennen, auch gastroösophageale Refluxkrankheit genannt
- Gallensteine
- Haarausfall - ist unter Semaglutide 7.2 mg häufiger möglich
- Reaktionen an der Injektionsstelle
- Veränderung der Hautempfindung - verschwindet in der Regel mit der Zeit und kann unter Semaglutide 7.2 mg häufiger auftreten
- Veränderte Geschmacksempfindungen
- Unterzuckerung (Hypoglykämie) bei Patienten mit Diabetes.

Die Warnzeichen einer Unterzuckerung können plötzlich auftreten. Zu ihnen können gehören: kalter Schweiß, kühle blasse Haut, Kopfschmerzen, schneller Herzschlag, Übelkeit (Nausea) oder starkes Hungergefühl, Sehstörungen, Müdigkeit oder Schwäche, Nervosität, Ängstlichkeit oder Verwirrung, Konzentrationsschwierigkeiten oder Zittern.

Ihr Arzt bzw. Ihre Ärztin wird Ihnen sagen, wie Sie Unterzuckerungen behandeln und was Sie tun müssen, wenn Sie diese Warnzeichen bemerken.

Das Auftreten einer Unterzuckerung ist wahrscheinlicher, wenn Sie zusätzlich einen Sulfonylharnstoff einnehmen oder Insulin anwenden. Ihr Arzt bzw. Ihre Ärztin wird möglicherweise Ihre Dosis Ihrer bisherigen Arzneimittel reduzieren, bevor Sie die Behandlung mit diesem Arzneimittel beginnen.

Gelegentlich (betrifft 1 bis 10 von 1000 Behandelten)

- schneller Herzschlag (Herzrasen)
- Erhöhung der Werte von Pankreasenzymen (wie Lipase und Amylase) wird in Bluttests festgestellt.
- Verzögerte Magenentleerung
- Entzündung der Gallenblase
- niedriger Blutdruck
- Schwindelgefühl oder Benommenheit beim Aufstehen oder Aufsetzen durch einen Abfall des Blutdrucks

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker bzw. Ihre Ärztin oder Apothekerin. Dies gilt insbesondere auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind.

Was ist ferner zu beachten?



Haltbarkeit

Das Arzneimittel darf nur bis zu dem auf dem Behälter mit «EXP» bezeichneten Datum verwendet werden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

Aufbrauchfrist nach Anbruch

Wegovy Multi FixDose kann ausserhalb des Kühlschranks bis zu 42 Tagen (6 Wochen) bei einer Temperatur unter 30°C oder im Kühlschrank (2-8°C), vom Kühlelement ferngehalten gelagert werden. Wegovy Multi FixDose muss vor übermässiger Hitze geschützt werden.

Lagerungshinweis

Im Kühlschrank (2-8°C) lagern. Nicht einfrieren. Vom Kühlelement fernhalten.

Lassen Sie die Verschlusskappe auf dem Pen, wenn er nicht benutzt wird, um ihn vor Licht zu schützen.

Ausser Reichweite von Kindern aufbewahren.

Sie dürfen dieses Arzneimittel nicht verwenden, wenn die Lösung nicht klar und farblos ist.

Weitere Hinweise

Nach der Anwendung entsorgen.

Entsorgen Sie keine Arzneimittel in das Abwasser oder den Hausmüll. Geben Sie abgelaufene oder nicht mehr benötigte Arzneimittel aus Haushalten an einer Abgabestelle (z.B. Apotheke, Drogerie, Arztpraxis) oder an einer Sammelstelle zurück. Diese Massnahmen tragen zum Schutz der Umwelt bei.

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen Ihr Arzt oder Apotheker bzw. Ihre Ärztin oder Apothekerin. Diese Personen verfügen über die ausführliche Fachinformation.

Was ist in Wegovy Multi FixDose enthalten?

Wirkstoffe

Wegovy Multi FixDose 0.25 mg

1 Fertigpen enthält 1 mg Semaglutide* (4 Dosen zu 0.25 mg).

Wegovy Multi FixDose 0.5 mg

1 Fertigpen enthält 2.0 mg Semaglutide* (4 Dosen zu 0.5 mg).

Wegovy Multi FixDose 1 mg

1 Fertigpen zu enthält 4.0 mg Semaglutide* (4 Dosen zu 1 mg).

Wegovy Multi FixDose 1.7 mg

1 Fertigpen enthält 6.8 mg Semaglutide* (4 Dosen zu 1.7 mg).

Wegovy Multi FixDose 2.4 mg

1 Fertigpen enthält 9.6 mg Semaglutide* (4 Dosen zu 2.4 mg).

*gentechnisch hergestellt durch rekombinante DNA-Technologie in *Saccharomyces cerevisiae*-Zellen.

Hilfsstoffe

Natriummonohydrogenphosphat-Dihydrat, Propylenglycol, Phenol, Natriumhydroxid/Salzsäure (zur Einstellung des pH-Werts), Wasser für Injektionszwecke

Zulassungsnummer

68798 (Swissmedic)

Wo erhalten Sie Wegovy Multi FixDose? Welche Packungen sind erhältlich?



In Apotheken nur gegen ärztliche Verschreibung.

Jeder Wegovy Multi FixDose Pen enthält 4 Dosen. Jede Packung der einzelnen Dosisstärken von Wegovy Multi FixDose enthält 1 Fertigpen sowie 4 NovoFine® Plus Einwegnadeln. Nach der Injektion der 4 Dosen könnte trotz korrekter Anwendung noch Lösung im Pen verbleiben. Die verbleibende Lösung reicht jedoch nicht für eine weitere Dosis aus, und der Pen sollte entsorgt werden.

Wegovy Multi FixDose 0.25 mg

1 Fertigpen zu 1.5 ml (B).

Wegovy Multi FixDose 0.5 mg

1 Fertigpen zu 3 ml (B).

Wegovy Multi FixDose 1 mg

1 Fertigpen zu 3 ml (B).

Wegovy Multi FixDose 1.7 mg

1 Fertigpen zu 3 ml (B).

Wegovy Multi FixDose 2.4 mg

1 Fertigpen zu 3 ml (B).

Zulassungsinhaberin

Novo Nordisk Pharma AG, Kloten

Domizil: Zürich

Diese Packungsbeilage wurde im August 2026 letztmals durch die Arzneimittelbehörde (Swissmedic) geprüft.

Gebrauchsanweisung

Gebrauchsanweisung für Wegovy Multi FixDose

Bitte lesen Sie immer diese Gebrauchsanweisung sorgfältig, bevor Sie mit der einmal wöchentlichen Anwendung Ihres Wegovy Multi FixDose Pens beginnen und besprechen Sie mit Ihrem Arzt bzw. Ihrer Ärztin oder Ihrem Apotheker bzw. Ihrer Apothekerin, wie Wegovy Multi FixDose richtig zu injizieren ist.

Der Wegovy Multi FixDose Pen ist in fünf verschiedenen Dosisstärken erhältlich:

0,25 mg

0,5 mg

1 mg

1,7 mg

2,4 mg

Vergewissern Sie sich immer zuerst auf dem Etikett Ihres Pens, dass er tatsächlich Ihre verschriebene Dosis Wegovy Multi FixDose enthält.

Ihr Pen kann mit NovoFine® Plus, NovoFine® und NovoTwist® Einwegnadeln mit einer Länge von bis zu 8 mm verwendet werden.

Packungsinhalt:

- Wegovy Multi FixDose Pen
- 4 NovoFine® Plus Nadeln
- Packungsbeilage



Wichtige Informationen

•




Falls Ihr Sehvermögen eingeschränkt ist und Sie diese Gebrauchsanweisung nicht befolgen können, verwenden Sie diesen Pen nicht ohne Hilfe. Bitten Sie eine Person mit gutem Sehvermögen, die sich mit der Anwendung von Wegovy Multi FixDose Pens auskennt, um Hilfe.

- Die Nadeln sind nur zum einmaligen Gebrauch bestimmt. Die Nadeln nie wiederverwenden. Dies könnte zur Verwendung verstopfter Nadeln, zu Verunreinigungen, zu Infektionen und zu einer ungenauen Dosierung führen.

Wegovy® Multi FixDose Pen (Beispiel)

Bitte beachten: Ihr Pen kann eine andere Grösse haben und die Pen-Etikette kann sich farblich von dem in den Bildern gezeigten Beispiel unterscheiden. Diese Gebrauchsanweisung gilt dennoch für alle Wegovy® Multi FixDose Pens.



Nadel NovoFine® Plus (Beispiel)


NovoFine® Plus Nadel (Beispiel)




1 Vorbereiten Ihres Pens mit einer neuen Nadel

Kontrollieren Sie anhand der Bezeichnung und der Dosis Ihres Pens, dass er Ihre verschriebene Dosis Wegovy Multi FixDose enthält.

Ziehen Sie die Kappe vom Pen ab.




Kontrollieren Sie, dass die Wegovy Multi FixDose Lösung in Ihrem Pen klar und farblos ist. Überprüfen Sie hierzu das Sichtfenster des Pens. Falls die Wegovy Multi FixDose Lösung trüb oder verfärbt aussieht, dürfen Sie den Pen nicht verwenden.




Verwenden Sie für jede Injektion immer eine neue Nadel.

Wenn Sie für Ihre Injektion bereit sind, **nehmen Sie eine Nadel.** Kontrollieren Sie die Papierlasche und die äussere Nadelkappe auf Beschädigungen. Falls Beschädigungen sichtbar sind, könnte dies Auswirkungen auf die Sterilität haben. Entsorgen Sie in diesem Fall die Nadel und nehmen Sie eine neue.

Reissen Sie die Papierlasche ab.



Schieben Sie die Nadel gerade auf den Pen. Schrauben Sie sie fest.



Die Nadel hat zwei Kappen. Sie müssen beide Kappen abziehen. Wenn Sie nicht beide Kappen abziehen, ist die Injektion von Wegovy Multi FixDose nicht möglich.


Ziehen Sie die äussere Nadelkappe ab und legen Sie sie zur späteren Verwendung beiseite. Sie benötigen Sie nach der Injektion noch, um die Nadel sicher vom Pen abziehen zu können.

Ziehen Sie die innere Nadelkappe ab und entsorgen Sie sie. An der Nadelspitze tritt unter Umständen ein Tropfen der Wegovy Multi FixDose Lösung aus. Bei der ersten Verwendung eines neuen Pens müssen Sie sich dennoch vergewissern, dass er für die Wegovy Multi FixDose Lösung durchgängig ist. Siehe hierzu «Überprüfen des Durchflusses eines neuen Pens».

Verwenden Sie niemals verbogene oder beschädigte Nadeln. Für weitere Informationen zur Nadelhandhabung



siehe «Über Ihre Nadeln» im Anschluss an diese Gebrauchsanweisung.



Überprüfen des Durchflusses eines neuen Pens

Wenn Sie Ihren Wegovy Multi FixDose Pen bereits einmal verwendet haben, fahren Sie mit «2 Einstellen Ihrer Dosis» fort.

Sie müssen den Durchfluss für die Wegovy Multi FixDose Lösung nur vor Ihrer ersten Injektion mit einem neuen Pen kontrollieren.

Drehen Sie den Dosiswähler, bis Sie das Symbol für die Durchflusskontrolle sehen (** →).



Das Symbol für die Durchflusskontrolle muss sich auf Höhe des Dosiszeigers befinden.



Überprüfen des Durchflusses

Halten Sie den Pen mit der Nadel nach oben.

Drücken und halten Sie den Dosisknopf, bis der Dosiszähler wieder bei **0** steht. Das **0** muss sich auf Höhe des Dosiszeigers befinden.

An der Nadelspitze sollte ein Tropfen der Wegovy Multi FixDose Lösung austreten. Wenn der Tropfen austritt, ist Ihr Pen gebrauchsfertig.

Falls kein Tropfen austritt, überprüfen Sie den Durchfluss erneut. **Sie dürfen diesen Vorgang nur zweimal machen.**

Falls danach noch immer kein Tropfen austritt, **verwenden Sie eine neue Nadel und kontrollieren Sie den Durchfluss anschliessend erneut.**

Wenn weiterhin kein Tropfen der Wegovy Multi FixDose Lösung austritt, **dürfen Sie den Pen nicht verwenden.**



2 Einstellen Ihrer Dosis



Drehen Sie den Dosiswähler, bis der **Dosiszähler stoppt** und **Ihre verschriebene Dosis anzeigt**.



Die gestrichelte Linie () des Dosiszählers führt Sie zu Ihrer Dosis.

Je nachdem, ob Sie den Dosiswähler vor, zurück oder über Ihre Dosis hinaus drehen, ertönt ein anderer Klickton. Der Dosiswähler klickt bei jeder Drehung. Orientieren Sie sich beim Einstellen der Dosis nicht an der Anzahl Klicktöne.



Wenn der Dosiszeiger auf Ihre verschriebene Dosis zeigt, haben Sie Ihre Dosis eingestellt. In der nebenstehenden Abbildung sehen Sie als Beispieldosis

0.25 mg.


Falls der Dosiszähler stoppt, bevor Ihre verschriebene Dosis erreicht ist, siehe Abschnitt «Haben Sie noch ausreichend Wegovy Multi FixDose?» im Anschluss an diese Gebrauchsanweisung.



Auswählen der Injektionsstelle

Wählen Sie eine Injektionsstelle am Oberarm, Oberschenkel oder im Bauchbereich (im Abstand von 5 cm um den Bauchnabel) aus.


Sie können die Injektion im selben Körperbereich vornehmen, aber nicht an genau derselben Stelle wie beim letzten Mal.



3 Injizieren Ihrer Dosis


Führen Sie die Nadel in Ihre Haut ein.

Achten Sie dabei darauf, dass Sie den Dosiszähler sehen können. Verdecken Sie ihn nicht mit Ihren Fingern. Dies könnte die Injektion unterbrechen.



Drücken und halten Sie den Dosisknopf, bis der Dosiszähler  anzeigt.


Halten Sie den Dosisknopf weiterhin gedrückt, lassen Sie die Nadel in Ihrer Haut und zählen Sie langsam bis 6. Das  muss sich auf Höhe des Dosiszeigers befinden. Unter Umständen hören oder spüren Sie ein Klicken, wenn der Dosiszähler auf  zurückläuft.



Ziehen Sie die Nadel aus Ihrer Haut. Wenn Sie die Nadel zu früh herausziehen, tritt unter Umständen eine grössere Menge Wegovy Multi FixDose Lösung aus der Nadelspitze aus und Sie erhalten nicht die ganze Dosis.

Wenn an der Injektionsstelle Blut austritt, drücken Sie leicht auf die Stelle, um die Blutung zu stoppen.

Nach der Injektion tritt an der Nadelspitze unter Umständen ein Tropfen der Wegovy Multi FixDose Lösung aus. Dies ist normal und hat keine Auswirkungen auf Ihre Dosis.




4 Nach Ihrer Injektion



Führen Sie die Nadelspitze auf einer ebenen Oberfläche **in die äussere Nadelkappe ein**, ohne die Nadel oder die äussere Nadelkappe zu berühren.


Wenn die Nadel abgedeckt ist, schieben Sie die äussere Nadelkappe vorsichtig vollständig darauf.



Schrauben Sie die Nadel ab und entsorgen Sie sie unverzüglich und ordnungsgemäss nach Anweisung Ihres Arztes bzw. Ihrer Ärztin, Ihrer Pflegeperson, Ihres Apothekers bzw. Ihrer Apothekerin.

Versuchen Sie niemals, die innere Nadelkappe wieder auf die Nadel zu schieben. Sie könnten sich mit der Nadel stechen. Zur Vermeidung von unbeabsichtigten Verletzungen und Infektionen infolge von Nadelstichen müssen **gebrauchte Nadeln mit äusserster Vorsicht** gehandhabt werden.

Entsorgen Sie die Nadel nach jeder Injektion unverzüglich. Bewahren Sie Ihren Pen niemals mit aufgesetzter Nadel auf.



Setzen Sie nach jedem Gebrauch **die Kappe wieder auf** Ihren Pen, damit die Wegovy Multi FixDose Lösung vor Licht geschützt ist.



Wenn der Pen leer ist, entsorgen Sie ihn ohne Nadel nach Anweisung Ihres Arztes bzw. Ihrer Ärztin, Ihrer Pflegeperson, Ihres Apothekers bzw. Ihrer Apothekerin.

Über Ihre Nadeln

Kontrollieren von Nadeln auf Verstopfungen und Beschädigungen

- Wenn nach längerem Drücken des Dosisknopfs im Dosiszähler nicht  angezeigt wird, haben Sie unter Umständen eine verstopfte oder beschädigte Nadel aufgesetzt.
- In diesem Fall wurde kein Wegovy Multi FixDose injiziert, auch wenn der Dosiszähler nicht mehr die ursprünglich eingestellte Dosis anzeigt.

Vorgehensweise bei einer verstopften Nadel

- Tauschen Sie die Nadel nach den Anweisungen unter «1 Vorbereiten Ihres Pens mit einer neuen Nadel» aus. Fahren Sie anschliessend mit «2 Einstellen Ihrer Dosis» fort.

Pflege Ihrer Pens

Gehen Sie sorgsam mit Ihren Pens um. Eine grobe oder unsachgemässe Handhabung kann zu einer ungenauen Dosierung führen. In diesem Fall wirkt Wegovy Multi FixDose unter Umständen nicht wie vorgesehen.



- **Lassen Sie Ihren Pen nicht fallen** und schlagen Sie ihn nicht gegen harte Oberflächen.
- **Versuchen Sie nicht, Ihren Pen zu reparieren** oder zu zerlegen.
- **Schützen Sie Ihren Pen vor Staub, Schmutz und Flüssigkeiten.**
- **Spülen Sie Ihren Pen nicht ab und weichen oder fetten Sie ihn nicht ein.** Bei Bedarf können Sie ihn mit einem mit mildem Reinigungsmittel befeuchteten Tuch reinigen.

Haben Sie noch ausreichend Wegovy Multi FixDose?

Falls der Dosiszähler stoppt, bevor Ihre verschriebene Dosis erreicht ist, ist nicht mehr genug Wegovy Multi FixDose für eine vollständige Dosis übrig. Entsorgen Sie den Pen in diesem Fall und verwenden Sie einen neuen Wegovy Multi FixDose Pen.

