

▼ Ce médicament fait l'objet d'une surveillance supplémentaire qui permettra l'identification rapide de nouvelles informations relatives à la sécurité. Vous pouvez y contribuer en signalant tout effet secondaire. Voir à la fin de la rubrique « Quels effets secondaires Wegovy Multi FixDose peut-il provoquer? » pour savoir comment déclarer les effets secondaires.

Information destinée aux patients

Lisez attentivement cette notice d'emballage avant d'utiliser ce médicament. Ce médicament vous a été remis personnellement sur ordonnance médicale. Ne le remettez donc pas à d'autres personnes, même si elles semblent présenter les mêmes symptômes que vous. En effet, ce médicament pourrait nuire à leur santé.

Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

Wegovy® Multi FixDose

Novo Nordisk Pharma AG

Qu'est-ce que Wegovy Multi FixDose et quand doit-il être utilisé?

Wegovy Multi FixDose est un médicament pour la perte de poids et le maintien du poids ainsi que pour le traitement de la stéatohépatite associée à un dysfonctionnement métabolique (MASH), qui contient la substance active sémaglutide. Il est similaire à une hormone naturelle appelée glucagon-like peptide-1 (GLP-1), qui est libérée par l'intestin après un repas. Wegovy Multi FixDose agit sur des cibles (récepteurs) dans le cerveau qui contrôlent votre appétit: vous vous sentez plus rassasié(e) et vous avez moins faim, vous éprouvez moins de désir immodéré de nourriture. Cela vous aidera à manger moins et à réduire votre poids corporel. Au niveau du foie, il agit en réduisant les lésions hépatiques telles que l'accumulation de graisse, l'inflammation et la formation de cicatrices.

Régulation du poids

Wegovy Multi FixDose est prescrit en complément d'un régime alimentaire et d'une activité physique pour perdre du poids et aider à maintenir le contrôle du poids. Il est utilisé chez des adultes, qui ont:

- un IMC de 30 kg/m² ou plus (obésité) ou
- un IMC d'au moins 27 kg/m² mais inférieur à 30 kg/m² (surpoids) et qui présentent des problèmes de santé liés au poids.

L'IMC (indice de masse corporelle) est une mesure de votre poids par rapport à votre taille.

Wegovy Multi FixDose est utilisé avec un régime alimentaire et une activité physique pour la régulation du poids chez les adolescents âgés de 12 ans ou plus atteints d'obésité (selon les limites internationalement acceptées) et un poids corporel supérieur à 60 kg.

Réduction des risques de problèmes cardiovasculaires graves chez l'adulte

Wegovy est utilisé pour réduire le risque de problèmes cardiovasculaires graves (décès dû à une mort d'origine cardiaque, crise cardiaque, accident vasculaire cérébral) chez les adultes ayant des antécédents de maladies cardiovasculaires (comme une crise cardiaque, un accident vasculaire cérébral ou une mauvaise circulation sanguine dans les membres) et un IMC ≥ 27 kg/m². Le traitement par Wegovy s'ajoute au traitement antérieur de votre maladie cardiovasculaire existante.

Traitement de la stéatohépatite associée à un dysfonctionnement métabolique (MASH)

Wegovy Multi FixDose est utilisé pour le traitement de la MASH chez les adultes atteints d'une cicatrisation (fibrose) du foie modérée à avancée sans cirrhose.

Quand Wegovy Multi FixDose ne doit-il pas être utilisé?

Si vous êtes allergique au sémaglutide ou à l'un des autres composants mentionnés dans la rubrique « Que contient Wegovy Multi FixDose? ».



Quelles sont les précautions à observer lors de l'utilisation de Wegovy Multi FixDose?

Adressez-vous à votre médecin ou à votre pharmacien avant d'utiliser Wegovy Multi FixDose.

L'expérience avec Wegovy Multi FixDose est limitée chez les patients présentant:

- une MASH et un IMC < 25 kg/m² (ou un IMC < 23 kg/m² pour la population asiatique).

Veuillez demander conseil à votre médecin si l'une de ces situations s'applique à vous.

Patients présentant un retard de vidange gastrique (gastroparésie)

Si vous présentez un retard de vidange gastrique (appelé gastroparésie), l'utilisation de Wegovy Multi FixDose peut entraîner des effets indésirables gastro-intestinaux graves ou sévères. Consultez votre médecin avant d'utiliser Wegovy Multi FixDose.

Inhalation accidentelle d'aliments sous anesthésie

Certains patients ayant utilisé des médicaments tels que Wegovy Multi FixDose ont eu des problèmes avec des aliments ou des liquides passant de leur estomac à leurs poumons sous anesthésie générale ou sédation profonde (sommeil profond provoqué par les médicaments). Informez votre professionnel de santé que vous utilisez Wegovy Multi FixDose avant de subir une intervention chirurgicale nécessitant une anesthésie générale ou une sédation profonde.

Effets sur le tube digestif

Pendant le traitement par Wegovy Multi FixDose, vous pouvez vous sentir nauséux(se), être malade (vomissement) ou avoir des diarrhées. Ces effets secondaires peuvent entraîner une déshydratation (perte de liquide). Il est important d'éviter la déshydratation en buvant beaucoup. Ceci est particulièrement important si vous souffrez de problèmes de reins. Consultez votre médecin si vous avez des questions ou des doutes.

Inflammation du pancréas

Des cas d'inflammation du pancréas (pancréatite) ont été observés chez des patients prenant Wegovy Multi FixDose. La pancréatite est une maladie grave, potentiellement mortelle. Informez votre médecin si vous avez déjà souffert de pancréatite, de calculs biliaires ou d'alcoolisme, ou si vous avez eu des taux de lipides sanguins très élevés. Tous ces facteurs peuvent augmenter votre risque de développer une pancréatite ou de la contracter à nouveau. Arrêtez de prendre Wegovy Multi FixDose et consultez votre médecin si vous ressentez une douleur abdominale intense et persistante, accompagnée ou non de vomissements, car cela peut être le signe d'une inflammation du pancréas (pancréatite aiguë).

Trouble thyroïdien

Adressez-vous à votre médecin avant d'utiliser Wegovy Multi FixDose si vous présentez un trouble de la thyroïde, comme des nodules ou une augmentation du volume de la thyroïde.

Personnes atteintes de diabète

Informez votre médecin si vous êtes diabétique. Votre médecin peut ajuster la dose de vos médicaments contre le diabète pour éviter un taux de sucre dans le sang trop bas.

Wegovy Multi FixDose ne peut pas être utilisé comme un substitut de l'insuline.

Taux de sucre dans le sang trop bas (hypoglycémie)

L'association d'un sulfamide hypoglycémiant ou d'une insuline avec Wegovy Multi FixDose pourrait augmenter le risque de chute du taux de sucre dans le sang (hypoglycémie). Veuillez consulter la rubrique « Quels effets secondaires Wegovy Multi FixDose peut-il provoquer? », qui décrit les signes annonciateurs d'une hypoglycémie. Votre médecin peut vous demander de tester votre taux de sucre dans le sang. Ce contrôle l'aidera à décider si votre dose de sulfamide hypoglycémiant ou d'insuline doit être modifiée pour réduire le risque de taux de sucre dans le sang trop bas.

Maladie de l'œil diabétique (rétinopathie)



Une amélioration rapide du contrôle du taux de sucre dans le sang peut entraîner une aggravation temporaire des troubles de l'œil liés au diabète. Si vous souffrez d'une maladie de l'œil diabétique et que vous avez des problèmes oculaires pendant que vous prenez Wegovy Multi FixDose, parlez-en à votre médecin.

Changements soudains de votre vue

Si vous constatez une perte soudaine de la vision ou une détérioration rapide de la vue au cours du traitement par ce médicament, contactez immédiatement votre médecin pour lui demander conseil. Cela peut être dû à un effet indésirable très rare appelé neuropathie optique ischémique antérieure non artéritique (NOIAN) (voir «Quels effets secondaires Wegovy Multi FixDose peut-il provoquer?»). Votre médecin pourra vous demander d'effectuer une consultation ophtalmologique et vous pourrez être amené(e) à arrêter le traitement par ce médicament.

Problèmes rénaux

Chez les personnes souffrant de problèmes rénaux, la diarrhée, les nausées et les vomissements peuvent entraîner une perte de liquide (déshydratation), ce qui peut aggraver les problèmes rénaux. Il est important de boire des liquides pour réduire le risque de déshydratation.

Enfants et adolescents

La sécurité et l'efficacité de Wegovy Multi FixDose chez les enfants de moins de 12 ans atteints de surpoids ou d'obésité n'ont pas été étudiées. Wegovy Multi FixDose ne doit pas être utilisé par ce groupe d'âge.

La sécurité et l'efficacité de Wegovy Multi FixDose chez les enfants et les adolescents atteints de MASH n'ont pas été évaluées; Wegovy Multi FixDose ne doit pas être utilisé par ce groupe de patients.

Utilisation de Wegovy Multi FixDose avec d'autres médicaments

N'utilisez pas Wegovy Multi FixDose en association avec d'autres médicaments qui contiennent des agonistes des récepteurs du GLP-1 (tels que le liraglutide, le dulaglutide, l'exénatide ou le lixisénatide).

À l'instar d'autres médicaments à base de GLP-1, Wegovy Multi FixDose peut ralentir la vitesse à laquelle les aliments quittent l'estomac. Cela peut également influencer l'absorption et l'efficacité des médicaments pris par voie orale.

Il a été démontré que Wegovy Multi FixDose 2.4 mg ne ralentit pas de manière notable la vidange gastrique; on ignore toutefois encore si cela vaut également pour Wegovy Multi FixDose 7.2 mg (3 injections de 2.4 mg).

Demandez donc conseil à votre médecin sur la manière de prendre vos médicaments par voie orale en association avec Wegovy Multi FixDose 7.2 mg (3 injections de 2.4 mg).

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Il est peu probable que Wegovy Multi FixDose affecte votre capacité à conduire et à utiliser des machines. Certains patients peuvent ressentir des vertiges (étourdissement) au cours des trois premiers mois de traitement par Wegovy Multi FixDose (voir rubrique « Quels effets secondaires Wegovy Multi FixDose peut-il provoquer? »).

En cas de vertiges, évitez de conduire un véhicule et d'utiliser des machines. Si vous avez des questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.

Personnes atteintes de diabète

Si vous utilisez ce médicament en association avec un sulfamide hypoglycémiant ou de l'insuline, une chute du taux de sucre dans le sang (hypoglycémie) peut survenir et altérer votre capacité de concentration. Évitez de conduire et d'utiliser des machines si vous ressentez des signes quelconques d'hypoglycémie. Lisez la rubrique « Quelles sont les précautions à observer lors de l'utilisation de Wegovy Multi FixDose? » pour plus d'informations sur le risque accru d'hypoglycémie et la rubrique « Quels effets secondaires Wegovy Multi FixDose peut-il provoquer? » pour connaître les signes annonciateurs d'une



hypoglycémie. Veuillez consulter votre médecin pour plus de renseignements.

Ce médicament contient moins de 1 mmol de sodium (23 mg) par dose, c'est-à-dire qu'il est essentiellement « sans sodium ».

Veuillez informer votre médecin ou votre pharmacien si

- vous souffrez d'une autre maladie
- vous êtes allergique
- vous prenez déjà d'autres médicaments ou utilisez déjà d'autres médicaments en usage externe (même en automédication !).

Wegovy Multi FixDose peut-il être utilisé pendant la grossesse ou l'allaitement?

Ce médicament ne doit pas être utilisé pendant la grossesse, car ses effets sur le fœtus ne sont pas connus. La contraception est donc recommandée pendant l'utilisation de ce médicament. Si vous souhaitez être enceinte, vous devez arrêter ce médicament au moins deux mois à l'avance. Si vous êtes enceinte ou débutez une grossesse pendant que vous utilisez ce médicament, ou si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, consultez immédiatement votre médecin, car votre traitement devra être arrêté.

N'utilisez pas ce médicament si vous allaitez, car on ignore s'il passe dans le lait maternel.

Comment utiliser Wegovy Multi FixDose?

Veillez à toujours utiliser ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin. Vérifiez auprès de votre médecin ou votre pharmacien en cas de doute.

Adultes

Votre traitement commencera à une faible dose, qui sera augmentée progressivement sur une période de 16 semaines.

- Lors de la première utilisation de Wegovy Multi FixDose, la dose de départ est de 0.25 mg de sémaglutide une fois par semaine.
- Votre médecin vous donnera des instructions pour augmenter progressivement votre dose toutes les 4 semaines jusqu'à ce que vous atteigniez la dose de 2.4 mg une fois par semaine.
- Si votre IMC est supérieur ou égal à 30 kg/m² au début du traitement par Wegovy Multi FixDose, votre médecin peut vous demander d'augmenter votre dose, après au moins 4 semaines à 2.4 mg, pour passer à la dose d'entretien suivante de 7.2 mg une fois par semaine (3 injections de 2.4 mg). Si la dose de 7.2 mg n'entraîne pas de nouvelle perte de poids cliniquement significative, votre médecin réduira à nouveau la dose à 2.4 mg une fois par semaine.
- La dose maximale est de 7.2 mg une fois par semaine.
- Si les nausées ou les vomissements vous gênent beaucoup, parlez-en à votre médecin afin d'envisager une augmentation plus progressive de la dose ou un retour à la dose précédente jusqu'à ce que les symptômes s'atténuent. En règle générale, il ne faut pas augmenter la dose en cas de symptômes gastro-intestinaux déjà importants.

Vous devrez procéder comme indiqué dans le tableau ci-dessous.

Augmentation de la dose	Dose hebdomadaire
Semaines 1 à 4	0.25 mg
Semaines 5 à 8	0.5 mg
Semaines 9 à 12	1 mg
Semaines 13 à 16	1.7 mg
Semaines 17 à 20	2.4 mg



À partir de la semaine 21	2.4 ou maximum 7.2 mg
---------------------------	-----------------------

Votre médecin contrôlera votre traitement de manière régulière. Si vous utilisez Wegovy Multi FixDose pour la régulation du poids mais que vous n'avez pas perdu au moins 5 % de votre poids de départ après 28 semaines, il décidera de la poursuite ou non du traitement.

Jeunes (âgés de plus de 12 ans)

Vous devez utiliser la même augmentation de dose que pour les adultes, jusqu'à 2.4 mg une fois par semaine (cf. ci-dessus). La dose doit être augmentée jusqu'à 2.4 mg (dose d'entretien) ou jusqu'à ce que la dose maximale tolérée soit atteinte. Des doses hebdomadaires supérieures à 2.4 mg ne sont pas recommandées.

Votre médecin contrôlera votre traitement de manière régulière. Si, après 28 semaines, vous n'avez pas perdu au moins 5 % de votre IMC de départ, il ou elle décidera de la poursuite ou non du traitement.

Wegovy Multi FixDose doit être administré par injection sous la peau (injection sous-cutanée). Ne l'injectez pas directement dans une veine ou dans un muscle.

- Les meilleurs endroits pour réaliser l'injection sont l'avant du haut du bras ou de la cuisse, et le ventre.
- Avant d'utiliser le stylo pour la première fois, demandez à votre médecin ou à votre pharmacien de vous montrer comment faire.

Pour Wegovy Multi FixDose 7.2 mg, injectez trois doses de 2.4 mg l'une après l'autre. Les injections peuvent être effectuées dans la même zone du corps, mais doivent être espacées d'au moins 5 cm.

Les instructions détaillées sur la manière d'utiliser le stylo figurent au dos de cette information destinée aux patients.

- Ne mélangez pas Wegovy Multi FixDose avec d'autres médicaments injectables, p.ex. de l'insuline.
- Utilisez Wegovy Multi FixDose une fois par semaine, le même jour chaque semaine si possible.
- Vous pouvez vous faire l'injection à n'importe quel moment de la journée – au cours ou en dehors des repas.

Si nécessaire, vous pouvez changer le jour de votre injection hebdomadaire de ce médicament, à condition que votre dernière injection ait eu lieu au moins 3 jours auparavant. Après avoir choisi un nouveau jour d'administration, poursuivez l'injection une fois par semaine.

Si vous avez utilisé plus de Wegovy Multi FixDose que vous n'auriez dû:

Prévenez immédiatement votre médecin. Vous pourriez ressentir des effets secondaires tels que des nausées.

Si vous oubliez d'utiliser Wegovy Multi FixDose

Si vous avez oublié d'injecter une dose et que:

- 5 jours maximum se sont écoulés depuis la date à laquelle vous auriez dû utiliser Wegovy Multi FixDose, injectez la dose dès que vous y pensez. Injectez la dose suivante comme d'habitude, le jour prévu.
- plus de 5 jours se sont écoulés depuis la date à laquelle vous auriez dû utiliser Wegovy Multi FixDose, ne prenez pas la dose manquée. Injectez la dose suivante comme d'habitude, le jour prévu. Ne doublez pas la dose pour compenser la dose oubliée.

N'arrêtez pas d'utiliser Wegovy Multi FixDose sans avoir consulté votre médecin.

L'utilisation et la sécurité de Wegovy Multi FixDose n'ont pas été établies à ce jour pour les enfants de moins de 12 ans.



Si vous avez encore des questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Ne changez pas de votre propre chef le dosage prescrit. Adressez-vous à votre médecin ou à votre pharmacien si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte.

Quels effets secondaires Wegovy Multi FixDose peut-il provoquer?

Effets secondaires graves

Fréquent (concerne 1 à 10 utilisateurs sur 100)

- Complications de la maladie de l'œil diabétique (rétinopathie). Si vous avez du diabète, vous devez informer votre médecin si vous constatez des problèmes oculaires, p.ex. des troubles de la vision, pendant le traitement avec ce médicament.

Occasionnel (concerne 1 à 10 utilisateurs sur 1 000)

- Inflammation du pancréas (pancréatite aiguë). La pancréatite est une maladie grave, potentiellement mortelle. Appelez immédiatement votre médecin si vous ressentez une douleur abdominale intense et persistante, accompagnée ou non de vomissements, car cela peut être le signe d'une inflammation du pancréas (pancréatite aiguë).

Rare (concerne 1 à 10 utilisateurs sur 10 000)

- Réactions allergiques sévères (réactions anaphylactiques, angioœdème). Vous devez demander une aide médicale en urgence et informer immédiatement votre médecin si vous ressentez des symptômes tels que des difficultés respiratoires, un gonflement, la tête qui tourne, des battements de cœur rapides, de la transpiration et une perte de conscience ou un gonflement rapide sous la peau dans les zones telles que le visage, la gorge, les bras et les jambes, qui peuvent mettre le pronostic vital en jeu si le gonflement de la gorge bloque les voies respiratoires.

Très rare (concerne moins d'un utilisateur sur 10 000)

- Affection de l'œil appelée neuropathie optique ischémique antérieure non artéritique (NOIAN), pouvant entraîner une perte de vision de l'un de vos yeux sans aucune douleur. Vous devez immédiatement contacter votre médecin si vous constatez une détérioration soudaine ou progressive de votre vue (voir «Quelles sont les précautions à observer lors de l'utilisation de Wegovy Multi FixDose?» : «Changements soudains de votre vue»).

Fréquence inconnue (ne peut être estimée sur la base des données disponibles)

- Occlusion intestinale. Forme grave de constipation accompagnée de symptômes supplémentaires tels que maux de ventre, ballonnements, vomissements, etc.

Autres effets secondaires

Très fréquent (concerne plus d'un utilisateur sur 10)

- Maux de tête
- Nausées
- Vomissement
- Diarrhées
- Constipation
- Mal à l'estomac (douleurs gastriques)
- Sensation de faiblesse ou de fatigue

Fréquent (concerne 1 à 10 utilisateurs sur 100)

- Sensation de vertiges



- Gêne de l'estomac ou indigestion
- Rots (éructation)
- Gaz (flatulences)
- Ballonnements abdominaux
- Inflammation de l'estomac (gastrite) – les signes comprennent douleurs gastriques, nausées ou vomissements
- Brûlures d'estomac - aussi appelés reflux gastro-œsophagien
- Calculs biliaires
- Perte des cheveux ou des poils - possible plus fréquemment sous sémaglutide 7.2 mg
- Réactions au site d'injection
- Changement de la sensation cutanée - disparaît généralement avec le temps et peut survenir plus fréquemment sous sémaglutide 7.2 mg
- Altérations des sensations gustatives
- Taux de sucre dans le sang trop bas (hypoglycémie) chez les patients atteints de diabète

Les signes annonciateurs d'une hypoglycémie peuvent apparaître soudainement. Ils incluent: sueurs froides, pâleur et froideur de la peau, maux de tête, battements du cœur rapides, nausées ou sensation de grande faim, troubles de la vision, somnolence ou faiblesse, nervosité, anxiété ou confusion, difficultés de concentration et tremblement.

Votre médecin vous expliquera comment traiter les hypoglycémies et ce que vous devez faire si vous remarquez ces signes annonciateurs.

Le risque d'hypoglycémie est plus élevé si vous prenez également un sulfamide hypoglycémiant ou de l'insuline. Votre médecin réduira éventuellement la dose de vos médicaments habituels avant que vous ne commenciez le traitement par Wegovy Multi FixDose.

Occasionnel (concerne 1 à 10 utilisateurs sur 1 000)

- Battements de cœur rapides (Accélération cardiaque)
- Augmentation des enzymes pancréatiques, comme la lipase et l'amylase, constatée lors de tests sanguins
- Retard dans la vidange de l'estomac
- Inflammation de la vésicule biliaire
- Faible tension artérielle
- Sensation de vertige ou tête qui tourne, en se levant ou en s'asseyant en raison d'une chute de la tension artérielle

Si vous remarquez des effets secondaires, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien. Ceci vaut en particulier pour les effets secondaires non mentionnés dans cette notice d'emballage.

À quoi faut-il encore faire attention?

Stabilité

Ce médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention «EXP» sur le récipient. La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.

Délai d'utilisation après ouverture

Wegovy Multi FixDose peut être conservé hors du réfrigérateur jusqu'à 42 jours (6 semaines) à une température inférieure à 30°C ou au réfrigérateur (2-8°C), à distance de l'élément de refroidissement. Wegovy Multi FixDose doit être protégé de la chaleur excessive.



Remarques concernant le stockage

Conserver au réfrigérateur (2-8°C). Ne pas congeler. Maintenir à distance de l'élément de refroidissement. Lorsque vous n'utilisez pas le stylo, laisser le capuchon du stylo en place pour le protéger de la lumière. Conserver hors de portée des enfants. Ne pas utiliser ce médicament si la solution n'est pas limpide et incolore.

Remarques complémentaires

Jetez le stylo après utilisation.

Ne jetez aucun médicament avec les eaux usées ou les ordures ménagères. Rapportez les médicaments périmés ou qui ne sont plus utilisés dans les ménages dans un point de remise (pharmacies, drogueries, cabinets médicaux) ou un centre de collecte. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin ou votre pharmacien, qui disposent d'une information détaillée destinée aux professionnels.

Que contient Wegovy Multi FixDose?

Principes actifs

Wegovy Multi FixDose 0.25 mg

1 stylo prérempli contient 1 mg de sémaglutide* (4 doses de 0.25 mg).

Wegovy Multi FixDose 0.5 mg

1 stylo prérempli contient 2.0 mg de sémaglutide* (4 doses de 0.5 mg).

Wegovy Multi FixDose 1 mg

1 stylo prérempli contient 4.0 mg de sémaglutide* (4 doses de 1 mg).

Wegovy Multi FixDose 1.7 mg

1 stylo prérempli contient 6.8 mg de sémaglutide* (4 doses de 1.7 mg).

Wegovy Multi FixDose 2.4 mg

1 stylo prérempli contient 9.6 mg de sémaglutide* (4 doses de 2.4 mg).

* produit par la technique de l'ADN recombinant sur des cellules de *Saccharomyces cerevisiae*.

Excipients

Phosphate disodique dihydraté, propylène glycol, phénol, hydroxyde de sodium/acide chlorhydrique (pour l'ajustement du pH), eau pour préparations injectables

Numéro d'autorisation

68798 (Swissmedic)

Où obtenez-vous Wegovy Multi FixDose? Quels sont les emballages à disposition sur le marché?

En pharmacie, sur ordonnance médicale.

Chaque stylo Wegovy Multi FixDose contient 4 doses. Chaque emballage de chaque dose de Wegovy Multi FixDose contient 1 stylo prérempli ainsi que 4 aiguilles jetables NovoFine® Plus à usage unique. Après l'injection des 4 doses, il peut encore rester de la solution dans le stylo, même si celui-ci a été utilisé correctement. La solution restante n'est toutefois pas suffisante pour une autre dose, et le stylo doit être jeté.

Wegovy Multi FixDose 0.25 mg



1 stylo prérempli de 1.5 ml (B).

Wegovy Multi FixDose 0.5 mg

1 stylo prérempli de 3 ml (B).

Wegovy Multi FixDose 1 mg

1 stylo prérempli de 3 ml (B).

Wegovy Multi FixDose 1.7 mg

1 stylo prérempli de 3 ml (B).

Wegovy Multi FixDose 2.4 mg

1 stylo prérempli de 3 ml (B).

Titulaire de l'autorisation

Novo Nordisk Pharma AG, Kloten.

Domicile: Zürich

Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en août 2026 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).

Mode d'emploi

Instructions d'utilisation du stylo Wegovy Multi FixDose

Avant de commencer à utiliser votre stylo Wegovy Multi FixDose une fois par semaine, **toujours lire ces instructions attentivement**, et en parler à votre médecin ou votre pharmacien pour savoir comment injecter correctement Wegovy Multi FixDose.

Le Wegovy Multi FixDose stylo est disponible en cinq dosages différents:

0.25 mg 0.5 mg 1 mg 1.7 mg 2.4 mg

Commencez toujours par contrôler l'étiquette du stylo pour vérifier qu'il contient la dose prescrite de Wegovy Multi FixDose.

Votre stylo est conçu pour être utilisé avec des aiguilles jetables NovoFine® Plus, NovoFine® et NovoTwist® d'une longueur maximale de 8 mm.

L'emballage contient :

- Stylo Wegovy Multi FixDose
- 4 aiguilles NovoFine® Plus
- Notice d'emballage



Informations importantes

- **N'utilisez pas ce stylo sans aide si vous avez des problèmes de vision et si vous n'êtes pas en mesure de suivre ces instructions.** Demandez de l'aide à une personne qui n'a pas de problème de vision et qui est formée à l'utilisation du stylo Wegovy Multi FixDose.
- **Les aiguilles sont à usage unique. Ne réutilisez jamais vos aiguilles** car cela peut entraîner l'utilisation d'aiguilles bouchées, une contamination, une infection et une erreur de posologie.



Stylo Wegovy® Multi FixDose (exemple)

Remarque : les dimensions de votre stylo peuvent être différentes de celles du stylo présenté.
Ces instructions s'appliquent à tous les stylos Wegovy® Multi FixDose.



Aiguille NovoFine® Plus (exemple)


Aiguille NovoFine® Plus (exemple)



1 Préparez votre stylo en y connectant une nouvelle aiguille


Contrôlez le nom et la dose de votre stylo, pour vérifier qu'il contient la dose prescrite de Wegovy Multi FixDose.

Retirez le capuchon du stylo.



Vérifiez que la solution de Wegovy Multi FixDose dans le stylo est limpide et incolore.


Regardez au travers de la fenêtre du stylo. Si la solution de Wegovy Multi FixDose est trouble ou coloré, n'utilisez pas le stylo.




Utilisez toujours une nouvelle aiguille pour chaque injection.

Prenez une aiguille lorsque vous êtes prêt(e) à procéder à l'injection. Vérifiez que l'opercule de papier et le capuchon extérieur de l'aiguille ne présentent pas de dommages. Si vous voyez un dommage, la stérilité de l'aiguille pourrait être compromise. Éliminez-la alors et utilisez-en une nouvelle.

Retirez l'opercule de papier.



Poussez l'aiguille sur le stylo. Tournez-la jusqu'à ce qu'elle soit en place.




L'aiguille est protégée par deux capuchons. Vous devez retirer les deux. Si vous oubliez de les retirer, vous ne serez pas en mesure d'injecter Wegovy Multi FixDose.

Retirez le capuchon extérieur et conservez-le. Vous en aurez besoin pour retirer l'aiguille du stylo en toute sécurité après l'injection.

Retirez le capuchon intérieur de l'aiguille et éliminez-le.

Une goutte de Wegovy Multi FixDose peut apparaître au niveau d'extrémité de l'aiguille. Vous devez toujours contrôler le débit de Wegovy Multi FixDose si vous utilisez un nouveau stylo pour la première fois. Voir « Contrôler le débit pour chaque nouveau stylo ».

N'utilisez jamais une aiguille pliée ou endommagée. Pour plus d'informations sur la manipulation de l'aiguille, voir « À propos des aiguilles » plus loin dans ces instructions.



Contrôler le débit pour chaque nouveau stylo

Si votre stylo Wegovy Multi FixDose a déjà été utilisé, passez à « 2 Définir votre dose ».

Contrôlez le débit de Wegovy Multi FixDose uniquement avant votre **première injection de chaque nouveau stylo**.

Faites tourner le sélectionneur de dose jusqu'à ce que vous voyiez le symbole de contrôle de débit (•••).



Veillez à ce que le symbole de contrôle de débit soit aligné avec le pointeur de dose.



Contrôle du débit

Tenez le stylo avec la pointe de l'aiguille vers le haut.

Appuyez sur le bouton de dose et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le compteur de dose revienne à **0.0**. Le **0.0** doit être aligné avec le pointeur de dose.

Une goutte de Wegovy Multi FixDose doit apparaître à la pointe de l'aiguille. Cette goutte indique que votre stylo est prêt à être utilisé.

Si aucune goutte n'apparaît, contrôlez une nouvelle fois le débit. **Ce contrôle ne peut être réalisé que deux fois.**

S'il n'y a toujours pas de goutte, **changez d'aiguille et contrôlez à nouveau le débit.**

N'utilisez pas le stylo si aucune goutte de Wegovy Multi FixDose n'apparaît.



2 Définir la dose




Tournez le sélecteur de dose jusqu'à ce que le **compteur de dose s'arrête** et **indique votre dose prescrite**.



La ligne en pointillés () du compteur de dose vous permettra d'obtenir votre dose.

Le sélectionneur de dose émet un clic différent lorsque vous le tournez vers l'avant, l'arrière ou au-delà de votre dose. Vous entendrez un clic à chaque fois que vous tournez le sélectionneur de dose. Ne définissez pas la dose en comptant le nombre de clics que vous entendez.



Lorsque la dose prescrite est alignée avec le pointeur de dose, vous avez sélectionné votre dose. Sur cette image, la dose **0,25 mg** est montrée à titre d'exemple.


Si le compteur de dose s'arrête avant que vous n'ayez atteint la dose prescrite, reportez-vous à la section « La quantité de Wegovy Multi FixDose est-elle suffisante? » plus loin dans ces instructions.



Choisissez votre site d'injection

Choisissez le haut du bras, la cuisse ou le ventre (à une distance de 5 cm du nombril).

Vous pouvez injecter dans la même zone du corps, mais assurez-vous que le point d'injection ne soit pas celui utilisé pour l'injection précédente.



3 Injecter la dose

Insérez l'aiguille dans la peau.

Veillez à ce que vous puissiez voir le compteur de dose.
Ne le couvrez pas avec vos doigts. Cela pourrait interrompre l'injection.



Appuyez sur le bouton de dose et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le compteur de dose indique 0.


Maintenez la pression sur le bouton de dose avec l'aiguille dans la peau et comptez lentement jusque 6. Le 0 doit être aligné avec le pointeur de dose. Vous pouvez entendre ou ressentir un clic lorsque le compteur de dose revient à 0.



Retirez l'aiguille de la peau. Si l'aiguille est retirée trop tôt, un jet de Wegovy Multi FixDose peut sortir de la pointe de l'aiguille et la dose entière ne serait pas administrée.

Si du sang apparaît au site d'injection, appuyez doucement sur la zone pour arrêter le saignement.

Une goutte de Wegovy Multi FixDose peut apparaître à la pointe de l'aiguille après l'injection. C'est normal et n'a aucun impact sur votre dose.




4 Après l'injection



Placez la pointe de l'aiguille dans le capuchon extérieur sur une surface plane sans toucher l'aiguille ni le capuchon.


Une fois l'aiguille recouverte de son capuchon, poussez doucement sur le capuchon jusqu'au bout.



Dévissez l'aiguille et éliminez-la immédiatement et selon les instructions de votre médecin, infirmier/ère ou pharmacien.

N'essayez jamais de remettre en place le capuchon intérieur sur l'aiguille. Vous pourriez vous piquer avec l'aiguille. Pour éviter les blessures ou infections involontaires due à des piqûres accidentelles, les aiguilles usagées doivent être **manipulées avec une extrême précaution.**

Éliminez l'aiguille immédiatement après chaque injection. Ne conservez jamais le stylo avec l'aiguille connectée.



Remettez le capuchon du stylo en place sur votre stylo après chaque utilisation pour protéger Wegovy Multi FixDose de la lumière.



Lorsque le stylo est vide, éliminez-le sans aiguille conformément aux instructions fournies par votre médecin, votre infirmier/ère ou votre pharmacien.

À propos des aiguilles

Identifier une aiguille bouchée ou endommagée

- Si  n'apparaît pas dans le compteur de dose après avoir appuyé en continu sur le bouton de dose, il est possible que vous ayez utilisé une aiguille bouchée ou endommagée.
- Dans ce cas, vous n'avez pas reçu Wegovy Multi FixDose, même si le compteur de dose n'est plus sur la dose initiale que vous aviez définie.

En cas d'aiguille bouchée

- Changez l'aiguille conformément aux instructions du point « 1 Préparer le stylo avec une nouvelle aiguille » et passez à « 2 Définir la dose ».

Entretien du stylo

Entretenez correctement le stylo. Une mauvaise manipulation ou utilisation peut entraîner des erreurs de dosage. Le cas échéant, vous pourriez ne pas bénéficier des avantages prévus de Wegovy Multi FixDose.

- **Ne faites pas tomber le stylo** et ne le cognez pas sur des surfaces dures.



- **N'essayez pas de réparer votre stylo** ou de le démonter.
- **N'exposez pas le stylo à la poussière, à la saleté ou à des liquides.**
- **Ne lavez pas, ne faites pas tremper ou ne lubrifiez pas le stylo.** Si nécessaire, nettoyez-le avec un détergent doux sur un chiffon humide.

La quantité de Wegovy Multi FixDose est-elle suffisante ?

Si le compteur de dose s'arrête avant que vous n'atteigniez la dose prescrite, il n'y a plus assez de Wegovy Multi FixDose pour obtenir une dose complète. Mettez le stylo au rebut et utilisez-en un nouveau.

